



10696/B



5350

Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b30523783\\_0002](https://archive.org/details/b30523783_0002)


# SYNOPSIS

UNIVERSÆ  
MEDICINÆ PRACTICÆ:

*Sive Doctissimorum Virorum*

## DE MORBIS,

Eorumque causis & Remediis Judicia.



AUTHORE

### JO. ALLEN M.D.

EDITIO NOVA VENETA,

Ceteris auctior & plerisque in locis diligenter  
emendata; cui accesserunt celebriorum Veterum  
Recentiorumque sententiæ, præter ea, quæ in aliis  
latinis editionibus prostant.

Τὸς αὐτοῖς διατάξας ἐπὶ γινώσκειν τὰ ὁρθῶς εἰρημμένα.  
Ἰπποκράτ. περὶ διαίτης.

### PARS SECUNDA.



### VENETIIS, MDCCLXII.

Apud LAURENTIUM BASILIUM.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

*D. Luigi Langrande*



2 Y N O 1 2 1 8

U N I T E D

W E L L C O M E

W E L L C O M E

D E M O N I A

W E L L C O M E

W E L L C O M E

W E L L C O M E


W E L L C O M E

W E L L C O M E

W E L L C O M E

W E L L C O M E

W E L L C O M E



W E L L C O M E

W E L L C O M E

W E L L C O M E

W E L L C O M E



## C A P U T IV.

*Sive Fasciculus Morborum quartus.*

### A F F E C T U S C A T A R R H A L E S.

Art. 1086.



Affectus Catarrhales, nimirum, Catarrhus, branchus, seu raucedo, & coryza, a se invicem juxta disichon antiquum distinguuntur.

*Affectus  
catarrhales*

Si fluit ad pectus dicatur rheuma Catarrhus.

Ad fauces Branchus, ad nares esto Coryza.

*Differentia*

Art. 1087. Quando affectiones catarrhales pertinaciter insistendo, consuetis remediis minime cedunt, necesse est, juxta *Chesneau* ad sudoriferam dietam confugere, utpote præstantius auxilium, quod conceptam valde raro spem frustratur. Hanc subinde per 15. 20. atque etiam 40. dies continuare expedit, quo tempore pane biscocto, Amygdalis torrefactis, & carne assa vitatur, addito decocto Guajaci pro iis, qui frigidum, ac pituitosum temperamentum gerunt, aut durioribus alimentis ordinario utuntur, & Cinæ Decocto cum sarsaparilla pro debilioribus, & delicatulis.

*Curatione*



## C A T A R R U S.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1088.* Catarrhus proprie dictus est præternaturalis a sero plus minus vitiato in quacunque parte facta alteratio seu functionum læsio. In genere frequentius præcedunt Catarrhos: capitis gravitas, sensuum & actionum torpor, artuum lassitudo; supervenit successive refrigeratio quædam in superficie corporis, horripilatio dorsi levis; in Catarrho graviori febricula lenta. Intensiora sunt omnia symptomata in *calido Catarrho*, adest ardor, dolor, corporis quasi phlogosis, materia excreta est tenuis & corrosiva; remissiora vero sunt omnia in *Catarrho frigido*, ubi lymphæ est mitis, & excernuntur mucosa, viscida, & crassa.

*Curatio.*

*Art. 1089.* Conveniunt *diuretica*, & inprimis *sudorifera ex salibus volatilibus, decoct. e lignis*, speciatim *sassafr. & junip. rorismarini, succinum, serpillum*, &c. In *Catarrhis calidis*, ubi lymphæ est tenuis, acris, aut salsa, profunt *opiata cum aromaticis & volatilibus*. In *Catarrhis diuturnis* conveniunt *vesicatoria & fenticuli*. In affectibus catarrhalibus vix habetur par remedium *fumo tabaci*; omnibus enim satisfacit scopis. „ In frequenti usu sunt *decoct. catechu & suffitus ad*  
 „ *Catarrhum Fulleri.*

*Ventus**Borealis.*

*Art. 1090.* „ Ventum Borealem producendis Catarrhis aptissimum esse, præter *Hippocratis* testimonium, experientia communis suffragatur, *Villis*.



## CATARRHUS SUFFOCATIVUS.

*Lancisii sententia.*

*Art. 1091.* Orthopnoea cum tussi in senibus, *Diagno-*  
 si diu humida persistens, statim mutetur in sic- *sis &*  
 cam, morbo interim de sua vi nihil remittente *Progn-*  
 improvisam necem, ut plurimum, præfagit: sci- *sis.*  
 licet quod lymphæ copia, quæ suppressa anaca-  
 tharsi, in pulmone, jam languido, atque ob-  
 structo, subsistit, facile parit suffocationem, præ-  
 sertim si æger intemperatius, aut incontinenti-  
 us vixerit.

*Art. 1092.* Tussis vero molesta, & suffocati- *Species*  
 va ex acri latice, per glandulas arytænoidæas *altera.*  
 trachææ, & bronchiorum affatim secreto, si ma-  
 gno cum impetu identidem recurrat, mortem  
 subitam portendit, præcipue si æger vel senex,  
 vel languidus, atque etiam in vitæ regimine sit  
 aliquanto liberior; apoplexia namque pulmo-  
 num, quam *suffocativum catarrhum* dicunt, ab  
 irritantium serositatum confluxu, & articulorum  
 pulmonum convulsione, ut cum Hippocrate lo-  
 quamur, producit. Quod sane mortis genus  
 nos frequenter vidimus, & primum quidem su- *Casus I.*  
 pra viginti annos in Carolo Pettazzino Aroma-  
 tario ad Capitolii radices, is enim cum senex  
 esset, atque hujusmodi tussim sperneret, media  
 tandem nocte, ut eidem prædictum fuit, suffo-  
 catus interiit. Simili plane modo Romanus Prin-  
 ceptus cum podagra, atque hymorrhoidibus vexa- *Casus II.*  
 tus, consenuisset; ob animi tamen pathema,  
 vitæque intemperantiam multis ante mensibus,  
 neque podagræ, neque mariscis amplius esset  
 obnoxius; elapso anno repentina pulmonum,  
 asperæ arteriæ, atque œsophagi convulsione cor-

repius, brevi (ut prævifum) totius Urbis cum incrore decessit.

Vetus  
opinio

Art. 1093. *Ludovici Septalii* ætate adhuc persuasio vigebat catarrhos a capite, in pectus fluere, unde ægris cauterium ad futuram coronalem inustum celebrabatur laudibus, & in communi praxi occurrebat. Hoc vero cum *Montanus*, & *Mercurialis*, aliique docti viri damnasent, ipse *Septalius*, libere testatur quadraginta annorum spatio, quo Mediolani Medicinam fecit, nullum ex iis, quibus cauterium hoc inustum est, quidquam adjutum vidisse; quare observat, Medicis spe sua sæpe fraudatis, exolescere tandem illud, & post haberi merito coepisse. Hodie vero hujus remedii pro hac affectione memoria, ne quidem in Medicina Practica remansit, quamvis nisi a Lancisio verisimilior causa tradita sit, quomodo a capitis gravidine in pulmonibus catarrhus generetur, quam sane utile erit, paucis exponere, quemadmodum ab Eruditiss. Viri *Francisci Scardona Rodigini* dudum contractam referimus.

Opinio  
recens  
1799

Art. 1094. „ Cum enim sanguis a jugularibus venis, in venam subflaviam, a vena subclavia in cavam, ex hac in dextrum cordis ventriculum, ex dextro cordis ventriculo in arteriam, & venam pulmonalem propellatur, „ liquet serum copiosum una cum sanguine a cerebro glandulas pulmonum appellere posse, „ & phthisim, seu tabem ex distillatione a capite progignere. Brevior adhuc, & compendiaris via esset, si pluribus iteratisque Cl. „ Anatomicorum experimentis oscula quædam ex vena azyga in tracheam hiantia, quæ se „ detexisse Cl. Jo. Maria Lancisius testatus est, „ paterent usque adeo, ut nullus relinqueretur dubitandi locus. Serum enim acre irritans in

„ ce-



CAP. IV. *Catarrhus suffocativus.* 7

„ cerebro collectum, per jugulares venas refluens  
 „ in cavam, statim ac pertingit ad locum enun-  
 „ tiatis foraminulis pervium ( est autem a ju-  
 „ gulo usque ad divisionem tracheæ in bron-  
 „ chia ) minimo negotio in eadem foraminula  
 „ penetrare, stimulosque excitare valet, tussim,  
 „ & destillationem, phthisi, ac totius corporis  
 „ extenuationi in gracilioribus præsertim impe-  
 „ tum daturam. Hæc fere *Lancisius*, cujus qui-  
 „ dem sententia, nihil adhuc ingeniosius di-  
 „ ctum.

*Etmulleri sententia.*

*Art. 1095.* Catarrhus suffocativus est affectus *Catar-*  
 laryngis, in quo hæc & caput asperæ arteriæ, in *rhussuf-*  
 specie epiglottis, afficiuntur primario ab irrita- *focati-*  
 tione. ibidem excitata arcturam & quasi stricturam *vus.*  
 efficiente; certum est sedem mali esse in isto  
 loco; respirationem subito difficillimam reddit,  
 & suffocationem minatur; incipit cum raucedine  
 subitanea, deinde irritatur larynx, stringi-  
 tur epiglottis, unde metus suffocationis; est  
 quasi complicatio *tussis ferinæ & raucedinis* gra-  
 vioris: oritur a lymphæ acore vel falsedine.

*Art. 1096.* „ Catarrhus suffocativus est mor- *Curatio.*  
 „ bus, si quis alius, plerumque revera peracu-  
 „ tissimus hominem fere dicto citius jugulans;  
 „ propterea omni arte properanda est cura, fe-  
 „ stanter instituendo multiplicem humorum,  
 „ divaricationem, per venæsectionem, cucurbi-  
 „ tulas cum scarificatione, enematum acrium  
 „ injectionem, vesicantium applicationem, ar-  
 „ tuum fortem deligationem, *quam magni fa-*  
 „ cio, & sequens cataplasma plantis pedum ap-  
 „ ponendum suaderem; *℞. Herb. ranunculi flam-*  
 „ *mei minoris contus. p. iij. fmi columbin. p. j. pulv.*



„ *euphorb. p. β. sapon. nigr. q. f. acet. parum contun-*  
 „ *dantur, &c.* Author noster *Ettnullerus vomiti-*  
 „ *toria & opiata* proponit, sed in paroxysmi  
 „ articulo ambo suspecta habeo. Usui interno  
 „ conducunt medicamenta *volatilia & nervina*  
 „ *dicta*, item *oleosa & mucilaginosas*, privatim  
 „ *albumen ovorum cum syrup. de althæa conquis-*  
 „ *satum & cum tantilla aq. nephrit. dilutum.* Ex-  
 „ tra paroxysmum *remediis antiasthmaticis, &*  
 „ *ad catarrhum propriè dictum usitatis recidiva-*  
 „ *tio præcavenda est.*

*Historia.* Art. 1097. „ Medicus quidam juvenis, athle-  
 „ ticus, oppido vicino degens, præeunte per  
 „ biennium raucedine, in hunc morbum subi-  
 „ to lapsus intra spatium 24. horarum mortuus  
 „ est. Ipse & adstantes *angina* laborasse existi-  
 „ mabant, etiamsi nullus tumor gutturis ade-  
 „ rat, intus aut extrorsum, deglutitio neuti-  
 „ quam impedita, &c. Hora extrema implora-  
 „ bat meum auxilium, morbum fuisse *catarr-*  
 „ *hum suffocativum* admonui; statim ac locu-  
 „ tus fueram, ægrotus ipse, qui adhuc mente  
 „ constabat, agnovit morbum. Cucurbitulas i-  
 „ lico affigendas imperavi; sed priusquam chi-  
 „ rurgus officium inchoare poterat intra horæ  
 „ quadrantem animam efflavit. Quatuor alic  
 „ hoc morbo exitiali tentatos novi, quorum  
 „ duos tantum servatos vidi.

*Alia species.* Art. 1098. Est etiam alia species catarrhi suf-  
 focativi, ubi sanguis in pulmonibus stagnat; &  
 moriuntur ægri ex syncope (est forsan *polypus cor-*  
*dis* vel in vasis sanguineis majoribus) ejicitur spi-  
 ma ex ore; Catarrhus hic suffocativus cognosci-  
 tur ex dolore pectoris gravativo, difficultate re-  
 spirationis, & suffocationis metu, voce fere in-  
 tercepta, anxietate ægri, interdum tussi, non  
 semper; secreta non multum emittitur; appella-  
 tur etiam *syncope cardiaca.*

Art.

*Art. 1099.* Convenit *venesectio* quam *ocissi-* *Curatio.*  
*me*, *spermat. cet.* a 3ß. ad 3j. in appropriato vehi-  
culo insignie levamen adfert, *sal. succini*, *anti-*  
*mon. diaphoret.* & alia *sudorifera*, item *gum. ammo-*  
*niac. crocus* est summarum virium in hoc casu.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1100.* Differentia inter catarrhum, & *Differ-*  
rheuma ad evitandam vulgarem confusionem *rentia*  
huiusmodi est: 1<sup>o</sup>. Rheuma plus sanguinis stri- *inter ca-*  
cte dicti involvit, quam catarrhus, qui seroso- *tarrhū*  
mucidæ magis est craseos. 2<sup>o</sup>. Rheuma feбри- *et Rheu-*  
culam qualemcumque semper comitem habet, *ma.*  
quæ tanto fortior, & acrior est, quanto plus  
sanguinea substantia altius ad partes seriferas  
diffunditur, cui congestionis rheumaticæ ali-  
quando otalgia, cum vel sine dura inflatione  
parotidum supervenit; catarrhus autem simplex  
nulla febre stipatus est, sed cum demum eam-  
dem habet comitem, quando sanguinæ portio-  
nes his stasibus accedunt, & corruptionis peri-  
culum minantur. 3<sup>o</sup>. Rheuma ad exitum non  
pervenit, sed dolore premente tendente, immo  
interdum lancinante, ac fremebundo percellit;  
in catarrho autem materia seroso-mucida excer-  
nitur. *Junckerus.*

*Art. 1101.* Si ita effundatur humor in pul- *Curatio.*  
mones, ut gravissimam tussim, metum suffoca-  
tionis, exulcerationis, vel rupturæ venæ acer-  
rima vi afferat; tunc misso sanguine, si opus  
sit, vel etiam illico, & antepurgationem siste-  
re licet hunc effrænem motum.

*Art. 1102.* Ubi ad pulmones, & thoracem, *Garga-*  
quin, & ad fauces irruit materia, sive tenuis *rismata*  
sit, sive crassa, gargarismata numquam in usum *pericu-*  
vocanda, ex motu enim attracta materia, sæ- *losa.*



pe suffocationis periculum infert. Quin & ubi partes spiritales repletæ sunt materia crassa, & si homo tabi aut asthma obnoxius sit, a gargarismis abstinendum. *Septalius.*

*Remedia utiliora in catarrho nimis viscido.* *Art. 1103.* In Pectoris, & pulmonum catarrho conferunt Syrup. ex prassio, hyssopo, tussilag. heder. terrest. Nicotiana; oxymel; & Lohoch scil. litic. fœcula ari; extract. & pulv. rad. Irid. Florent. & Illyr. flor. sulph. butyrum, & rubinus ejusdem, ol. sacchar. cum aq. ardente paratum, Julap. vitale, sed efficacius Elixir Proprietatis ex descriptione Helmontii: Item fumus sulphuris, succini, fol. salv. & betonic. optimus si tussim excitare expediat; pariter juvat succus pulegii sacchar. cretico dulcoratus, atque per intervalla cochleatim exhibitus, qui tussim pertinacem maxime puerorum sanat ex *Boyle*. Idem præstabitur inunctis plantis pedum essentia pulegii, vel ejusdem succo mixto cum aqua ardente.

*Remedia in catarrho acris & salso.* *Art. 1104.* Quod si humor defluens falsedinem aut acritudinem sapiat, timeaturque de pulmonis læsione, ad corrigendam illius acritatem falsilaginemve summe confert iteratus usus pillularum de cynoglossa, vel de styrace. Ejusdem est efficaciz pulvis anodynus *D. Michaelis*, Theriaca recens, & Laudanum opiatum. Profunt etiam pilulæ ex styrace calamita, cum olibano, myrrha, & opio Thebaico mixtis, & succo glycyrrhizæ exceptis, ut apud Schroederum.

*Præservativa.* *Art. 1105.* Ad diminuendam vero peccantis lymphæ copiam, exhiberi poterit extractum agarici, & resina jalappæ cum modico gummi tragacanthi: & quidem salutare observatæ sunt pillulæ compositæ ex resin. jalapæ ℞j. tragacanth. gr. vij. Cinamomi acuti parum, ad tempus repetitæ: itemque pilulæ e mastichæ solutivæ.

Ad sedandum Catarrhum sequens electuarium

con-



consultit *Crato* ad castaneæ quantitatem fumen-  
dum, quod habet: *Thur. maris* ℥ij. *Nuc. condit.*  
*toft.* ℥j. *Spec. a romat. ros.* ℥. *sem. quæ rosarum puni-*  
*carum conditura excipiuntur.*

Ejusdem Auctoris pilulæ ex succino efficacis-  
simæ referuntur: sicut etiam quæ constant:  
℥. *Thur. maris succ. glycyrrhiz. ana* ℥j. *Opii*  
*Croci, Myrrh. ana* ℥j. *Syrup. pap. alb. q. s. m. f.*  
*massa, cujus dosis est a gr. vij. ad x.*

Thus ipsum hora somni deglutitum optimum  
est cum Balsamo Peruviano, sed *Lotichius* laudat  
anis. ol. gutt. iij. opii præp. gr. j. *Thur.* ℥j. *Syrup.*  
*de Pap. q. s.* *Riverius* describit ex *B. Faventino*  
pillulas ex succo glycyrrhiz. aloe lota, & pilul.  
de cynogloss. cum syrup. violac. Ab *Hartmanno*  
probatur aqua serpilli, cum vino albo generoso  
destillata, & quotidie sumpta ad unum, vel al-  
terum cochleare. Vult tamen *F. Hoffmannus* in  
ea infundendum esse lignum sassafras. *Adr.*  
*Myficht* aliam serpilli aquam, benedictam nun-  
cupatam ad Catarrhum præstantissimam con-  
ficit.

## R A U C E D O.

### *Æginetæ sententia.*

*Art. 1106.* Si excrementitii humoris a capite in *Diagno-*  
guttur, & asperam arteriam delatio fiat ita, ut *sis.*  
interiorem membranam ambientem exulcerarit,  
& salebrosam reddiderit, vox rauca comita-  
tur, appellantque affectionem Branchum, sive  
Arteriacum, latine Raucedinem: in quibus non  
a capite modo, sed ex vehementiore vocifera-  
tionis conatu, & a gelidi aeris inspiratu, aspe-  
ritas provenit cum inflammatione.

*Art. 1107.* Hoc malum si diutius propaga- *Progn-*  
tur, *sis.*

tur, fluxusque in pectus, pulmonesque decumbit, maleficæ ac pertinaciores generantur tussés.

*Curatio  
causa  
calida.*

*Art. 1108.* Si arteriam laryngaue occupaverit inflammatio, inter initia statim, quæ tectorii modo illinuntur, remediis meatus obstruentibus, tantisper dum inflammatio moderatior reddatur, utendum est: cujus generis sunt confectio passi Cretici, gummi tragacanthæ, & amyli. Pinguium item palmularum decoctum, & dulcis radicis cum sapa ad mellis crassitudinem: ususque hypoglottidum, sic quod sub lingua teneantur appellatarum (nos vero rotulas seu trageas dicimus). Sed tunc ante omnia vino abstinendum: dulce autem vinum, si inflammatio remissior evaserit potui detur. Et bellaria ex melle, & lacte cum amylo, aut pane filigineo, sorbitionesque ex amygdalis, atque butyrum assumantur.

*Curatio  
causa  
frigida.*

*Art. 1109.* Cum vero humiditas aliqua artus occupat (seu quando raucedo a lymphâ potius seu ab humore frigido, ac ab inflammatione humorique acri, & calido proficiscatur) vehementius abstergentia aggredienda sunt; qualia fabaceum lomentum, & quæ ex melle conficiuntur; brassicæ item, & porrum probe decoctum. Pharmaca porro magis calorifica, & quæ ad tussim faciunt, accommodata sunt. Eaque tandem quæ sapa, ex ficis pinguibus, Thure, iride, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinamomo, cassia & similibus confiunt.

### *Ettmulleri sententia.*

*Rauce-  
dinis se-  
des &  
causa.*

*Art. 1110.* Raucedo seu raucitas est vocis diminutio; pars affecta est aspera arteria ejusque larynx; larynx enim primario format vocem;  
causa



causa proxima est nimia effusio lymphæ tenuis. Est affectus *catarrhalis* a lymphâ acriori, *falsiori*, aut *acidiori*.

*Art. 1111.* In Raucedine contumacissima *sperm.* *Curatio.* ceti est expertum remedium, item decoctum *raparum*, *rob. passularum*. In Raucedine inveterata, ubi mucus viscidus aut lymphâ crassa peccat, *incidentia* & *expectorantia* conveniunt, & præ cæteris *syrupus de erysimo*, & *oxymel scilliticum*, & *bals. sulph. venæsectio* vitanda, nam morbum diuturnum reddit.

*Art. 1112.* „ Interdum *vermes in intestini*, *Vermes* „ sunt causæ *aphoniae* vel Raucedinis, ut in præxi vidimus. “ *Extractum pectorale*, *lohoch. ad* *Remedia* „ *raucedinem*, *Lohoch. vitellinum*, *Lac ebutyra-* *varia.* „ *tum*, &c.

### Farrago sententiarum.

*Art. 1113.* Observavit *Hippocrates* a fluxione *Causa* materiæ rheumaticæ acris, & causticæ in pharyngem oriri *pro ca-* *tartica* *raucedines* *raucedines* *cynanchas*, *erysipelata*, *peripneumonias*, & quamdiu materia in tali *raucedinis* *temperie* existat, perdurare priora pathemata, si vero spissescat, & concoquatur eadem minui, & febrem si quæ adest, solvi. Præterea *raucedinis* seu obscuritatis sermonis causam, aeris obscuritatem fore; nam eadem post æstatem siccam, & borealem fiunt, & autumnō vigente pluvioso & australi.

*Art. 1114.* Ex eodem etiam sequentes prædictiones habemus. *Prognosis.* *sis.* Raucedines, & gravedines in valde senibus non concoquuntur. In infania raucedo cum tussi morbum solvit. Sed in hepatico fluxu raucedo mala, maxime si cum tussi fiat. Vigente autem raucedine sputa viscosa, & sal-

& falsuginosa mala sunt, etiamsi aliquid attollatur juxta pectus.

Observavit *Halvigi* raucedinem in sexu foemineo contingentem mensium obstructionem interdum pro fundamento habere, quo intuitu venæ sectionem commendat.

*Curatio.* Art. 1115. Ad stricturam partium glandularum relaxandam, & acrimoniam obtundendam exhibeantur lubricantia ex. gr. ol. amygdal. dulc. syrup. liquirit. de erysimo *Lobellii*, capilli vener. violar. juscula mucilaginosæ raparum avenæ, hordei, decocta ex herbis *Veronicæ*, hyssopi, *Salviæ*, *hederæ terrest.* sem. anisi, fœniculi.

In Raucedine a catarrho etiam cum febre sanguis e venis superioribus ne mittatur. Nam capite refrigerato augetur malum ( si nempe a causa frigida veniat ) *Baptist. Condronch. de vit. voc. Lib. 2. cap. 3.*

Pulveres adstringentes in raucedine a causa frigida, vel resolventes, & nitratae a causa calida, non sunt in fauces flatu, sed cochleari vel specillo concavo indendi.

Quo magis humores acres biliosique in hoc affectu peccant, eo melius conducunt absorbentia intus sumpta cum nitro, & antimoniato quodam fixo combinata, conjuncto leni regimine diapnoico.

In causa scorbutica, venerea, & phthifica, primarii affectus respiciendi sunt.



## C O R Y Z A .

## Celsi sententia .

*Art. 1116.* Distillans humor ex capite in na- *Diagnos.*  
res , easdem claudit , vocem obtundit , tussim *sis.*  
siccam movet , sub eadem falsa est saliva , so-  
nant aures , venæ moventur in capite , turbida  
urina est . Hæc omnia Coryzam *Hippocrates* no-  
minat .

*Art. 1117.* Ægro igitur , cui in nares , vel in *Curatio.*  
fauces huiusmodi destillavit ; protinus primis  
diebus multum ambulandum est , perfricandæ ve-  
hementer inferiores partes , levior frictio adhi-  
benda thoraci erit , levior capiti , demenda as-  
sueti cibo pars dimidia , sumenda ova , amy-  
lum , similiaque ; quæ pituitam faciunt crassio-  
rem . Siti quantum maxime sustineri potest ,  
pugnandum est . Ubi per hæc idoneus aliquis  
balneo factus , eoque usus est , adjicendus est ci-  
bo pisciculus , aut caro ; sit tamen ne protinus  
justus modus cibi sumatur . Vino meraco co-  
piosius utendum est . „ Nam si materia calida  
„ sit , balnea calida potabilium , & dulcium a-  
„ quarum convenient ; ita enim temperatura ,  
„ in melius transmutatur , & generati in capite  
„ vapores discutiuntur ; si frigida est materia  
„ distillationem faciens , tum balnea aquarum  
„ naturæ suæ calidarum convenient ; neque fue-  
„ rit inutile oleo irino , aut simili aliquo ca-  
„ put illinire . “

## Etmulleri sententia .

*Art. 1118.* Coryza , sive narium catarrhus , *Coryza*  
est quando copiosa lympha tenuis , & acris in *descri-*  
prin-

*prio & causa.* principio per nares defluit, & postea materia crassa, tenax, varie colorata cum dolore capitis gravativo, ab aere inclementiore ut plurimum ducens originem, rarissime a causa interna. Frequentissime recurrens periculum est, ne *ozenam* vel *polypum* producat.

*Curatio.* Art. 1119. Coryzam inchoantem curant *naribus applicata*, & ore *masficata*, *suffitus*, *odoramenta*, *illinitio narium cum ol. avisi* ante excoriationem, item *oleum succin.* vertici illitum, *ol. caryophyl.* cum bombyce naribus intrusum; *balsam. apoplecticum*, &c. quandoque in usum veniunt. Ad Coryzam præcavendam *suffitus ex fumo succini*, *masstick. oliban. gum. anime*, &c. multum juvant, sed hæc in principio; si morbus ulterius progrediatur; conducunt *sternutatoria cum ol. chym. cinnamom. vel caryoph. vel ol. majorane.*

*Remedia varia.* Art. 1120. Decoct. *catechu compositum* (in catarrho tenui præ aliis fere omnibus) *decoct. rosar. lochoch. japonicum*, *lochoch. vitellinum*, *suffitus ad catarrhum* (fumus, pallio similive tegumento capite prius tecto, naribus attrahatur,) *tabella domestica*, &c. sunt remedia in Coryza usitata.

### Farrago sententiarum.

*Procatartica coryza causa.* Art. 1121. Coryzæ causa frigida esse videtur, tamen exulcerat calore quodam interno; & salsedine nares, qua transit. *Ballonius de Arthrit.* qui alibi (*de virg. & mulier. morbis*) addit etiam: qui coryzæ sunt obnoxii si febricitant facilius liberantur.

Quibuscumque gravedo innascitur, & fluxus per nares movetur, hic ut plurimum acrior est eo,



eo, qui prius erat, & quotidie ex naribus prædibat, & tumescere facit nasum, & exurit calentem, & extreme ignitum: si vero manum admoveas, & diutius perseveraverit etiam exulceratur locus minime carnosus, & durus existens. Sedatur autem aliquo modo ardor in naribus, non quum fluxus prodit, & inflammatio consistit; sed postquam fluxus crassior, & minus acris, concoctusque, & magis permixtus prior fuerit, tunc sane jam etiam ardor cessat. Rursus autem aliis ex frigidity ipsa sola manifeste grævedo fit, nullo alio accedente. Omnibus autem liberatio hæc est, ut ex frigidity quidem affecti percalfiant, ex ardore vero perfrigerentur. Atque hæc brevi accedunt, & concoctione nulla opus habent. Reliquæ autem omnes fluxiones, quas propter humorum acrimonias, & intemperantias ego fieri sentio, restituantur, & curantur, ubi temperatæ fuerint, & concoctæ. *Hippocr. de vet. Med.*

Observat *Ludovicus Mercatus* initio morbi in sicca, & crassa coryza tenuem quamdam lympham exstillare, quæ temporis defluxu magis spissa, & crassa redditur.

*Art. 1122.* Jo: Langius Coryzam distinguit in *Multi-* humidam, & siccam, quia in illa serum mu- *plex co-* cosum libere per nares transit, in hac contra *ryza di-* inibi hæret, & meatibus obstructis spirandi dif- *stinctio.* ficultatem, & loquelæ vitium inducit; tum etiam, cum ceteris omnibus, distinguit in frigidam seu insipidam, & in calidam seu acrem; observatque hanc posteriorem ex auctoritate *Helmontii* & *Ratonis* contagiosam fore; quare cum hoc in Germania populariter sit evulgatum, non facile ex eodem poculo, e quo coryza laborans potum hausit, alii bibunt. Notatu etiam dignum est coryzam, quandoque ex quadam aeris con-

stitutione Epidemice grassari, quia eodem tempore plurimos una exercet.

*Pregno-  
sis.*

*Art. 1123.* Defluxionem humorum ex capite ad nasum, seu coryzam levem quidem esse morbum testatur *Celsus*; diversæ tamen dantur circumstantiæ, & conditiones, quæ morbum hunc, alias levissimum, curatu faciliorem, vel difficiliorem, periculosum, vel minus talem reddunt. Quamobrem *Mercatus* ait: utcumque sit, cavendum est, ne nimium protrahatur affectio; quippe si consuetudinem capefferit, gravissimos, & difficiles morbos sequi necessum erit; omnium tamen gravissimos, si quæ fluunt, acria, mordacia, falsuginosa, nitrosa, vel nimis tenuia fuerint, aut viscida, & plurimum adhærentia: quippe in ulcerationem protinus ducit partem, ad quam fluit, & majora mala accersit. Certe si feri nimia copia, vel acrimonia scorbuticæ, vel venereum virus in tali corpore latitet, difficilior longe erit curatio. Præterea gravedines in senectute esse ex numero morborum diuturnorum, ac proinde senes comitari usque ad mortem, asseruit *Hippocrates*.

*Remedia  
interna.*

*Art. 1124.* Si internum adsit humorum vitium, hujus correctionem non minus ac causarum antecedentium, & occasionalium remotionem Medicus moliatur oportet. Quare præmissis iis, quæ primas vias abstergunt, & corruptum chylum educunt, ad ea, quæ acrimoniam corrigunt, visciditatem attenuant, & per sudorem, vel urinam etiam evacuant confugiendum est, præ ceteris ad remedia, quæ ex junipero, lign. guajac. sassafr. myrrh. succino similibusque parantur, tum etiam ad bolum Armeniam, & Theriacam, quæ duo affirmavit Asclepiades incantamenti instar sistere, atque corrigere catarhum. At si profundas nimis egerit morbus radices,



dices, & contumax fuerit, palliatis, utendum inter quæ fonticuli, vesicatoria, & setacea brachiis, nuchæ, aliisque locis applicata primas obtinent.

*Art. 1125.* Externe vero: si tenuis acrisque *Extrapa* adsit coryza, nares unguento pomato, & oleo, *na.* aut unguento rosato *Forestus*, oleo vero nucis moscatæ expresso item ol. amygdal. dulc. & unguent. ex fl. salicis, ocymi, viol. martial. ros. conquassatis, & oleo rosaceo coctis *Weickardus* inungi jubent. Præter hæc, & suffitus varii ex gummi anime, qui ab *Hartmanno* & *Jonstano* adeo probantur, aut ex massice, succino, thure, benzoe, styrace, gummi hederæ, aliisque, qualium descriptiones *Sennertus* & *Barbette* tradunt, plurimum laudantur, qui naribus mediante vase angustis, oblongisque osculi, quod e *Vidio Florentino*, & *Jacobo Hollerio Marcus Aurelius Severinus* delineat: aut ope fistulæ vitræ rubæ similis ab eodem Auctore e *Bartholomeo Montagnana* depictæ, excepti, transmittuntur.

## PHLEGMATORAGIA.

*Junckeri sententia.*

*Art. 1126.* Phlegmatoragia est verus continuus fluxus, seu stillicidium limpidi phlegmatis e naribus, qui itidem a congestione humorum versus caput hæmorrhagiam narium respiciente originem ducit. *Definitio.*

*Art. 1127.* Præcedunt hunc morbum congestiones ad caput molestæ per sensum oppletionis, gravitatis, & pressionis, tum succedit stillicidium limpidi phlegmatis per nares, quod post effluxum plurium guttularum sponte sua iterum cessat, atque inde sensus gravitatis citius. *Diagnos.*

ea oculos, & nasi radicem conjunctus invenitur.

*Casus.* Art. 1128., Rara quidem hujusmodi affectio, est, quam tamen describit Bonnetus in Anatom. Pract. lib. 1. §. 70. obs. 10. Ipse quoque novi mulierem, quæ per octo menses tam copiosa Phlegmatoragia laboravit, ut plures ferè limpidissimi heminas per nares egresserit. Erat enim perpetua serie naso distillatio, quibusdam diei horis mitior, aliis contra crebrior, & abundantior. Fucus erat assueta, & hystericis affectionibus exercebatur. Plurimis incassum tentatis ex lactis usu liberata est.

## T U S S I S.

### *Cœli Aureliani sententia.*

*Tussis* Art. 1129. Tussicula nunc arida, nunc humecta in corpora irruit, multos ac pingues humores excludens: & quibusdam sola, quibusdam adjuncta respirationis difficultate, quam Græci *dispnoeam* vocant, item sanguinis egestionem, aut phthisicam passionem, vel horum similibus affectis corporibus.

*Eadem* Art. 1130. Sed de iis tussiculis, quæ aliarum *idiopati-* fuerint appendices passionum, singulatim scribentes docebimus; de iis vero, quæ suæ sunt, atque propria vexatione corpus afficiunt, nunc tradimus curationem; quæ ita erit adhibenda, ut de catarrho scribentes docuimus: discreta scilicet specie, quo possint electaria, atque pota medicamenta, vel catapotia, sive alia quæque sub regula medicinali recte mederi corporibus.

*Nota bene.* Art. 1131. Monendi etiam agrotantes, ne ultra modum competentem retinendo spiritum irritent potius, quam mitigent tussiculam, quod quidem, si fuerint moderati, ejus motum facilius



lius amputare datur, quam nimis spiritum continendo. Quidam namque retentionem spiritus in hoc morbo utilem judicarunt; nec sine ratione; nihil enim magis ad citam tussis curationem confert, humorumque influxum prohibet, quam initio non tam spiritum, quam perpetuum tussiendo conatum, quantum licet, cohibere.

*Art. 1132.* Tum *vasculum cum infundibulo* supponendum, per quod æger adducto spiritu accipiat vaporem mulso, vel alica, aut succo ptisanæ: vel eorum quiddam sorbeat: aut ex aqua calida vaporem accipiat. *Remedia.*

Videnda etiam uva, ne ob tumorem sui, aut inducta laxitate tussiculam provocet. Tum gargarismatibus, vel inunctionibus utendum circa thoracem atque gutturis summitatem, Græci anthereona vocant, Epithemata etiam apponenda, nunc laxativa, nunc constrictiva, quorum species ex ante dictis erunt accipiendæ, ne sæpius eadem dicere videamus.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1133.* Probe distinguendum est; an tussis humida sit ex *pectore*, an ex *stomacho*, an a *nervis*. Percunctandum est, ubi ægri percipiunt tussiendo stimulum; an in larynge seu aspera arteria, vel pectore, vel inferius circa scrobiculum cordis; nam posterior locus *tussim stomachalem*, priores *pectoralem* innuunt; jubeatur æger profundius respirare; sic enim tussire incipiet, si vitium sit in pulmonibus; secus si in stomacho. Sonus in tussiendo ex profundo quasi raucus pulmones affectos indicat, superficialis asperam arteriam. *Tussis. Distinguendum est an sit a pectore vel ventriculo, &c.*

*Art. 1134.* Nullus practicoꝝ aliquid habet *Tussis stomachalis.*

de *Tussi stomachali*, præter *Lindanum*; mihi (inquit) est compertum pluribus observationibus plerumque Tussim esse ex ventriculo: ubi autem materia latitet, & unde procedat, ex sono dicere possum, qui variatur pro materiæ & loci conditionibus; si materia sit tenuis, & in ventriculo delitescit, furibunda Tussis est, in qua vix aliquid egeritur, licet cum summo conatu tussiant (omnis Tussis in principio *sicca* progressu temporis evadit *humida*.)

*Curatio.* Art. 1135. Ad expectorationem promovendam convenit succus *raphan.* recens expressus cum *paucis sacchar.* temperatus; Tussis humida stomachalis cum vomitoriis & stomachicis curatur, sancte testor, quod ex usu vomitoriorum ne minimum noxæ observaverim; purgantia non conducunt, *mercurius dulcis* vero primum obtinet. *Elixir proprietatis* & *bals. Peruv.* laudantur. Tussis sicca, nocturna, pectoralis, catarrhalis dicta, ex lymphæ vitio, & exinde irritatione, optime curatur per *volatilia*, *sudorifera*, & *opiata*, etiam si febris conjuncta fuerit. *Flores benzoes*, *sperma ceti*, decoctum *raparum*, succus *glycyrrhiz.* &c. laudantur. In Tussi sicca chronica *phthisin* minitante, ubi peccat lymphæ, egregium est decoctum *e lignis cum passulis*, &c. Decoctum *raparum* in omni Tussi sicca, vel catarrhali, vel pectorali, vel stomachali est nobile remedium, quod aliis irritis vidi optimum.

### Sydenhami sententia.

*Tussis.* Art. 1136. Tusses aliquando sunt *epidemicæ*, nemini sere parcentes: Hæ pendent plerumque a febre aliqua constitutionis prægressæ, tanquam a morbo primario; ideoque quando cum febre implicentur, respiciendum est ad istius morbi  
ge-



genium; cum vero tusses sine febre contingant, curandæ sunt sola a *carnibus* abstinentia, moderato *exercitio*, & *ptisana pectorali refrigerante*: quandoque vero tusses *epidemicæ* ad tussim puerorum *convulsivam* quam proxime accedere videntur, & tunc eandem fere postulant medelam, viz. *venesectionem & catharsin*.

Art. 1137. Tussis recens (*phthisi* nondum confirmata) sola abstinentia a *vino & carnibus*, & usu *loboch. ex ol. amygd. dulc. &c. & tab. domestic. seq. ordinario* subigitur; ℞. *Sacchar. cand. ℥iij. coq. in q. s. aq. font. usque dum adhaereat extremis digitorum*, tum add. *pulv. glycyrrhiz. enul. campan. sem. anis. angel. ana ℥β. pulv. irid. florent. sulph. ana ℥ij. ol. anis. chym. ℥ij. f. s. a. tabella*. Sin vero, his tentatis, superstes maneat (præcipue si febrem comitem habeat, vel a *peripneumonia* vel *pleuritide* originem ducat) ineptum fuerit *pectoralibus* fidere; sed *venesectione & catharsi* debellanda est; si autem denique huic methodo non cesserit, tum capiat æger *balsam. Peruv. gut. x. in coch. j. syr. heder. terrest. ter in die superbibendo ℥iij. decoct. amar. sine purgantibus*; sed in tussi diuturna vel *phthisi* omnibus aliis præfidiis *equitatio* (492.) palmam facile præripit.

### Farrago sententiarum.

Art. 1138. Si Tussis a catarrho oriatur, curatur ut *catarrhus*; ℞. *Terr. catechu. Div. sacchar. catechu, penid. in aq. ros. solut. ℥vj. mucilag. gum. tragacanth. & alia q. s. f. trochisc.* si sub linguam teneantur, tussim curant, (inquit *Bonetus*) viscidam & tenacem pituitam bene solvunt, eamque commodam expectorari reddunt, quare in his affectibus pulmoniacis mihi in frequenti est usu, semperque meo desiderio respondet hoc remedium.

Remedia nonnulla alia melioris notæ sunt, quæ sequuntur, viz.

Syrupus ex allio sequens;

℞. Rad. enul. campan. incis. ℥iv. zinzib. ℥vj. ra. liquirit. ℥vj. coq. in aq. font. ℔vj. ad ℔iv. sub finem add. lobul. allii tenuiter incis. ℥iv. sem. anis. contus. ℥i℔. colatur. add. sacchar. q. s. ut f. s. a syr. Pharm. paup.

Trochisci balsamic.

℞. Balsam. Tolutan. ℥℔. pulv. rad. irid. enul. campan. ana ℥ij. gum. arab. trag. ana ℥j. flor. benzoin. ℥ij. sacchar. cand. ℔℔. omnibus in pulv. subtil. redactis cum q. s. mucilag. gum. tragacanth. f. s. a. trochisci.

Item. Balsam. sulphuris anisat. & extractum pectorale, Lohoch. rub. & Lohoch. myrrhisat. præcipue Fulleri in recenti Tussi conveniunt.

Admonitio.

Art. 1139. Discant ægroti Tussi laborantes, tempore idoneo, & cum morbus altas nondum egit radices, validisque adhuc viribus, remedia adhibere.

Principiis obsta, sero medicina paratur;  
Cum mala per longas invaluere moras.

Curatio  
tussis ab  
humore  
tenui.

Art. 1140. Quando lymphæ puræ tussi excreantur, sequens Julappium confert. ℞. Fol. consolid. major. man. j. rad. alth. unc. ij. jujub. num. xv. daëtil. absq. nucleo num. x. aq. commun. lib. iij. coq. per hor. dimid. & colat. add. sacchar. lib. ij. & f. julap.

Summis laudibus hoc remedium extollit Auctor Diction. Medicinal. pro tussi a tenui humore facta, modo æger subinde parvum cochleare



de eodem, cum aquæ cyatho ingerat. Monet insuper, ut purgantia omnia vitentur, quæ irritatione sua tussim exasperare possunt, & ubi necessitas urgeat injiciendos clysteres jubet, ex fol. malv. alth. verbasc. & melle, vel sesquiunciam saltem mannæ, cum parvo feri lactis cyatho ingerendam.

In hujusmodi tussi vaccinum lac, cum aquæ hordei æquali quantitate mixtum mane, & vespere quotidie plurimum etiam conducit, modo febris absit, quæ ejus usum in omnibus quidem morbis omnino prohibet. Vomitoria itidem valde opitulantur, ni contraindicans aliquod obstat.

*Art. 1141.* Quodsi humores tussi redditi visci-  
di sint crassique, nec lac, nec julappia, nec qui-  
dem incrassantia quævis amplius conveniunt,  
sed vomitorio imperato, sequens Ptisana pro  
potu communi instituitur.

*Cura  
tussis ab  
humore  
crasso.*

*℞. Puleg. hyssop. ana man. j. irid. florent. Zij. aq. commun. lib. iij. coq. ad tertiæ partis diminut. de*  
qua æger bibat quatuor, aut quinque cyathos  
quotidie, præcipue mane stomacho jejuno, &  
vespere.

*Ptisana  
I.*

Loco hujus ptisanæ altera item substitui potest, quæ hujusmodi est.

*℞. Heder. terr. man. j. herb. capillaris cujusvis, vel de omnibus tantundem, aq. commun. lib. iij. II.*  
*ebull. per hor. quad. & in fine ebullition. add. fol. pap. Rheados man. sem. colatura sit pro potu ordinario præcipue mane, & vespere. Æger autem*  
*quotidie cubitum iturus cum hac assumere poterit antihect. Poterii gr. xx. & per decem vel duodecim dies, ejus usum continuabit.*

Quæ autem sequitur ptisana pro, hujusmodi  
tussi admodum efficax invenitur. *℞. Salsaparil. III.*  
*chine ana unc. j. bulli per horæ quadrant. cum*  
*aq.*

*Ptisana  
III.*

*aq. font. lib. v. in fine ebull. add. heder. terrest. hyssop. ana man. j. colat. sit in potum quotidianum.*

*Cura  
rheuma-  
tis pecto-  
ris.*

*Art. 1142.* Methodus qua idem Auctor Pectoris Rheumata curanda consulit, ita se habet. Quoniam nullum Rheuma adest, quin perspiratio intercepta fuerit, atque per consequens, quin vasa admodum inflata ac plena inveniantur, absque mora venam brachii tundere expedit. Phlebotomia enim specificorum remediorum ad hunc morbum, veluti præludium est, sine qua eadem sæpissime incassum cedunt; si vero contra statim adhibetur pectoralia leviora cito morbum solvunt. Ex pectoralibus vero nullum præstantius mihi notum est sequente.

*℞. Sp. vin. combusti cochlearia ij. ol. amygdal. dulc. absq. igne express. mell. ana cochleare j. agitent. simul, & concutiantur, atque per tres successivos dies, æger cubitum iturus totam capiat dosin.*

*Potio.*

*Art. 1143.* Neque suo arbitrio relinquenda sunt Rheumata, intuitu quod periodum suam explere debeant. Remedia enim quibus utendum est, oportet sint attenuantia, & aperitiva; inter quæ, utut vulgaria videantur, nos hic apponere non piget, quædam aliquo effectui interdum non expertia.

*Potio  
altera.*

*℞. Sperm. coet. 3 sem. syrup. de hyssop. unc. sem. aq. cinamom. hyssop. ana unc. j. m. & utatur æger quotidie cubitum iturus.*

*Ptisana  
altera.*

Sequens etiam ptisana in omnibus Rheumaticis passionibus excellit. *℞. Fol. pap. rhead. man. j. fol. hyssop. man. sem. aq. commun. lib. vij. ebull. per dimid. hor. quadrant. atque igne remoto adde glycyrrhiz. ℥iij. de qua bina, & ultra libræ quotidie hauriuntur, atque etiam quotidie renovatur, quia facile acescit.*

*Ptisana  
altera.*

Altera insuper quæ præcedenti minime cedit. *℞. Furfur. man. ij. fiat nodulus suspendendus in testa*



testa cum aq. commun. lib. v. & coquatur usque ad ebullitionem, qua prodeunte removeatur testa ab igne, relinquendo nodul. infus. per hor. quad. dimid. dein educto nodulo adde liquor. nitr. purif. ℥ij. Calide propinatur.

De hac largi quidem ac satis copiosi haustus fieri possunt, omni metu procul, quod intra corpus remoretur, cum ipsa sibi viam facile per urinas aperiat, simulque viscidos humores incidat, incisosque ac attenuatos tutissime efferat.

## H E M O P T Y S I S

seu sanguinis sputo.

*Aegineta Sententia.*

*Art. 1144.* Si cruentum sputum ex ruptis venarum vasculis originem trahit, largior sanguinis effusio comitatur, & ex evidenti quidem interdum causa: nempe lapsu ex alto, clamore & id genus; interdum vero ex abdita: puta plenitudine, aut frigidityte. Si vero ex venarum erosione sit; sanguis non confertim, sed per intervalla singillatim excreatur: quando acria quædam, & prava edulia, aut cibi abstinentia, aut acris destillatio a capite in pectus præcesserunt, & quando per inflammationes, per febres, & in doloribus evenit.

*Hemoptysis ex ruptura & erosione vasorum.*

Hunc e pulmone latum arguit, si spumofus fuerit, & ex intervallo absque ullo dolore, angustiaque extrahatur, si nihil quidem ex enumeratis, excepta interdum plenitudine, præcessit, sed victus humidior, & calidior, lavacrorumque immoderatorum usus, & minimum calidis locis domicilium fuit.

*Diagnosus ex pulmonibus.*

Qui vero cum screatu ex faucibus, per palatum ejicitur, si quando a capite destillaverit, cum

*A capite & ab œsophago.*

cum irritatione quadam, & tussî redditur, defluente eo in summitatem *asperæ* arteriæ, & iterum sursum regurgitante, eundemque acer magna ex parte catarrhus, aut capitis dolor, aut gravedo præcedit. Nonnumquam vero per palatum sanguinis fit evacuatio, idque deglutita hirudine, & ibidem alicui partium adhærescente.

*Ex aspe-* Si pituita excreatur cum leviori tussicula, *ra arte-* aut scretu, spumosumque, ac leve egeratur, *ria.* ex aspera arteria rejici cognoscito.

*A tho-* Si sanguis ater fuerit, atque in exigua frus- *race.* tula, quasque minimos globulos concretus, doloremque loci præferat, a thorace efferri portenditur, per pulmonem sive guttur facta transumptione.

*A Ven-* Atqui si per vomitionem egeratur, confessum *triculo.* est, quod ex partibus, quæ ad stomachum, aut ventriculum attinent, effertur; in quibus & per secessum, ad inferiora proritatus aliquando evacuat.

*Curatio* *Art. 1145.* Sanguinem ab instrumentis respi- *sanguis sputi* rationis disruptis, aut apertis rejicientibus, ve- *a pulmo* nam, nisi sanguinis copia erumpat, secato. *nibus.* Hujusmodi vero ægri omnes locis aeri expositis decumbant, lecto immobili, figura sublimi, caventes ne vehementer, vel respirent, vel eloquantur. Fovendæ autem afflictæ partes spongiis posca tepida imbutis. Post septimanam vero lanis succidis, cum rosaceo, aut myrteo, aut lentiscino, nunc quidem cum aceto, nunc vero cum vino adstringente. Plurima autem si fuerit ejus, quod ejicitur, copia, pollinem, & mannam cum aceto imponamus, aut alumen, & acaciam, aut malicoria, aut gallam cum aceto, aut palmulas cum polentis, aut malis cottoniis in vino austero decoctis. Posthæc vero,

& ex



& ex salicibus emplastrum superaccommodandum, præcipue si mediocris fuerit sanguinis eruptio.

Per os autem hæc sumpta conferunt: Portulaca commanducata bene facit: efficacior vero ejus succus epotus, balauſtium, rubi fructus, & flos, quercus fibrosum five liber, & quæ subiecta est putamini juglandis membranula, aliaque adstringentia hujusmodi.

*Art. 1146.* Sed qui hoc malum erosioni acceptum referunt, his maxime, si catarrhus præcesserit, opii partem semissem admiscemus. Sorbeatur insuper posca gelida, aut palmularum, aut malorum, aut pyrorum, aut capreolorum vitis, vel ejusmodi cujuspiam decoctum. Potus his qui non febriunt, vinum erit aquosum, perexiguum.

*Art. 1147.* Qui catarrho afflicti sanguinem expuunt, iis venam mox aperire convenit, extremasque partes vinculis excipere, easdemque oleo veteri calido, aut sicyonio, excepto capite, perfricare. Alantur esculentis frumentaceis, quæ succum aliquem austerum commixtum habeant, cujusmodi est mali punici, pomorum, pyrorum, aut eadem ipsa una decoquantur; sub somnum orbiculos ex succino concinnatos exhibeto. Tertia die momentum despumati mellis delingendum præbeto. Si hæc a morbo diutius permanente vincantur, detonso ad cutim capiti e stercore sylvestrium columbarum medicamentum imponito, & post tres horas medicamine dempto in balneum perducito, ne tamen caput unquam perungatur. Deinde ubi sorbitionibus enutriveris, noctu dormituro theriacen antidotum dato; postridie eadem præsta. Si malum non aboletur cucurbitula occipiti adglutinanda est.

*Art. 1148.* At si acrior humor destillaverit, devit-

*Ubi catarrhus præcesserit.*

*Jam catarrho vigente densiore.*

*Catarrho tenuiore vigente.*

devitanda est sanguinis detractio, & medicamentis profligando catarrho dicatis utendum est; sed qui, propter frigoris injuriam, sanguinem expuunt, iis calfacientibus, & exsiccantibus thorax fovendus est, confectioque e duobus pipèrum generibus suppeditanda, una cum pastillo ex succino.

*Ubi sanguis e palato e-*  
*manet.* *Art. 1149.* In his qui ex palato sanguinem expuunt, gargarismis inspissandi vim habentibus utendum, frontique, & capiti adhibenda quæ iis, qui sanguinem e naribus reddunt, expediunt.

*Ex vomitu.* *Art. 1150.* Sed qui sanguinem vomitu rejiciunt, iis cavendum, ne crebrius cibi porrigantur. Ubi vero sanguis in ventriculo grinescit, coagulum bibendum est, maxime leporinum, aut ficulneum lixivium cum aqua, aut thymum, aut cunila cum aceto. Aut lacte fissili eos evacuare oportet, aut aloe.

*Prognosis.* *Art. 1151.* Hæc cruenti sputi curatio est, quam summo exequi studio convenit, eo quod laborantibus, ex immoderata evacuatione discrimen immineat. Si affectus perseveraverit, in tabem mutationem minatur. Observandum tamen est, cum hæmorrhoides, purgationesve muliebres subliterint, erumpentem sanguinem etiam a periculis liberare. Eadem insuper accedit valetudinis commoditas iis, qui vase ob redundantiam rupto, sanguinem edunt, nisi propter ulcus, aut immodicam inanitionem lædantur.

#### *Ettmulleri sententia.*

*Hæmoptysis.* *Art. 1152.* Hæmoptysis est quando sanguis ex pulmonibus per os tussiendo ejicitur, aliquando, sed rarius, sine tussi; sanguis rejicitur vel flori-



floridus vel semigrumosus, facile vel difficulter, cum vel sine dolore, spumofus vel non. Si ex pulmonibus provenit; sæpius *vomicam*, *empyema*, aut *peripneumoniam*, & hinc *Phthisin* post se trahit.

*Art. 1153.* Convenit *venesectio*, *purgatio vite-* *Curatio.*  
tur; *diuretica* & *diaphoretica* locum habent; *opia-*  
*ta* sunt perquam proficua; in specie semen *hyo-*  
*sciami* est nobile specificum tam veteribus quam  
modernis commendatum; cavendum est tamen  
in ejus usu ob vim narcoticam, ne exhibeatur in  
nimia dosi; sed tutius est propinari repetitis vi-  
cibus; maniam etenim inducit nimis larga do-  
sis. Respiciendum est ad acrimoniam sanguinis  
in hujus mali cura; hoc pacto, quæ in capite  
de *hæmorrhagia* tradita sunt; hic locum habent.  
*Hedera terrestris* est plane mirabilis; item suc-  
cus *urticæ*; *catechu*; *trochisc. de carabe*, *oleum li-*  
*ni* cochleatim sumptum mira præstat; *ol. vitriol.*  
*Succ. cydon. decoct. hord. cum passul. min.*

*Art. 1154.* „ *Hæmoptysis* est vel *accidentalis* *Acciden-*  
„ vel *habitualis*; posterior est phthiseos signum: *talis vel*  
„ *cortice Peruv.* optime & tutissime curatur, ad- *habitua-*  
„ stringentibus sistitur, ut *bol. armen. sang. dra-* *lis.*  
„ *con. lapid. hematit. &c. Morton.*

*Art. 1155.* *Mantissa. Elect. Boylean. elect. Pe-* *Remedia*  
*ruv. astring. elect. styptic. emulsio styptic. haust. japon.* *varia.*  
*loboch. japon pulv. hæmoptoicus, stypticum regis.*  
*Syrupus Boylean. succus urtic. menth.* sed præ reli-  
quis *heder. terrest.* „ In hæmoptoe *accidentali* de-  
„ sperata, cæteris incassum tentatis; (sicut in  
„ aliis omnibus hæmorrhagiis) medici expecta-  
„ tionem rarissime frustratur sequens remedium,  
*℞. Aq. plantag. vin. rub. astring. ana ℥ss. syr. pa-*  
*pav. errat. ℥ij. ol. vitriol. quantum lingua ferre po-*  
*test; f. julap. suffitus ex calce viv. & acet. in ex-*  
*tremis eximie confert.*

*Barbeyraci sententia.*

*Hemo-  
ptysis  
definitio.* **Art. 1156.** Hemoptysis proprie eum sanguinis sputum significat, qui ullo absque manifestæ inflammationis signo, e pulmonibus profluit.

Etsi ab hoc morbo pulmones sæpe corripuntur, merito tamen admiramur frequentius adhuc eosdem non corripì, quando delicatulam eorum structuram proprius consideramus instar telæ subtilissimæ ex vasculis innumeras flexiones, & curvaturas edentibus intextæ concinnatam, vix sane concipere possumus quomodo sanguis, qui per reliqua viscera summa rapiditate fertur, hac libere trajiciatur.

*o Hujus  
morbi  
internæ  
cause.* **Art. 1157.** Internæ hujusce morbi causæ ab immodica sanguinis copia, vel a prava ejus qualitate, vel etiam a vitiosa vasorum, & organicæ structuræ conformatione immediate desumenda. Quando sanguis quantitate peccat, simulque nimia velocitate vasa pulmonalia perreptat, facile intelligitur, eundem per arteriarum extremitates sibi posse viam aperire, vel dilatatis enormiter venis easdem disrumpere. Quando vero vitium habet in qualitate, seu quando acris non minus, quam subtilis eodem tempore existit, non solum arteriarum extremitates aperire valet, verum etiam ob acredinem, & tenuitatem sibi potest, per medias vasorum tunicas, exitum expedire. Ita etiam si aliquando crassior est, & in coagulationem pronus, ut in scorbuto, vel hypochondriaca affectione evenit, cum æque citius a venis excipi nequeat, ac defertur ab arteriis, in eisdem accumulatus tunicas aperit, & qua data porta per aerea pulmonum spatia diffusus hemoptysin inde producit.

Quan-



Quando sanguinis sputum a prava vasorum, conformatione proficiscitur, hæc in alterutro horum consistit; vel quod arteriarum tunicæ laxæ nimis mollesque reperiuntur, unde earum extremitates facile, dehiscendo contentum sanguinem effundunt; vel quod, cum venæ tenuiores adsint mollioresque, facili negotio rumpuntur, vel in vehementi quadam corporis exercitatione, & commotione, vel etiam in ipsius sanguinis præternaturali immodicaque agitatione.

Id ipsum quoque dicendum est, de causis externis sanguinis sputum producentibus; quarum aliæ immediate, & per se eundem faciunt; ut tussis vehemens, & diuturna, vociferationes, cantus magno vocis conatu editi, pulmonum vulnera, similiaque quæ venas disrumpere valent; aliæ vero mediante plethora sputum sanguinis excitant, vel ob nimiam ipsius massæ sanguineæ fermentationem, quemadmodum in completissima corporis valetudine ex crapula, præcipue vero cum mero, aut carniū sale, & pipere conditarum abusu, unde noxia quædam falsuginositas, & acredo per sanguinem generatur, vel ex suppressis menstruis, & hæmorrhoidibus; vel ex diuturnis vigiliis, vel demum ab omni genere vehementiarum exercitationum.

Quomodocumque vero sanguinis sputum generetur, aut ex plenitudine, aut ab immodica effervescentia, aut vero ex sanguinis acredine, & tenuitate tantum, hoc sane verum est: frequentius ab extremitatibus arteriarum laxatis, dilatatisque egredi; quam a ruptis pulmonum venis.

*Art. 1158.* Quoniam sanguis per os a stomacho, gingivis, naso, & pulmonibus proficisci potest, recensenda hic nobis signa proponimus,

*Diagnosis.*

*Allen. Pars II.*

C

qui-

quibus innotescat, quam a parte corporis emanet, dum ore rejicitur.

1<sup>o</sup>. Tussis cum sanguinis excreatu conjuncta certissimum signum exhibet eundem a pulmonibus derivare, quare observatum insuper habemus ab hoc viscere derivantem rubicundo admodum purpureoque colore insigniri, & non nihil spumæ gerere, quod ab aeris nitrosa substantia in pulmonibus ipsi largitur.

2<sup>o</sup>. Quando sanguis a gingivis venit, simplex sputatio id ipsum ostendit, quemadmodum etiam si a palato proficiscatur.

3<sup>o</sup>. Ex naso prodeuntem, irritatio, quæ simul in ejus cavitatibus persentitur, patefacit, uti etiam quod naribus emunctis viscidum excrementum sanguineis striis notatum prodit.

Sicut tussis reditum sanguinem a pulmonibus exeuntem ostendit, ita modus quo extussitur, ejusque quantitas normam exhibet arguendi, quonam a pulmonum loco proficiscatur. Quare si sensu quodam irritationis, & puncturæ circa fauces intimiores prægresso, cum parva, vel nulla tussi, exilis admodum sanguinis copia, pauca pituita mixta excreatur, inditium dat, eundem a Larynge venire, quod ab extremitate quadam arteriæ pulmonalis vel bronchialis, quas aorta asperæ arteriæ tribuit, in ipsius Laryngis cavitatem defluerit. Si hujusmodi sanguinis extravasatio per somnum accidit, sæpe fit ut a motu respirationis a Larynge in fauces migrans mane exoriente excreetur, quin homo sanguinei hujusmodi excreatus factus sit compos.

Si vero sanguis vehementer, & copiose exeat, eodemque tempore valida tussi æger prematur, adeo ut eundem vomitu potius, quam excreatu reddere videatur, dicendum est talem sanguinem velocissime semper erumpentem, &

spu-



spumantem a rupto insigni quodam pulmonum vase proficisci, hac tamen habita distinctione, quod qui ab arteriis est, impetuosius semper, copiosiusque emanare solet eo, quia venis redditur, a quibus etiam tantum erosus minus ac ruptis emanat.

Quodsi demum sanguis nisi parva quantitate prodeat, cum tussi tamen profunda, sæpiusque reiterata, signum est a pulmonalibus vesiculis egredi, in quibus a reticuli vasculis exsudatus, cogi potuit, indeque crebris ictibus tussis extrudi.

*Art. 1159.* Quoad prognosin spectat, sanguinis excreatus periculo numquam caret, quamvis nonnulli adsint, pro quibus minus periculalit, quam pro aliis. Etenim si quis robusti vegetique temperamenti, in hunc morbum incidat ob evidentem quamlibet causam, spes est eundem in valetudinis gratiam restituere; contra vero si debilis fuerit, delicatulæque constitutionis, vix eo usque perducitur potest, quin in Phthisin denique incidet; maxime vero si respectu ejus hæmoptysis, tamquam gentilitius morbus haberi debent, cum sæpissime observetur, eos, qui hereditario jure in hunc morbum proni sunt, pectus compressum gerere, sanguinem acrem subtilemque, pulmones debiles, atque tussi levi de causa exerceri.

Periculosum itidem est sanguinis sputum pro iis, qui peripneumoniam, vel aliquod aliud pectoris vitium subierunt, in primis vero si obstructio quædam, aut mala pulmonum adsit conformatio.

Quantum ad diversas excreatum species, ii qui sanguinem a trachæa exeuntem ferunt, omni periculo sæpissime sunt immunes, qui a tenuioribus pulmonum vasculis sanguinis fibras mu-



tuantur, morbum non raro curabilem ostendunt, vel saltem non tam periculofum, ut quando hæmoptysin a ruptura cujusvis insignioris pulmonum vasis exoriri comperitur.

Præter malam conformationem pulmonum, eorumque debilitatem, in iis qui hæreditariam hæmoptysin patiuntur, duo alia insuper hujus morbi difficilem admodum curationem faciunt: videlicet ipsius pulmonis structura, ejusque perpetuus motus; nam quoad primum, cum totius pulmonis textura omnigenis vasculis, nota quidem interjecta fibrosa, aut carnea substantia coalescat, difficillimum est, rupto horum alterutro rursus coagmentari posse; quoad alterum vero cum iidem pulmones respirationis munere perpetuo moveantur, fieri nequit, ut semel divisi iterum conjungantur. Huic conjunctioni seu cicatrificationi comparandæ, summa profecto quies necessaria videtur.

*Curatio.* Art. 1160. Ut rite hujus morbi curatio instituat, hæc duo præ ceteris observanda veniunt; primum namque ut prohibeatur, ne in locum affectum copia sanguinis influat: alterum ut continui solutio reintegretur.

Ad primam indicationem facit, ut sanguinis quantitas iminuat, ejusque effervescentia, & intemperies corrigatur, atque alibi plenitudo dirigatur. Hæc omnia egregie phlebotomia non minus, quam purgantibus cum rhabarbaro sociatis, jalapiis, emulsionibus, atque demum lacte, & balneis tepentibus ex aqua communi præstari possunt.

Ad alteram indicationem, qua vasorum coagmentatio requiritur, spectant adstringentia, & conglutinantia, ut succus urticæ, & plantaginis, sed validiora etiam conveniunt, ut terra sigillata, boll. armenia, & sanguis draconis.

Lau-



Laudanum & chinachina itidem huic morbo auxiliantur, præcipue vero chinachina, quando sanguinis sputo febris supervenit, cum eadem implicantibus suis particulis nimium humorum motum compescat.

Præ omnibus autem vasa, quo magis fieri potest, exhaustiunda sunt; & si necessitas urgeat bis, vel ter in die venam secare expedit modo in brachio modo vicissim in pede, ut inde tota sanguinis massa imminuta minor ejus quantitas ad pulmones pertingat.

Julapia ægro mane, & vespere porrigenda hujusmodi sint. *℞. Aq. plant. ros. ana unc. iij. corall. rubr. pp. ʒj. syrup. ros. sicc. cydonior. ana unc. sem. laud. gr. j. vel ij. misce.* *Julapia.*

Nonnihil sputo sanguinis inhibito ad mitem purgationem deveniendum sequenti modo excitandam. *℞. Pulv. cass. unc. j. rhabarb. opt. ʒj. aq. millefol. unc. vj. inf. per aliquot hor. super ciner. calid. colat. add. mann. unc. j. f. pot.* *Infusio purgati- va.*

Cavendum hic a fenna, jalappa aliisque validioribus purgativis, quia sanguinis massam nimis agitando vasa simul dilatarent, quæ disrupta, & hiantia hæmoptysin exasperarent. Succum vero urticæ, & plantaginis seorsim quoque ingeri possunt, vel cum jure quodam refrigerante mixti.

Quoad cetera adstringentia ea opii forma præscribi possunt, ut sequitur. *℞. Conserv. consolid. maj. rosar. ana unc. iij. bol. armen. terre sigill. ana ʒiij. coral. rub. pp. ʒij. syrup. cydonior. vel ros. sicc. q. s. f. opiatum de quo capiat æger singulo mane unc. semis superbibendo aq. rosar. unc. ij. vel iij. & sic continuando x. vel xij. diebus.* *Opiatum.*

Toto hujusmodi opiato absumpto eadem infusione superius descripta iterum æger purgabitur, postmodum lac asinum jubebis diu con-

tinuandum, & durante ejus usu qualibet decima die alvum purgabis.

Finito lactis usu semicupia, aut balnea tepida, ex aqua communi adhibebuntur per dies quindecim, & quotiescumque æger exhibit de balneo hordei cremore nutriveris.

Quousque prædicti opiat, & lactis usus perseverabit, bis in hebdomada capiat æger vespere, vel cubitum iturus aq. plantag. cyathum, cum syrup. papav. alb. ℥iij. commixtæ.

Confert etiam trochiscorum karabæ, & sanguinis draconis usus, quæ remedia cum aq. consolid. maj. plantag. vel millefolii julapii forma commode ingeruntur.

*Regimen.* Art. 1161. Quatenus ad victus rationem toto morbi stadio observandam, caveri debet, ne jura nimis nutrientia ex volatilibus, vitulo, vervece &c. exhibeantur; nam salia volatilia, sulphureæque partes, quibus hujusmodi carnes abundant, cum nihil magis præstare possint, quam ut sanguinis massam in fermentationem adigant, plurimum nocere possunt, locaque affecta novis congestionibus opprimere. Quare satius erit juscula refrigerantia, minusque nutrientia præscribere, cujusmodi sunt ea, quæ ex vitulo quidem, & vervece componuntur, sed additis simul herbis refrigerantibus, adstringentibusque satis larga copia: ut lactuca, portulaca, borragine, plantag. millefol. rad. consolid. & althææ.

Hujusmodi vero jusculis, aliquando hordeacea, avenacea, cremor orizæ, amygdalata præferri debent; quia præter quam quod multum nutrire valent, edulcorando etiam sanguini & densando, refrigerandoque egregie inserviunt, quibus equidem hoc vigente morbo maxime indiget, cum acris simul tenuis, & calefactus ut plurimum inveniat.

Pro



Pro potu vulgari utatur æger ptisana ex hordeo cum ros. rub. fol. consolid. maj. & plantaginib.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1162.* Notavit olim Hippocrates, & etiamnum vulgi observatio est, hæmoptyses sæpissime hyeme flante Borea accidere.

*Observationis  
quædam  
singulares.*

Qui spumofum sanguinem vomunt, dolore infra septum transversum non existente, de Pulmonibus vomunt; qui sanguinem spumofum spuunt præcordium dextrum dolentes, de hepate spuunt, & moriuntur. Tres item sunt spumæ gradus in concreto sanguine; ex toto spumans pulmonis carne, aut plurimum spumans e pulmonis vasis, aut spumæ permixtus ex thorace. A pulmone prodiens sanguis, ab eo, qui a Thorace, distinguitur, ex eo quod a pulmone est spumofus, majori copia, & sine dolore; a thorace vero nigricans, paucior, & ut plurimum cum dolore.

Hæmoptysis est, vel accidentalis, vel habitualis. Posterior est Phthyseos signum. Cortice peruviano optime, & tutissime curatur. Eodem etiam hæmorrhagia narium a febre pendens compescitur.

*Art. 1163.* Egregie docet Hippocrates *lib. de morbis* sanguinem expuenti necesse esse, nec tussim supervenire, nec difficultatem respirationis, neque febrem, neque sanguinis sputum denuo recrudescere; secus enim verendum est ne sanguinis sputum in puris sputum definat, ac tabem. Quod si in ullo cruento sputo contingit, in eo maxime occurrit, qui a vasorum erosione proficiscitur. Methodus igitur præservativa in hoc potissimum sita est, ut præcave-

*Hæmoptysis  
transitus in  
Phthy-*  
*sin.*

atur; ne tussis superveniat, & difficultas respirationis, & alia recensita symptomata. Id vero comparatur a sequentis destillati usu diu continuato.

*Destillatum.* ℞. Ser. lact. Caprin. vel vaccin. lib. xx. fol. heder. terr. veronic. flor. hyperic. consol. min. polyg. anaman. j. Caudar. cancror. cum suis corticibus contus. pulp. ranar ana lib. j. sem. Jujubar. a nucleo separatar. lib. j. misce f. s. a. destill. in B. M. & detur ad unc. x. quotidie.

*Decoctum.* Hujus loco sequens decoctum valet. ℞. Rad. chin. ℥ij. ebur. corn. cer. ras. ana ℥j. Hord. mundat. ℥ij. sem. melon. cucurbit. ana unc. j. flor. hyperic. man. j. Car. vitul. unc. iij. ranar. excortic. caud. cancror. ana unc. j. aq. font. lib. j. misce in vase vitreo circulatorio bene clauso in M. B. f. a. f. ebullitio usque ad consumpt. tertiæ partis; colatura detur quotidie per xxx. dies.

*Præservatio.*

Præservatio ab hæmoptysi fit diætâ conveniente, instituta etiam venæ sectione, si adsit plethora, bis in anno administrata, purgatione quater in anno facta cum infuso sennæ, rhabarb. tamarind. cum manna; utiliter etiam per aliquod tempus singulis diebus sumi potest rhabarb. tost. ℥j. lac asinin. vel caprin. calybeat. per mensem adhibeatur, & affigatur cauterium. *Weinhart.*

## PHTHYSIS PULMONALIS.

*Aretæi sententia.*

*Phthisis initium unde?* Art. 1165. Si ab externa causa abscessu in pulmonibus facto, aut a longinqua tussi, aut a sanguinis rejectione ægri pus extussiant Phthysici nominantur.

Si pectus autem costave suppuraverit, materia-



riæque per pulmones traducta eosdem corrodat; hoc vitium non ulterius Empyema i. e. purulentiam, sed Phthoem i. e. corruptionem appellato, nam simul adest, & ignis assiduus qui nonnumquam intermittere videtur sudore, & frigore interdum alternantibus.

*Art. 1166.* Hæc enim proprie Phthoen *Diagnosis* sequuntur; caliditas videlicet in noctem emicans, *sis* interdiu rursus in visceribus delitescens; patet autem hujusmodi ægrotantium angor, imbecillitas & colliquatio. In his arteriarum motiones parvæ, & imbecilles fiunt, vigilant, color languet, aliaque omnia patiuntur, quotquot comitari solent febricitantes. At excreatum species prope infinitæ sunt, lividorum, atrorum, purorum, ac sincerorum, aut pallido & albo, aut albo, & viridi mixtorum, latorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, fluidorum odore carentium, aut foede olentium. Simul vero & his adest pectoris gravitas, angor, intolerantia, cibi fastidium, vespertina extremorum frigiditas, & matutina caliditas; sudor usque ad pectus caliditate molestior, per tussim varia qualia memoravimus, extruduntur: vox raucescit: cervix nonnihil tortuosa est, gracilis, non versatilis, sed veluti rigens atque intenta: digitus tenues sed articuli crassi sunt, ungues adunci fiunt, nares acuminatæ, & graciles; malæ extantes, & rubidæ, oculi cavi, lucidi, micantes: facies tumida, excarnis, pallida, seu livida, gingivæ dentibus inhærent, ita etiam labia, adeo ut ridentibus assimilantur, totum corpus denique in omnibus cadaveris speciem præ macie, & summa carnis absorptione refert.

*Art. 1167.* Hujusmodi ægrotis, si alvus per- *Prognosis* turbetur actum est; Senes in hunc morbum frequenter non incidunt, sed si incidant minime

eva-

evadunt. Juvenes usque ad florentem, & consistentem ætatem post sanguinis rejectionem in phthisin prolabuntur; inde sanescunt quidem, sed non facile. Pueri assidue usque ad Phthisin tussi divexati facile ad sanitatem redeunt.

Habitus vero in id vitium proni sunt graciles, delicatique, albidi, rariore pectore, gutture oblongo, alasque prominentes habentes. Regiones autem frigidaæ atque humidaæ hujusmodi affectus germinant.

*Curatio.* *Art. 1168.* Quoniam marina falsugo ulceribus quemdam sui similem succum communicat, in mari gestatio fieri poterit, ibique vitam degere. A gestatione quiete concessa utendum pingui oleo: multoties enim id solum pro omni alimento satis fuit. Lac ulceribus dulce subsidium est, & quovis oleo benignius. Si quis multum lactis potat nullo alio eget alimento. In hoc igitur morbo bonum medicamentum est lac, ejusdemque alimentum efficitur. Optima ideo sunt, & puls & bellaria, & alica lota, & quæcumque edulia, quæ ex lacte fiunt. Quod si & alia esca æger indiget; ejusdem generis est ptisanæ cremor concoctu facilis, cui saporis jucunditatem affert ligustici coma, pulegium, mentha, salis exiguum, acetum, aut mel. Licet & ptisanam in alicam permutare, minus enim flatuosa, & concoctu facilior est.

*Anti-quorum alia remedia.* *Art. 1169.* Sed tabescentibus lac convenire docuit *Hippocrates* modo non valde febricitent; eodemque insuper statim utere oportere, & caput eis tondere. *Paulus* vero *Aegineta* laudat porra capitata in chondri, aut ptisanæ sorbitionibus liquefacta; & pro potu aquam pluvialem, & melicratum. Ad tussim graviter urgentem thymum, & hyssopum cum succo glycyrrhizæ melle decocto excepta, & in tessellas redacta, sub



sub lingua continenda commendat. Ceterum convenire, ait, phthysicis *Mithridatis* antidotu ex viperis confecta, atque etiam *Hesdre* antidotus, & bolus Armenia. Alibi etiam sequentem linctum efficacem habet: *℞. Marrub. comarum lib. j. aq. commun. cotilia vj. coq. ad tertie partis absorptionem. Colatura mel addito, & cochleatim exhibeto.*

### Sydenhami sententia.

*Art. 1170.* Phthisis pulmonaris a frigore hyemali plerumque ortum ducit, & gradatim cre-  
scit, viz. ab humore in pulmones delapso, unde *catarrhi* ritu eos ita jugiter irritat, ut *russis* inde excitetur tantum non continua; & progressu temporis symptomata reliqua succedunt, & morbus frequenter evadit incurabilis.

*Art. 1171.* Tentandum est tamen defluxionem in pulmones minuere *venesectione*, & *catharsis* leni, tum *pectoralibus* ad varios morbi status accommodatis, scilicet *incrassantibus*, vel *attenuantibus*, & febrem *hecticam* *temperantibus* cum *emulsionibus*, *lacte asinino*, &c. & postremo *ulcus sanantibus* cum *balsamicis*, *opobals. dos. gr. xx.* sed hoc non est sumendum nisi prægressis *evacuacionibus* debitis: sed palmarium hujusce morbi præsidium est, ut æger quotidie equo vehatur; & qui se huic corporis exercitio sanandum tradit, nullis jam diætæ legibus adstrictus, nullo cibi potusve genere privandus est; cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur: hoc solummodo observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quam si puer aut juvenis esset, & sane haud multo certius *cortex Peruvianus* febri intermittenti, quam in hac ætate

Phthisis  
pulmonaris.

Equitationis  
beneficium.

equi-

*Tumor equitatio* phthisi medetur. Quibusdam eorum ;  
*in collo.* qui ex hac methodo convaluere, *tumor* in collo  
 exortus est non multum a *scrophulis* abludens.

*Pragno-* *Art. 1172.* In Phthisi materia purulenta per  
*sis.* tussim excreta in ignem coniecta tetrum spirat  
 odorem, & immissa in vas aqua repletum, fun-  
 dum petit. Sudores nocturni, genæ livescentes,  
 faciei pallor, nares exacutæ, temporum colla-  
 psus, unguium incurvatio, capillorum deflu-  
 xio, & alvi profluvium colliquativum, mortem  
 statim subsecuturam denuntiant. Inter chroni-

*Facies* cos Phthisis *duos fere trientes* jugulat. , Nasus  
*Hippo-* , acutus, oculi concavi, collapso tempora, au-  
*craticæ.* , res frigida & contracta, cutis circa frontem  
 , dura, intenta & resiccata, totiusque faciei  
 , color subviridis, niger, aut lividus, lethale .  
 , Hæc est illa *facies Hippocratica* vulgo dicta ,  
 , ob traditam ab *Hippocrate* descriptionem ,  
 , quæ humidicalidique nativi consumptionem ,  
 , adeoque mox futuram mortem indicat.

#### *Mortoni sententia.*

*Phthise-* *Art. 1173.* Phthisis pulmonaris pendet aliquan-  
*do cau-* do a mala conformatione pectoris, estque illa  
*sa &* vel *naturalis*, quando pectus sit nimis angu-  
*diagno-* stum, cervix longior quam par est, omoplatæ  
*sis.* tanquam alæ videntur; vel *accidentalis*, ubi  
 curvitas vel pectoris distortio. Signum Phthiseos  
 appropinquantis primum est *tussis arida*, quæ  
 per menses aliquot durat; catarrhus vero sim-  
 plex est, humorosus & brevis. Vomitus vel vo-  
 mendi dispositio post passum tussi prædicta con-  
 citata, est signum Phthiseos certissimum. Signum  
 secundum est *febris hectica* cum calore in volis  
 manuum, & rubore genarum præcipue post pa-  
 ssam. Tertium *extenuatio* partium solidarum in

extre-



extremis digitorum maxime conspicua ; unde incurvatio unguium ; & postremo febris *putrida* hectica superveniens.

*Art. 1174.* Inter signa *pathognomonica* phthi- *Phthi-*  
seos confirmata ; primum est febris *inflamma-* *seos signa*  
*toria*, inflammatis pulmonum tuberculis , quæ *patho-*  
febris tanquam febres aliæ inflammatoriæ tra- *gnomo-*  
ctanda est , viz. *visu tenui* , medicamentis *pe-* *nica.*  
*ctoralibus* , & *expectorantibus* , *linimentis* , & præ-  
cipue *venesectione* , utcumque emaciatus sit æger  
( est enim *peripneumonia* cum pulsu ferrato ) *oli-*  
*lini* est remedium in hoc casu nunquam satis  
laudandum . Febrem hanc inflammatoriam se-  
quitur *putrida intermittens* , quæ fit a suppu-  
ratione tuberculorum ob *venesectionem* omis-  
sam , vel nimis parce celebratam , vel aliter ;  
hoc autem est signum pulmonum corruptorum  
certissimum . *Cortice Peruviano* non profligatur ,  
neque *antihæctic. Poterii* , aut ullo alio remedio ,  
ulcere prius curato ; hanc autem comitantur in-  
signes aliquot evacuationes , seu corporis colli-  
quationes ( & hoc est signum *pathognomicum se-*  
*cundum* ) *expectoratio* materiæ purulentæ ( pus  
phthiseos confirmatæ est graveolens , & etiam si  
sit spissum , non tamen glutinosum seu tenax ,  
sed fluidum , colorum variorum , viz. flavi , vi-  
ridis , sed frequentius cinerei ) . Sudores colli-  
quativi , quos si arte obstruentur , insequuntur  
tumores hydropici in pectore vel cruribus , sive  
dysenteria vel diarrhœa . Signum ultimum est  
*salivatio* , unde calor gutturis præternaturalis ,  
& aphthæ pertinaces , incurabiles , ( mortem non  
procul abesse plerumque nunciantes . )

*Art. 1175.* Ad therapiam quod attinet , in *Curatio.*  
principio *venesectio* , *lenis purgatio* cum *pil. sto-*  
*mach. Ruffi* , *tinctur. sacr.* ( *calomel.* ) &c. con-  
veniunt *diuretica* , *millepedes viv.* & *preparat.*  
*bals.*



*bals. sulph. terebinth. acidula. Diaphoretica, antimon. diaphoret. ceruss. antimon. privatim decoctum lignorum (in aq. calc.)* si adsit catarrhus, & calor hecticus, cathartici*is opiat*a sunt admiscenda, reliquis antecellit *pil. cynogloss. seu styrac.* Radatur caput, & aperiuntur *fonticuli.* (Atque hæc est summa curæ *rationalis & radicalis phthiseos pulmonaris.* In confesso est phthisicos confirmatos rarissime curari; non tamen idcirco plane sunt deferendi; cum *palliatiua cura* debeat illis, qui non possunt curari perfecte.)

*Diarrhœa.*

*Art. 1176.* In diarrhœa *decoctum album* pro potu communi; sed *opium* est unicum præsidium, *elect. ad diarrhœam seq.* in praxi nostrâ maxime efficax expertus sum. *24. Ocul. cancr. præp. ʒiʒ. coral. rub. præp. matr. perlar. ana ʒij. margar. præp. ʒʒ. spec. confect. de hyacinth. ʒj. ol. cinnam. chym. gr. iv. miv. cydon. ʒj. laudan. Lond. sp. croc. solut. gr. vj. syr. balsamic. q. s. m. f. elect.* Ad acrimoniam humorum obtundendam injiciatur quandoque enema ex *jusculo ovîn.* cum *diascord. ʒʒ. opiat*a bene ferunt hoc in casu ob metasthesin materiæ morbificæ a pulmonibus ad intestina: diarrhœa tamen non est temere aut nimis cito sistenda; ne gravius malum accideret; quod optime præcavetur *expectorantia & lubricantia* certis intervallis propinando; & diarrhœam moderando potius quam penitus vincendo:

*Tussis.*

*Art. 1177.* Ad tussim importunam, & vigilias pertinaces levamen vix procurandum est, nisi ab *opio*; cum cautela tamen exhibendum est; parce, & non sine maxima necessitate; ne languores, dyspœnam, extremorum frigus, &c. inferat, & mortem properet, & medico dedecus pariat. Hic in usum veniunt *linctus, trochisci, &c.*

*Art.*



Art. 1178. Sudores colliquativi, nisi sunt valde immodici, sunt tolerandi, sin vero sint maxime profusi, ita, ut languores usque ad deliquium fere inducant; *astringentibus*; & aliis propriis adminiculis moderari debent. Sequentē julap. uti soleo; ℞. Aq. tormentil. germ. querc. plantag. ana ℥iij. cinnam. ℥iv. mirab. ℥j. margar. preparat. coral. rub. prap. ana ℥ij. bol. ver. sang. dracon. ana ℥ss. ter. japon. ℥j. syr. myrr. ℥i℥. sp. vitriol. (dulg.) q.s. ad gratam aciditatem. m. f. julap. sumat ℥ij. vel iij. omni bihorio vel trihorio phiala bene agitata.

Sudores  
colli-  
quati-  
vi.

*Baynardi sententia.*

Art. 1179., Si calor hecticus sit insignis, & phthisis celeri cursu progrediatur; convenit *dieta lactea*; & *lac asinum* (si comparari possit) eligendum est; quoniam est minus crassum: huic vero *succedaneum* adinvenit; quod etiam valde commendat *clarissimus Baynard* in *appendice ad psychrolusiam*, nimirum *serum* sive *lac butyraceum*; quamplurimis (inquit) indicationibus satisfacit; refrigerat; humectat; nutrit; &c. & deinde inferius pergit laudatus author, fidenter affirmans, & expertus loquens se compertum habuisse, quod plures ex continuato usu *hujusce lactis* a caloribus præternaturalibus; & etiam hecticis liberati fuissent; iisque, quibus calor est ingens, & sitis importuna leviter acidulum præberi debuisset, recens vero & dulce magis nutriat.

Ad fe-  
brem he-  
cticam.

Et revera hæc omnia merito dicta esse arbitror: Ego etenim plus semel *raucedinem* per-  
tinacem, & *catarrhum* mediante hoc re-  
medio, utcunque vulgari feliciter sustuli; &

in



„ in febre *hectica* magno fuisse commodo pro  
 „ certo deprehendi. “

*Ettmulleri sententia.*

*Phthi-  
ses va-  
ria.*

*Art. 1180.* Phthifici dicuntur κατ' ἐξοχὴν ii, qui ulcere pulmonum laborant, & habent febrē hecticā conjunctā; eandem etiā habent ii, qui phthisi renali, jecorali, a vitio mesenterii, &c. laborant, tabidi evadunt. Tabes a glandularum mesenterii vitio solet habere abdomen inflatum, ac tumidum cum dolore in ejus profundo obtuso, ac plus minus gravativo, itemque cum renitente hinc inde sparsa duritie circa umbilicum observabili.

*Art. 1181.* Tussis phthificorum non statim est *pulmonalis*, sed *stomachalis*, cui tandem acrioris lymphæ occasione per glandulas asperæ arteriæ, aut pulmonum excretæ tussis pulmonalis supervenit. Materia viscida in aquam expectata supernatat, pus vero fundum petit. Materia pinguis phthificorum urinæ innatat.

*Curatio.*

*Art. 1182.* Vomitoria sunt optima in omni phthisi incipiente, maxime si malum sit a vitio stomachi: *purgantia* sunt omnino vitanda; *syrupi* & *saccharata* omnia plus nocent, quam profunt. *Lindanus* refert se curasse quemdam domesticum atrophia laborantem solo decocto ex *radice helenii* cum *passulis* & *glycyrrhiza*, *adjecta 10<sup>ma</sup> parte vini Hispanici*, nam & hoc nutrit egregie; laudatur *rob. passularum*.

*Art. 1183.* Febris hecticæ hæc tria sunt quasi signa *pathognomonica*, 1<sup>o</sup>. calor ipsi ægro fere occultus vix sensibilis, ab omni pastu post aliquot horas auctus. 2<sup>o</sup>. Adest *absumptio* & *extenuatio* corporis successiva. 3<sup>o</sup>. *Pulsus celer, parvus, frequens*



quens, debilis & subinde durus, efflorescit plerumque facies colore plus minus rubicundo, & sudores nocturni infestant; accidit etiam frequenter capillorum defluvium, totius corporis lassitudo, frequens lipothymia; somnus horis matutinis est rarus; ægri conqueruntur de æstu interno. Hæctica incipiens *difficillime* cognoscitur, *facillime* curatur; confirmata e contra; in statu morbi urina in summitate pellem habet quasi oleaginosam, aranearum telis similem. In *saturno* singulare quid latet contra febrem hæcticam, & internas viscerum exulcerationes, & corruptelas. Laudantur *antimon. diaphoret.* & *antihectic.* *Poterii*, & *decoct. e lignis* præ reliquis in lymphæ acrimonia, ut & *sperma ceti*. Ad ulcus pulmonum abstergendum, & sordes nimis hærentes eliminandas optima sunt ex *tabaco* remedia, utpote quæ præter vim expectorandi, *vulnerariam* quoque possident. Potus ordinarius phthificorum, hæcticorumque commodissime conditur *fumo sulphuris* ad imitationem *Helmontii*. Immo & *fumus sulphuris* cum aliis per os attractus singulare est experimentum cujusdam *medici Hiberni*, quo aliquot desperatos phthificos curavit, uti refert *Boyle*.

### Vuillisi sententia.

*Art. 1184.* Communis observatio est, regiones istas, sive in *Anglia*, sive in *Belgio*, ubi *cespite* ignes nutriantur, & odorem valde sulphureum spirant, tabem rarius infestare; quinimo loca ista phthisi obnoxiiis, aut ea laborantibus maxime salubria, & non raro sanativa existere; cui accidit, quod suffumigium ex *sulphure*, & *arsenico* (quod sulphure copioso refertum est) pro curandis pulmonum ulceribus pene deplorat

*De virtutibus  
cespitis  
cremati  
& aliorum  
remediorum.*

ratis remedium licet ultimum, efficacissimum tamen habetur. Haud novi præstantius remedium in tussi quacunque, modo febris absit, quam tinct. *sulph.* ( sine empyreumate ) *dos.* a gr. vj. ad x. mane, & vesperi in coch. syrup. idonei.

### Sylvii sententia.

*Laus balsami sulphuris anisati.* *Art. 1185.* Nullum haftenus reperii medicamentum, quod vel externe vel interne usurpatum citius tutiusve non tantum mundaverit, sed insuper consolidaverit recentia ulcera, atque *sulphuris balsamum*: cæteris vero omnibus imprimis præfero istud cum *oleo anisi* paratum, modo lente paretur, ita enim longe gratior fiet, & convenientior, alias empyreuma redollet, & acrior existit. Insuper pus ipsum tenuius, fluidiusque reddit, adeoque ipsius excretionem promovet, ac faciliat. Ad mundati ulceris consolidationem quoque multum laudari solent *rosæ rubræ conservæ*; & aliis præparationibus præfero decoctum *rosarum rubr.* cum forti expressione paucis *saccharo* edulcoratum.

### Farrago sententiarum.

*Quibus potissimum tabes accidere solet.* *Art. 1186.* Tabes maxime fit ætatibus ab anno 18. usque ad 35. *Hippocr. aphor.* In aliis ætatibus evenire potest, at in isto vitæ stadio multo periculiosior existit.

*phthisis est morbus contagiosus.* *Art. 1187.* Phthisis est morbus contagiosus, per indusia, per vestes, per lintea, per lectos, phthisin communicatam fuisse mille docent exempla ( inquit *Bonetus* ) „ extant quidem hujusce „ *contagii* nonnulla exempla, sed, pace viri, „ non sunt adeo frequentia.

*Art.*



Art. 1188. Quandiu tabes est in primo gradu, & probabile est sanguinem non esse extravasatum, ulcusque nondum factum, debet ante usum decoct. ex lignis, & dum purgantibus utimur, adhiberi *mercurius dul.* non quidem cum purgantibus simul eodem die, sed sine purgantibus post aliquot dies. *Pitcar. in MS.*

Art. 1189. Hoc constanter affirmo me contra omnium fere scriptorum practicorum sententiam acidis temperatis foelicissime usum in curatione phthiseos ( in hoc convenit author cum *Colebatch.* ) *Barbette.* „ Atque hic liceat mihi obiter tantum mentionem facere *coaguli vitulini*, quo utuntur caseo conficiendo, tanquam fere unici acidi animalis, non solum in hoc morbo, ( maxime in *Hæmoptysi* ); sed in nonnullis aliis, de quibus hic non est dicendi locus, opem ferentis. „

Art. 1190. Quæro cum in hydrope tussis vehementens moveri soleat, & elaterio sedari, an non eadem phthisis etiam elaterio, parce dato, tollatur; *Lister de hydrope*, p. 20. Dubitatur.

Art. 1191. Remediorum sequentium vires, & usus lector ipse expendat. *Antihæcticum terii. Bals. sulph. anisat. nitr. saturnisat. Syrup. de peto. Sacchar. saturni. Aqua balsamica. Aqua limac. scorbut. aq. limac. pectoral. decoct. phthisic. express. milleped. simplex. Jusculum galli, Jusculum cancer. fluviat. Jusculum consummatum. Lixivium de calce. Lohoch myrrhisat.* ( Phthisicis primo adhuc stadio optatissimum est, præstantissimumque profecto remedium: *Fuller.* ) *Tinctura antiphthisica. Decoctum flor. bellidis major. Specificum habetur. Decoct. phthisicum, linimentum anodynum.*

Art. 1192. In Phthisis gradu conclamato ubi

standa in  
Phthisi  
concla-  
mata.

tota pulmonum substantia corrupta invenitur , omne quod præstandum remanet , inquit *Barbeyracius* illud est , ut aliquod ægro comparetur levamen , quo suos dies longius protrahere possit . Quamobrem duo se se offerunt persolvendæ indicationes : prima videlicet , ut febrilis ardor humorumque nimia agitatio imminuatur , unde obtineri possit immodicam materiæ noxiæ quantitatem in pulmones non influere , nec in ipsis accumulari ; altera ut saltem tantillum ulcus abstergatur , quoniam plenior ejus mundificatio , atque perfectior sanatio in desperatis reputatur .

Itaque priori indicationi satis videtur , ubi æger tabo non sit confectus , levem phlebotomiam instituere , qua absoluta purgabitur non semel tantum , sed reiteratis etiam vicibus prout opportunum censebitur . Prætereundæ interim non erunt Emulsiones , ita etiam nec refrigerantia Julapia , nec pectoralia remedia , nec Ptilisana ex hordeo pro potu ordinario , nec demum balnea ex aqua communi , modo satis virium in ægro ad eadem perferenda insint negligentur . Quodsi somnum capere non possit , quemadmodum frequenter evenit , irritum non erit laudani granum vel Syrup. pap. alb. ℥iij. in Emulsionem vel Julapia , vel in congruum aliquem liquorem ingerere .

Ad alteram vero indicationem , quæ ulceris mundificationem , & deterfionem reposcit , nihil ex iis , quæ possibile sunt , magis facit , quam Asininum , vel Caprinum lac , quod pro omni , & quolibet alio nutrimento jubendum est .

Clyster .

Si opportunum tibi videris clysmate jubere , sequenti ratione concinnabis : ℥. Fol. malv. violar. Borr. ag. ana man. j. semin. quatuor frig. maj. znc. j. fursur. man. semis , Glycyrrhiz. unc. semis aq. com.



## CAP. IV.

## Phthisis.

*commun. q. s. Coq. s. a. & colat. lib. j. add. Mell. ros. unc. ij. Catholicon. unc. j. m.*

Quantum ad purgativas potiunculas, eadem sequenti ratione componi possunt. *℥. Pulp. cass. unc. j. Rhab. contus. ℥j. f. nodul. cum sal. prunell. ℥j. Ros. palid. pug. j. Infund. per noctem in aq. commun. unc. viij. subsequenter mane in colat. dissolv. Man. syrup. de Cichor. compos. ana unc. j.* Porto  
pugati-  
va.

Julapia vespere semel iterumque in hebdomada, quousque morbus perseverat, ægro porrigenda hujusmodi sint. *℥. Aq. pap. rhead. plantag. ana unc. ij. Syrup. pap. alb. ℥ij. Syrup. capill. unc. semis misce f. julap.* Quodsi æger a vigiliis torqueatur, & hoc julapio somnus minime conciliari possit, tunc granum unum alterumve laudani addendum erit, pro ratione magnitudinis effectus comparandi. Pro julapiis hac norma compositis emulsiones utiliter substitui possunt.

Si Phthisis hæmoptysin consequatur de sequenti Opiato *℥ij. semel iterumque in hebdomada ægro imperabis, cubitum ituro sumendas: ℥. Conserv. consol. maj. Rosar. ana unc. ij. corat. rub. pp. ℥vj. Terr. sigillat. ℥ij. Syrup. tussilag. q. s. m. f. opiatum*, quod non minus ac præcedens julapium, prius quam lactis diæta usueniat, adhiberi potest.

In Hordei Ptisana frustulum radic. chinæ infundere licet, vel rad. consolid. maj. man. semis.

Si plurimum a tussi vexetur æger, præscriben- *Rotulæ.*  
dæ ei sunt rotulæ de Althea, vel quæ sequuntur: *℥. Pulp. rad. alth. unc. iv. pulv. glycyrrh. unc. j. Lact. sulphur. ℥. sem. sacch. rosat. q. s. f. rotul. singulæ ad pond. ℥j. quarum nonnullam æger. in ore detineat.*

Quoad Usum lohochiorum usurpanda sunt ea

quorum descriptionem in Pleuritidis , & Peripneumonix curatione tradidimus.

*China  
china & bo-  
lus.*

*Art. 1193.* Remedium quod pro Phthisi admodum commendat D. *Blackmore* in suo opere Anglice conscripto de Tabe , quodque per totam Angliam familiariter usuvenit , ita se habet: . *Chinachin. ðij. Syrup. ribes. vel rubi idæi q. s. f. bol. stomacho jejuno sumendus , & tres cyathi aque Spadane superbibantur , intervallo posito inter singulum cyathum horæ dimidia: Dein similis bolus devoretur vespere eodem posito intervallo tres cyathos ejusdem aque superbibendo.* Hujusmodi remedium continuatur per plures dies successivos , etiam noctu , idem sumendo , omisso prædictæ aquæ potu , & si tussis vexat *China china* , cum Syrup. *Diacodii* unc. j. miscetur. Hujus opetestatur Auctor plurimos sanasse phthiseos invalescentis symptomatis gravatos , quemadmodum tusses continuæ sunt , sputa purulenta , sudores colliquativi , & febris hæctica.

## P H T H I S I S N E R V O S A .

*Mortoni sententia.*

*Phthisis  
nervosa.*

*Art. 1194.* Phthisis nervosa est, absumptio corporis tabida sine febre , tussi , vel anhelatione insigni , appetitu tamen dejecto , & concoctione depravata , languent vires exhaustis carnibus , & robore ; aliquando *indigenis* accidit (immo nuperis annis sæpissime , ratio in propatulo est , scilicet , ex nimia spirituosorum liquorum indulgentia ; ) sed frequentius huc revertentibus ab insulis nostris in *India occidentali* . In principio habitus corporis œdematosus apparet , & quasi chylo spiritibus destituto dissentus turget ;  
facies



facies pallet, ventriculus fastidit omnia exceptis liquidis; urina est pauca, & plerumque rubicunda, aliquando tamen, ut in aliis nervosis affectibus, pallida & copiosa; nulla adest febris aut dyspnœa, nisi in ultimo morbi stadio. Constat luculenter genus nervosum affici (& primario *ventriculum*.)

*Art. 1195.* Causæ *procathartice* ut plurimum sunt graviores animi affectus, liquorum spirituosorum nimis libera ingurgitatio, aer insalubris, &c. (omnia etiam, quæ cruditates, affectus *hypochondriacos*, & *scorbutum* parere solent.

*Art. 1196.* Est morbus revera *chronicus*, & , nisi in ipso principio, curatu difficillimus; terminare solet tumore *hydropico* incurabili.

*Art. 1197.* Quod ad therapiam attinet, in usum revocanda sunt medicamenta *stomachica* interna & externa, *chalybeata antiscorbutica*, *cephalica* & *amara*. Instituat<sup>r</sup> purgatio cum *spec. hier. in aq. rut. ceras. nigr. & peon. comp.* externe *empl. stomach. magistral.* cum gr. aliquot *cinam.* & *absynth.* ventriculo applicetur. In æstate *aq. minerales chalyb. dictæ*; inter chalybis præparationes *extractum Mynsicht.* anteponendum est.

*Art. 1198.* „ Huic malo quoque affinis est iste, qui a Villisio *atrophia scorbutica* appellatur. p. 116.

*Art. 1199.* „ Mœror qui est animi dolor, & lucubratio nimia, quæ est ejusdem labor, ambo Phthisi plerumque viam sternunt, ast omnium quæ mihi hætenus nota sunt, nihil corpus adeo velociter absumit, ac mor, quando *ambit* & non *exambit*.

## TABES DORSALIS.

*Hippocratis sententia.*

*Tabis  
dorsalis  
diagno-  
sis.*

*Art. 1200.* Quando fluxio de capite in mellam contigerit, tabes occulta ac inconspicua oboritur, quæ hujusmodi est.

Lumbis dolet æger, & anteriores capitis partes vacuæ videntur ipsi esse. Si icterus sive regius morbus in oculis accedat, & in unguibus lividitas si fiat, si corpus ulcera habeat, & partes circa ulcera lividæ sint, & si sudor non toto corpore erumpit, sed una aliqua corporis parte, & si febre adhuc existente pallidum viride æger excreat, aut si dum adhuc in pulmone inest pallido-viridis excreatio cesset, periculosum est. Pallidum viride in pulmone inest, quando in faucibus respiratio strepit, & spiritus angustus est, & singultus adest.

*Curatio.*

*Art. 1201.* Qui ita affectus est, ei caput purgandum debili medicamento, donec fluxus avertatur. Diæta vero jubenda: ut in aliis tabidis. Medicamentum potandum præbe elaterium deorsum purgans, & inferne alvum lacte infuso elue. De cetero somentis utere. „ Diæta vero, quam hic loci commendat Hippocrates hujusmodi est, quod nempe ægris cibi non multi simul ingerendi sunt, & obsonia non plura, quam cibaria frumentacea, & vino inter redendum utendum est aquoso, ut ne calfaciat, & corpori debili existente caliditatem exhibeat.



Tabes reliquæ ab aliis morbis ortum ducentes ,  
aut ab iis quodammodo pendentes.

*Mortoni sententia.*

*Art. 1202.* In phthisi ab hæmorrhagia suppressa , vescatur æger juscula & gelatinas, & alios cibos bonum nutrimentum præbentes . Convenit *dieta lactea*; incidit plerumque æger in febrem hecticam, quæ *cort. Peruv.* profliganda est, ne in Phthisi pulmonari incurabili desinat.

*Phthisi  
ab hæ-  
morrha-  
gia.*

*Art. 1203.* Phthisis a gonorrhœa vel fluore albo exorsa, confirmata cum sit, est prorsus immedicabilis; si recens fuerit, fluxus est sistendus, & æger euchymis nutriendus, & calor hecticus, modo adsit, *dieta lactea*, aut *aq. chalybeata* extinguendus.

*Phthisis  
a gonor-  
rhœa  
vel flue-  
re albo.*

*Art. 1204.* In phthisi ab apostematibus & ulceribus, ulcus tempestive sanandum est ope externorum & internorum, aq. calcis sec. sit pro potu ordinario; *℞. Rad. sarsaparil. incis. ℥vj. uvar. Corinth. ℞℞. infund. in aq. font. ℞xij. coq. ad dimid. in colatura extingue calcis viv. ℞℞.* per residentiam depurat. sit pro usu. Nisi habitus sit jam jam hecticus *cathartica mercurialia* sunt usurpanda ad accelerandam ulceris curationem; immo excitare licet levem *ptyalismum* cum fructu; in usum veniunt *balsamica*, ut *syr. balsam. Locatelli*, *Tolutan.* &c. suprema cura adhibenda est, ne phthisis pulmonaris sequatur; quamobrem a curato ulcere fiant *fontanellæ*, continuetur usus *balsamicarum*, *dieta lact.*, *acidularum*, &c.

*Phthisis  
ab apo-  
stematibus  
& ulceribus.*

*Art. 1205.* Phthiseos a lactatu signa præsagientia sunt 1º. Appetitus diminutio; 2º. Spirituum languor, & imbecillitas corporis 3º. Oppressio hypochondriorum. Tempestive ablactandus

*Phthisis  
a lacta-  
tu.*

us est infantulus, & nutrix *diata lact.* commit-  
tenda.

*Phthisis a diar-*  
*rhœa &c.* Art. 1206. „ Phthises a diarrhœa vel dysen-  
„ teria, a diabete, a salivatione, ab hydrope,  
„ & a sudore nimio, nihil habent peculiare a  
„ morbis primariis, ut phthisis in genere di-  
ctum.

*Phthisis*  
*scrophu-*  
*laris.* Art. 1207. Phthiseos scrophularis signa dia-  
gnostica sunt plerumque: tumores scrophulares  
& crudi in externo corporis habitu, accomitan-  
tes vel præcedentes, ophthalmiæ, aut scabies, &  
similes affectus scrophulares.

*Curatio.* Art. 1208. Vitanda est *diata lactea*, utpote  
obstructiones pariens. *Radices scrophulariæ, fili-*  
*pendula, millepedes, &c.* cum *remed. pulmonar. &*  
*balsamicis* conveniunt. *Opium* rarissime usurpan-  
dum est. („ Animadversum est a *Sculdeto* me-  
„ senterium hoc malo semper primo esse affe-  
„ ctum, & frequenter tumoribus strumaticis ob-  
„ sideri, sanis adhuc partibus externis: & in  
„ hoc casu difficile est quidem, nisi conjectu-  
„ ra sola, morbum invenire, priusquam ægrum  
„ pene interfecerit. „) Convenit *emplast. de sa-*  
*pone* toti abdomini, &c.

*Decoct.*  
*tussilag.* Art. 1209. „ Est aliquid singulare in decocto  
„ *fol. tussilaginis* ad hunc morbum curandum,  
„ etiam in ægris maxime deploratis, & fere  
„ desperatis. *Fulleri medicina gymnastica.* ( v.  
„ locum p. 92. &c.)

*Phthisis*  
*scorbu-*  
*tica.* Art. 1210. Phthiseos scorbuticæ signa diagno-  
stica præcipua sunt eruptio macularum hinc in-  
de sparsarum per universam cutem, scretatio fe-  
re perpetua puris viscidissimi a glandulis jugu-  
laribus præcipue tempore matutino, exulceratio  
& extenuatio maxillarum.

*Curatio.* Art. 1211. Conveniunt *pectoralia incidentia*  
cum *antiscorbuticis*, ut summit. *pini, rad. oxy-*  
*lapath.*



## CAP. IV.

## Tabes alia.

59

*lapath. authoris pil. balsamic. chalybeata, acidula, &c. opium omnino vitandum est, ut & diatalealea, & immodica fumisuctio.*

*Art. 1212.* Phthiseos asthmaticæ signa diagnostica sunt anhelatio, & spirandi difficultas: hæc autem phthisis est valde chronica, & est phthisis senectutis. Phthisis  
asthma-  
tica.

*Art. 1213.* Omnia incrassantia sunt vitanda; profunt medicamenta *expectorantia, incidentia, &c.* ut *syrupus de erysimo, e 5. rad. millepedes, pil. balsam. nostr. &c. venesectio in paroxysmo oxymel. scilicet. & aq. cinnam. fort. ana p. æ.* Curatio.

*Art. 1214.* Phthisis ab affectu hypochondriaco vel hysterico a cæteris distinguitur symptomatis his affectibus peculiaribus. Phthisis  
hypo-  
chondri-  
aca.

*Art. 1215.* Curatio est fere ejusmodi cum aliis ( præcipue cum phthisi scorbutica ) conducunt *volatilia, chalybeata, &c.* Curatio.

*Harvei Sententia.*

*Art. 1216.* In phthisi ab hæmoptysi sanguis a pulmonibus ejectus sine dolore per tussim exan-  
tatur; & si rupta fuerit vena, ut plurimum pri-  
ma eruptione magna copia egeritur, & postea  
minori quantitate: in principio apparet tenuis,  
sincerus & floridus cum spuma flavescente; pro-  
gressu temporis pallidior & aquosior evadit cum  
bullulis; & postremo cum pure commistus ex-  
cernitur. Qui per *diapedesin* expectoratur, dilu-  
tior est, & minus copiosus cum humore fero-  
so vel purulento confusus. Phthisis  
ab hæ-  
moptoe.

*Mortoni Sententia.*

*Art. 1217.* In phthisi a chlorosi vel mensium obstructione non nisi in principio *chalybeata ten-* Phthisis  
a chloro-  
tan-

*si vel tanta sunt; calorem enim hecticum adaugent, mensibus & sanguinem exagitant; sed potius pulmonaria, obstru- &c. sunt usurpanda.*

*Phthisis* Art. 1218. Phthisis a pleuritide vel peripneumonia male tractata, julapiis temperantibus, a pleuri tide, &c. expectorantibus, venæsectione, acidulis, &c. tractanda est, vel si sit empyema *paracentesi*. *Millepedes*, decoct. *sars. sal. succin. diuretica*, &c. Historia prima hoc morbo laborantis est insignis & notatu dignissima, vide locum.

*Phthisis* Art. 1219. Phthisis ab ictero non curatur nisi ab ictero. sublato morbo primario; ideoque remediis *antictericis* oppugnanda est.

## VOMICA PULMONIS.

### Vvillisi sententia.

*Vomica pulmo- nis.* Art. 1220. Rara est mentio hujus affectus apud authores. Vomica Pulmonis plerumque accidit sine febre aut phlegmone, immo sine tussi immani, aut sputo, tacite ac velut improvise in pulmone generatur, & non raro non prius se prodit, quam patientem interimit. Latet (inquit *Tulpius*) inter initia ita clanculum, ut vix ulla sui proferat indicia, præter tussiculam, primo siccam, mox humidam, qua aliquamdiu continuante, trahitur difficulter spiritus, deficit anima, & emarcescit paulatim corpus, licet interim nec sanguinem præ se ferant sputa, sed si rumpatur nec opinanti vomica, occiditur (dictum ac factum) homo. Ita interdum solet contingere; verum novi plures, qui ex Pulmonis Vomica sensim orta, maturata, & demum rupta, pus copiosum & foetidum expuissent; cumque tale sputum per multas hebdomadas, imo menses quotidie excernentes, debiles adeo & ve-



lut tabidi evaserint , tandem medicamentorum ope , cum ulcus detergeretur & ficcaretur , integre convaluisse . Ab abscessu in Pulmone exoritur , & pus sæpissime insigniter foetet , eoque differt a sputo , quod in peripneumonia & phthisi ejicitur . Causæ remotiores latent , neque per signa ulla *pathognomonica* dignosci queat hicce morbus , neque prognosis institui potest , antequam ictu ferali se prodit .

*Art. 1221.* Post Vomicam disruptam medendi *Curatio.* methodus fere eadem est , ac post sectionem *empyematis* , aut in *phthisi* incipiente ; in hoc casu *lac asininum* sæpe prodest ; observavi quoque *fontanellam* in latere excitatam non raro insigniter profuisse . Historias quasdam adducit author , de quibus consulendus est , p. 205 .

*Baglivi sententia.*

*Art. 1222.* Tuberculo Pulmonum laborantes *Baglivi* de cætero bene se habentes , difficulter spirare incipiunt , inter spirandum non stertunt , & nihil expuunt , dolorem quoque in pectore sentiunt *vix vomica accuratè describit.* continuum , & dolentem in locum decumbere non possunt , sicca tussi laborant , tandem genæ rubent , febricula supervenit ; & negotio ad suppurationem vergente alia suppurationis symptomata accedunt . Duo tamen tamquam *pathognomonica* crudi & adhuc incipientis tuberculi signa sunt , *tussis sicca* , & *dolor lenis* in alterutro pectoris loco ; & quamdiu quidem tuberculum adhuc crudius fuerit , dolorem exilem & tussim siccam inducit . Qui tuberculo Pulmonum laborant , sæpissime derepente moriuntur ; nam suppurato tuberculo pus erumpit in trachæam , & suffocat : hinc quo longius a trachœa , & Pulmonum centro distat , eo minus periclitantur de  
suf-

suffocatione; pus enim in cavitatem pectoris erumpet, aut per urinas eliminabitur.

*Ettmulleri sententia.*

*Diff-ventia inter vomica & phthisin.* Art. 1223. Vomica Pulmonum & phthisis in eo saltem differunt, quod Vomica sit *ulcus Pulmonum clausum* seu *abscessus*, phthisis *ulcus sordidum ex abscessu jam aperto*: nam in Vomica interdum pus est laudabile, quod suis membranis inclusum citra excretionem in Pulmonibus hæret, & etiam sine tussi aliquando existere queat. A tumoris intus ruptione exsolutio; vomitus; & animi deliquium fit. *Hippocratis Aphorism.*

*Ballonii sententia.*

*Vomica pulmonis diagnosi difficillima.* Art. 1224. Memorabilis est, historia Joannis Tassini, calidi temperie, & sicci, veneri indulgenti (ut ferebatur) vertigine oppressi, qui linguam minime continere valens repente concidit, & obmutuit. Paulo ante gravi metu percussus fuerat. Fandi impotens quidem; alloquentibus annuebat. Designabat locum dolentem ad dexteram lateris dextri partes; qua septum alluit. Frontem ac tempora contingentem, adurens flammeusque calor percipiebatur. Paroxysmo solutus intolerabili capitis dolore captum se narrabat. Ex intervallis exsiliebat; insultabatque phreniticorum more; non convellebatur. Deinde obmutescibat, & velut sopore vigilantem occupatus delirioque jacebat. Dein rursus exsiliebat, indecore sese componens; omniaque projiciens. Ad se rediit multis ultro citro tentatis. Dextrum latus dolere narrabat; & sinistrum ante doluisse. Olim sanguinem ore rejectaverat affatim.

Ve-



Venam secuimus. A secta vena repetit malum: coepitque flata periodo reverti, idque noctu. Restitutus tandem de reliquiis doloris in latere, & capite querebatur, febre carebat, urinæ non illaudabiles. Nisi sedula custodia impeditus horrenda fecisset. Spiratio frequens, parva, non magna, rara, licet delirus. Aliquando parum elato pectore spirabat frequens, & humile. Illa ducendo hypochondriacum aliquid congenitum erat.

Pulmonicum quid putabant: aut a pure vaporem, aut tuberculum, aut convulsionem articularum pulmonis, aut adhæsum, sectio, uscio, aut maturatio flagitabatur. Omnia in anticipiti erant. Alii ephialtem, aut hypochondriacum suspicabantur. Post magnam purgationem convaluit: eruperant paulo ante ambustis similes pustulæ: an quia spleneticus? Ultimæ dejectiones albicabant: an quia abscessus ruptus est? Præter spem salvus.

*Art. 1225.* Non enim certo, tam insolentis morbi, & symptomaton causa teneri potuit. Sed exitus morbi, qui eum uno post anno prehendit, & de medio sustulit unam ex conjecturis veram esse comprobavit. Vomicam aliquam subesse conjiciebamus, a qua vapor teter efferretur, vehementium symptomaton auctor. Ego quidem nunquam putassem elatum a pure, materiave purulenta vaporem tanti esse. Ad mensē Augustam dolore capitis incredibili tentatur, febris assidua, jactationes, verebamus ne in ea incurreret, in quæ prius ceciderat. Multum sanguinis e naribus fuderat antequam morbo prehenderetur.

Statim injectum enema, missus sanguis. Eadem die datum medicamentum. Alvus liquidissimis excrementis fluxit. Nec quicquam com-

pa-

*Nondum  
morbus  
satis co-  
gnitus.*

*Ejusdem  
anno  
subse-  
quente  
reddi-  
tus.*

pactum apparuit . Ingens erat incendium , & vires naturæ dejectæ erant . Dolore lateris que- rebatur , & ad regionem hepatis . Iis locis pun- gentem se dolorem , & lancinantem percipere , ac sentire narrabat . De vomica conjectura au- gebatur . Sæpe vox deficiebat , ac si aut pulmo confossus , aut perforatus , aut adhærens esset . Nil purulentum expectoravit . Non poterat mul- tum & affatim bibere , quia deficiebat spiritus . Et potus velut in cavum descendere videbatur . Septimo die tandem , cum sudore pingui inte- riit .

*Cadave- ris dis- sentio.* **Art. 1226.** Aperto cadavere deprehensus est , pulmo adhærens tum in parte dextra , tum si- nistra costarum . Membranz utrinque sublive- bant . Circum gibbum diaphragmatis pars pul- monis tota in pus , & faniem foetentem lique- facta erat . Magna quoque puris materia trans- fluxerat in hepatis regionem ; & ibi conclusa erat . Nova ibi vomica conclusa videbatur . At non erat .

*Cadave- re aper- to cogni- tum qua præstan- da erant.* **Art. 1227.** Totum corpus internum foetens . admodum erat , hepar sanum , & lien . Intesti- na alieno maxime colore . Anno præterito quo gravissime laboraverat , ut ante diximus puru- lentas habuerat dejectiones . At credo iddem na- turam hoc posteriore morbo moliri voluisse ; sed vias non fuisse idoneas , & faciles . Credo , quod si ustus fuisset , aut sectus , magna salutis spes affulsisset . Nec mirum si periclitatorum cœca medendi ratio , sæpe methodicorum , & rationalium præceptis , & ratiocinationi anteeat . Nam cum putris sit pulmo , imminutus , semi- lacer , & adhærescens , exsiccantibus oportet pu- tredinem oppugnare , secus ac vulgus medico- rum sentit , qui fere humectantia consulit , & dum habet rationem cujusdam extenuationis , li- qui-



quida putrefactiva præscribit, sed in eo casu de- Nota  
 siccantia, & aromatica multo melius *Galenus*, bene.  
 jubet lib. IV. de locis affectis, quem locum vi-  
 de diligenter.

## A S T H M A.

*Ægineta sententia.*

*Art. 1228.* Qui sine febre crebra respiratione, Definitio  
 tanquam a citatiore cursu agitati conflictantur, *asthma-*  
*Asthmatici* dicuntur. Iidem quod strangulari for- tis.  
 midantes, ad respirationem recto pectore toto  
 nituntur orthopnoici dicuntur.

*Art. 1229.* Oritur autem affectio crassis, & Ejus  
 glutinosis humoribus, fistulosis pulmonum car- causa.  
 tilaginibus, cavitatibusve infarctis. Dyspnoea  
 vero h. e. spiritus, & animæ difficultas commu-  
 ne est accidens, cum hæc, tum alia plurima  
 mala comitans.

*Art. 1230.* Anhelosorum medendi scopus est, Curatio.  
 viscidos crassosque humores, medicamentis at-  
 tenuantibus, & abstergentibus consumere. Pro-  
 inde acetum scilliticum hoc malo oppressis ac-  
 commodatissimum est: & inde confectum oxy-  
 mel in potu sumptum, ipsaque scylla tosta,  
 cum melle trita. Ex antidotis hiera, & alia  
 medicamenta validissime, quæ alvum continen-  
 ter dejectionibus sollicitant, & cum raphanis ci-  
 tati vomitus, aristolochia rotunda bibita, cen-  
 taurii maj. radix, melanthium. Asellorum qui  
 uliginosis, & aquaticis degunt, sextarium vasi  
 injiciens factili, super carbonibus torrefacito,  
 ubi vero candorem induere cœperint, conteri-  
 to, melleque despumato excipiens, mixtum tum  
 ante, tum post cibum porrigito.

*Art. 1231.* Quod si necessitas urgeat, ante hæc Remedia  
*Allen. Pars II.* omnia externa

omnia venam aperito , & secundum laborantis vires evacuato ; alvus item clysteribus irritanda . Foris thoraci ficus , lolii farinam , & hordeaceam cataplasinatis modo imposito , resina interim , ceraque , & melle adjecta . Inspergatur etiam illi iris , mannaque . Non alienum fuerit , farinam hordeaceam cum resina , cera , iride , mannaque emplastri more adglutinare . Unguentis vero utendum admodum caloricis , irino , anethino , & rutaceo . Peculiariter vero est pumicis partem *sphecles* (quæ est fex vini) crematæ partes quatuor , spumæ nitri ceratium , confusa & cribrata unguentis excipiuntur , & thoraci infricantur . Malagmatum usus est , quæ sanies , & serosos sanguinis humores extrahendi potestatem obtinent .

Anhelatoribus ℞. *Polii* , *abrotan.* *castor.* *chama-pityos* , *gutta ammoniaci thymiamatis ana* *part.* *aq. mellis q. s. misce .*

*Remedia interna.* Art. 1232. Sunt alii qui spumæ nitri cochlearium tribus mulsæ cyathis mixtum propinant .

Aliud ℞. *Spuma nitri unc. iiij.* *piper. ℥j.* *laserpitii ℥ sem. f. pulv. cum aqua cochleare propinand.*

Aliud ℞. *Castor. gutt. ammon. thymiam. ana ℥vj.* *piper. gr. xl.* *hec omnia passo excipiuntur , & fabæ magnitudo cum mulsâ exhibetur .*

Aliud . ℞. *Synap. ℥j.* *spuma nitri ℥ sem.* *elater. gr. x.* *totum hoc in orbiculos viij. conformato & per biduum binos exhibeto . Purgans enim per superna citra molestiam .*

His , qui veluti , qui obtorto collo tantum non strangulantur , dato : spumæ nitri ℥iij. cum hydromelitis cyathis ternis , atque cum cardamomo nonnumquam , confestim opitulantur .



## Floyeri sententia.

*Art. 1233.* Asthma est respiratio difficilis & laboriosa cum scapularum elevatione & sibilo, a compressione, coarctatione, vel obstructione vasorum pulmonalium. Estque vel *continuum* vel periodicum. Asthma *continuum* pendet a compressione venarum & vasorum bronchialium & vesicularum pulmonalium vel nervorum, 1°. Propter pectoris hydropem. 2°. Empyema, phlegmonem, abscessum vel tuberculum. 3°. Polypum in vasis sanguiferis, sanguinis ipsius coagulationem, varicem, plethoram, obstructions catameniorum, hæmorrhoidum, fonticulorum, ulcerum, psoræ, &c. 4°. Lapides in trachæa generatos. 5°. Obesitatem nimiam, vel intumescientiam thymi. 6°. Gibbam. 7°. Pulmonum adhæSIONem. 8°. Nimiam pulmonum intensiONem a cursu (vociferatione, ) &c. 9°. Hydropes, tumores visceris alicujus insignioris. 10°. Coli vel ventriculi inflationem. 11°. Paroxysmos apoplexiæ, vertiginis, lethargi, serum extravasatum nervos opprimens. 12°. Tumores pulmonum flatuosos, quemadmodum accidit equis ilia ducentibus, vulgo *broken. vvinded. Horses.*

*Art. 1234.* Asthma *periodicum* pendet a compressione vasorum & vesicularum bronchialium mediante halitu flatulento, & morbis sequentibus plerumque succedit; 1°. Febris intermittentibus, variolis, peripneumoniis. 2°. Catarrho. 3°. Affectionibus hystericis. 4°. Ephemeræ, a sex rebus non naturalibus, maxime aeris mutationibus subitaneis, pendenti. 5°. Cacochymix glutinosæ, flatulentæ, in ventriculo prognatæ, ibique inflationes excitanti, & denique inflationem

in pulmonum vesiculis producenti. Atque hoc est *verum Asthma flatulentum periodicum*.

*Asthma-  
tis perio-  
dico pa-  
roxysmi  
plerum-  
que sunt  
regula-  
res, con-  
tinui non  
ita.* Art. 1235. Observandum est Asthmatis *conti-  
nui* paroxysmos frequentes esse, a nimio corpo-  
ris motu, vel errore in diæta inductos, vel no-  
ctu recurrentes; sed hi recursus non sunt adeo  
regulares ac in Asthmate *periodico*, ubi decimo  
quoque die redeunt paroxysmi. Circa horam 2<sup>am</sup>  
vel 3<sup>am</sup> pomeridianam a prandio asthmatici sen-  
tire solent coarctationem vel inflammationem  
circa scrobiculum cordis vel os ventriculi, quod  
tunc temporis flatibus distenditur, & ructus in-  
sipidos copiose emittit; atque hæc ventriculi in-  
flatio est primum signum appropinquantis paro-  
xysmi, hanc sequitur sanguinis effervescentia,  
& huic proxima spirituum in pulmonum ner-  
vis & membranis expansio seu rarefactio, quip-  
pe rigidi & inflati sentiuntur.

*Paroxys-  
mi de-  
scriptio.* Art. 1236. Hora prima vel secunda matutina  
paroxysmus sensim obrepit; respiratio evadit  
lenta, & mox angusta: si paroxysmus futurus  
sit brevis, nempe duarum, vel trium horarum,  
& æger e lecto surgat, dyspnœa brevi faceffit,  
& expuit *crudum* quemdam & *glutinosum* screa-  
tum, instar *albuminis ovi* vel solutionis *gum. tra-  
gacanth.* tam in Asthmate *humido*, quam in *hy-  
sterico* (*siccò* vel *convulsivo*); hæc autem materies  
lineis nigris seu filamentis discriminatur; si ve-  
ro diuturnior futurus sit paroxysmus, viz. dua-  
rum, trium vel quatuor dierum, primis diebus  
parum aut nihil expectoratur, sed 3<sup>o</sup>. vel 4<sup>o</sup>.  
die materia purulenta, magis cocta, & non adeo  
glutinosa, coloris albicantis, viridescentis, vel  
flavescentis, & in morbo inveterato saporis dul-  
cis putridi, falsi, aut acidi, & frequenter cum  
filamentis sanguineis. Intra spatium 3. 4. aut  
5. dierum paroxysmus prorsus finitur, & exin-  
de



de parum aut nihil expuitur ante novi paroxysmi exortum.

*Art. 1237.* Plures & diuturniores occurrunt paroxysmi in *æstate*, quam in *hyeme*; ego ipse viginti in *æstate*, & tantum sexdecim in *hyeme* sustinui; in *Augusto* severiores semper; quanto diuturniores paroxysmi, tanto majora interval-  
la, & vice versa; Intervalla breviora mecum fuerunt 2. 3. 4. 5. 6. vel 7. dierum; longiora 8. 9. 10. vel 14. dierum; calor lecti morbum exasperat; extremum frigus est tolerabile sine injuria. Magna pallidæ urinæ copia in paroxysmo excernitur, sed sub finem rubicundior evadit, cum sedimento crassiore. Quanto parcior & tenuior sit victus in paroxysmo, maxime in principio, tanto melius; minor erit quantitas chyli ad pulmones missi, & materia purulenta citius coquetur, & evacuabitur, carnes itaque sunt omnino prohibendæ. De victu convenienti, & improprio *vide locum* p. 90.

*De paroxysmis observationes variae.*

*Art. 1238.* Ad unum scopum potissimum dirigenda est cura, nempe ad *temperandam effervescentiam*: malum etenim ipsum est quasi *cattarrhus*, ideoque propinanda sunt remedia *incidentia minus calida*: *Venesectio* quotiescunque repetita solummodo levamen præsentaneum affert, senibus asthmaticis maxime perniciosa est: ad *cachexiam* enim & *leucophlegmatiam* viam munit.

*Indicatio curativa generalis.*

*Art. 1239.* *Acetum scilliticum* ad omnes flatulentias a *Galeno* valde commendatur; sensus acuit, respirationem facilem reddit, coctionem juvat, alvum laxat, urinam movet, flatus dissipat; & præ omnibus contra asthma ægregia præstat. Sequens est syrupus asthmaticus declinante paroxysmo sumendus, dos. coch. j. mane & vespere; *℞. Syr. de erysim. præp. balsam. ana*

*Remedia varia ab authore comprobata.*

℥ij. oxymel. scillitic. aq. brion. ana ℥j. bals. Peruv. ℥ss. m. Cortex Peruvianus ad avertendum paroxysmum multum laudatur. Aqua simplex cum pane tosto, additis paucis nitro & sal. ammoniaco, copiose epota, & hor. decubitus acet. scillitic. ℥ij. mecum frequentissime adventum paroxysmi eluserunt. Et oxymel. nostr. cum rad. zedoar. &c. vid. Pharm. Fulleri. Eundem ad plures menses protelavit. Hypnotica ad compescendam inflationem multum valent (in asthmate convulsivo) testibus Riveria & modernis plerisque, inter quos clarissimus Gibbons. Mihi in frequenti usu fuit haustus seq. ℥. Aq. papav. ℥iij. sal. prunel. ℥ss. syr. papav. ℥vj. m. In paroxysmo omnia calida sunt maxime perniciofa, acida blanda sunt magis proficua, ut mala aurantia, limonia, citria, fructus berber. acetum ol. sulphuris per campan. &c. ℥. Conserv. acetos. cynosbat. rob. berber. ana ℥j. crem. tartari ℥iij. syr. limon. q. s. m. f. elect. pro pauperibus posca, gas sulph. (i. e. aqua fumo sulph. saturata), quod remedium est maxime efficax. Semel atque iterum exhibui medicamenta mercurialia in hoc morbo cum foelici eventu, sed hoc fuit in leprosis. De virtutibus acet. vide locum p. 183.

### Villisi sententia.

Asthma  
convul-  
sivum.

Art. 1240. Observare licet graves asthmatis paroxysmos sine quavis notabili pulmonum labe accidisse, revera ut putaverim hunc morbum aliquando esse mere convulsivum: paroxysmo etenim finito, quin etiam priusquam incipitur: respiratio libera & æqualis satis recte ducitur, nullaue tussis, aut valetudinariæ pulmonum dispositionis signa apparent. Hujusce morbi varias adducit historias. Ad hujus generis asthma canur-



curandum medicamenta *antispasmodica*, potius quam *bechica* vel *pneumonica* adhibenda sunt.

p. 92. *Millepedes* in hoc affectu egregia præstant.

*Art. 1241.* Asthma inveteratum difficillime *Prognosis & Curatio.* aut vix unquam curatur, magnum tamen a medicamentis juvamen accipit, in deterius vergens, aut *phthisin* aut *hydropem*, aut affectum quemdam *soporosum* vel *convulsivum* minatur. Extra paroxysmum *pectoralia* cum *antispasmodicis* conjungantur. Laudantur *spiritus gum. ammoniac. cum sal. ammoniaco distillat. dos. a gr. xv. ad xx. tinctur. sulph. &c.* sed maxime *sp. gum. ammoniac.* vires extolluntur, p. 213., De viribus visci arbor. vid. (*Art. 389.*)

### *Etmulleri sententia.*

*Art. 1242.* Adest in omni Asthmate respiratio *Asthma humidum & siccum.* frequens laboriosa, & difficilis cum anxietate circa præcordia; adest sæpe tussis, interdum crebra & molesta, interdum non, interdum adest stertor, interdum sine stertore *orthopnoea* laborant. Asthma dividitur in *humidum & siccum*, sive in manifestum & occultum; prius expectorationem materiæ purulentæ conjunctam habet, alterum est mere *convulsivum*: verum interdum hi asthmatici, in fine paroxysmi, aliquid licet parum muci emittunt, quod non causa peccans est, sed ex conatu respirationis circa laryngem & fauces aliquid colligitur, quod evacuatur: causa materialis asthmatis *humidi*, aut in pulmonibus est mucus viscidus, vel pus in vomica, empyema, phthisis, &c. vel serum pulmones copiosius inundans, vel sanguis in motu impeditus; aut in stomacho, & primis viis ex cruditatibus, cachexia, &c.

*Art. 1243.* Probe observandum est: an Asthma *Curatio.*

fit morbus *primarius* vel *secundarius*; si *posterior* respiciendum est ad morbum a quo pendet. In paroxysmo Asthmatis *humidi* optima omnium sunt *vomitiva*, nec est quod exinde metuatur suffocatio; dyspnœam insigniter tollunt; in Asthmate *sicco* quoque extra paroxysmum cum fructu propinantur *cathartica*, in paroxysmo neutiquam conveniunt; malum etenim exasperant. *Venesectio* locum habet solummodo in Asthmate ex vitio sanguinis orto. *Opiata* in Asthmate *sicco* multum conferunt, in *humido* suspecta sunt. In Asthmate *humido*, præsertim in senibus laudatur *syr. nicotianæ*. Succus *raphanæ* est potentissimum expectorans. *Gum. ammoniacum* est optimum remedium. *Sperm. ceti* ʒi. ad ʒj. in paroxysmo multum levamen adfert. Denique *millepedes* in utroque Asthmate est remedium omnem laudem exsuperans. Pro curando Asthmate *sicco* sive *convulsivo* conducunt in genere *antiepileptica*, *antihysterica*, *antispasmodica* & *opiata*, *cinnabarina*, *sal. succin. castor.* &c.

*Pujati sententia.*

*Duplex  
Asthma-  
tis cau-  
sa.*

*Art. 1244.* Mihi asthma humorale est, cum efficiens causa est obstructio glandularum internæ Pulmonis membranæ a pituitoso humore crassoque. Convulsivum vero cum ejus primaria effectrix causa est convulsio seu strangulatio Trachœæ. Verum sicut spasmus; & strangulatio Trachœæ lympham pulmonicam, nulla cæteroquin præternaturali crassitie, visciditateque donatam, crassiorem, tenacioremque efficit (spiritus enim densus sputum viscosum facit) sic tenax & viscosa pituita trachœam obfidens, & respirationem impediens, aliquam fibræ distensionem inducere non potest. Etenim vel solus  
nifus,



nifus, quem difficulter respirando animal ex-  
rit, illis irritamento est, ut convulsorio modo  
afficiantur.

*Art. 1245.* Ob id in asthmatis quoque hu-  
moralis paroxysmo, dum pituitæ anacatharsis  
promovetur, crispatis etiam fibris demulcendis  
studendum est. Id tamen iis præstetur, quæ  
sputum suppressere non valent, qualia sunt le-  
viora anodyna, atque mollientia, quæ spirituo-  
sis, & dissolventibus sociata, perbelle utramque  
absolvunt paginam, votoque respondent.

*Art. 1246.* Cæterum in Asthmatis pectoris hu-  
moralis paroxysmo tutissimum habet a Medici-  
nis purgantibus abstinere, quantum vero ad phle-  
botomiam addit: in sanguineo temperamento  
præditis, vel trachææ solus pituitosus infarctus  
ita per pulmones sanguinis cursum comprimit,  
ut morbus, ratione effectus, sanguinis missio-  
nem nedum poscat, sed flagitet. Nihil enim ci-  
tius liberum illi circuitum per pulmones con-  
ciliat, ex probatissimis Practicis, quam venæ  
sectio.

*Curatio-  
nis ra-  
tio.*

*Quid de  
purgan-  
tibus &  
phlebo-  
tomia  
sentien-  
dum.*

### *Meadii sententia.*

*Art. 1247.* Respirationis impedimentis adnu-  
merari debet sanguinis per pulmonem difficilis  
transitus. Id autem variis modis evenire posse  
manifestum est, tam scilicet ipsius cordis, quam  
sanguinis vitio. Cordis vis debilior sanguinem  
minus propellit; hic vero si forte nimis crassus  
fuerit, ægrius movetur, & in canalibus suis quo-  
dammodo hærens aeris officium perturbat, ac  
moratur. Plures morbi hujusce causæ enume-  
rari possent, sed istæ præcipuæ sunt, quarum  
aliæ aliis conjunctæ ineluctabile interdum exi-  
tium procreant.

*Præci-  
pua A-  
sthmatis  
causa.*

*Art.*

*Quomo-  
do tol-  
lenda.*

*Art. 1248.* In omni autem ejus genere auxilium est, nisi aliquid prohibet, in sanguinis de- tractione. Neque id satis est: vomitus etiam, si pituita tenax pulmonem, aut ventriculum gra- vat, apprime utilis est, & is quidem frequen- ter repetitus. Alvum laxam habere oportet, quæ catharticis tamen vehementioribus minime sollicitanda est; satis plerumque ad hanc rem erit singulis noctibus pilulas dare, ex paribus por- tionibus pilul. Ruffi, & gumm. ammoniac. con- fectas. Ægro cibis & potionibus flatulentis qui- busvis omnino interdicare oportet. Exercitatio- nibus fere ad lassitudinem; & fricationibus præ- cipue inferiorum partium, & per se ipsum, & per alios, usque ad sudorem fere utendum est.

*Remedia  
in mor-  
bi paro-  
xysmo.*

*Art. 1249.* In ipsis accessionibus ad angustiam levandam faciunt oxymel scilliticum aquæ ci- namomi simplici commixtum; allium sive cru- dum, sive conditum. Sin autem nervorum li- quor in culpa sit, gummi omnia graveolentia, in primis lac ammoniaci dictum conveniunt: At meminisse convenit, anodyna remedia, quæ in priore casu pestifera sunt, in hoc plurimum proficere, salibus, nempe, aut spiritibus vola- tilibus dictis, conjuncta. Inter hujusmodi vero compositiones non alia præstantior est illa, quæ nomine Elixir paregorici prostat.

*Præfer-  
vatio.*

*Art. 1250.* Quibus vero modis hunc morbum præcavere oporteat dicendum est. Ratio igitur cum temperamenti ægrotantis, tum ipsius mor- bi naturæ, hic haberi debet. Illud si calidum sit refrigerantia, & acida mitiora tamen postu- lat; inter quæ præstant acetum, & oxymelita quæcumque. Sin corporis constitutio sit frigi- dior, calefacientia nonnulla usui erunt; qualia sunt, radix Enulæ campanæ, Zedoariæ, Sagape- num, Myrrha, & consimilia. Vomitus in utro- que



que subinde ciere oportet, alvumque lenibus catharticis, quæ non nimis sollicitent, quale est sal *Glauberi* dictum, subducere. Aqua pro potu commodissima est, adjecto vini paululo.

Quoniam autem in omni hoc morbo sanguis plus minus effervescit, huic excandescentiæ nobili illo remedio Cortice Peruviano, iis præsertim temporibus assumpto, quibus recurrere so-  
leat difficultas respirandi, occurrere optimum erit. Et novi quidem illum commisto cinna-  
bari antimonii, nonnumquam insigniter pro-  
fuisse.

*Cortex  
Peru-  
vianus.*

*Art. 1251.* Suspirosis quibuscunque auxilio sunt fonticuli super scapulas inusti. A nimis frequentibus sanguinis detractionibus hydropis metus est. Senibus nocet nimia aquæ potio. Exercitationes vehementiores spiritus angustiam faciunt. Magna denique acidorum copia fibrillas nervorum constringendo anhelitum difficilem reddit. Ita modus etiam in ipsa medicina servandus est.

*Cautela  
& mo-  
ritus.*

### *Farrago sententiarum.*

*Art. 1252.* Omnium difficilium respirationum facillima *Dyspnoea* est, in qua respiratio frequens & parva, vel frequens & magna sine anhelitu, sine stertore, sine sibilo, cum parva molestia, & sine febre. *Asthma* est dyspnoea difficilior, nempe crebrior, & minus, vel crebrior, & majus cum anhelitu, molestia, stertore, sibilo, sine febre. *Orthopnoea* tertia dicitur, quæ similiter sine febre, sed potest esse major, aut minor, crebrior, aut rarior, quam sit *Asthma*, dummodo æger cogatur respirare recto situ corporis, non decumbens videlicet, sed saltem sedens. Quod si causa difficilium respi-  
ratio-

*Diffici-  
lis res-  
piratio-  
nis gra-  
dus.*

rationum eo usque ingravescat, ut suffocet, sive strangulet, prohibeat, nempe, ne ducatur, ac reddatur spiritus, tunc erit suffocatio, vel strangulatio, vel *Apnoea*.

*Eadem  
cum vel  
sine fe-  
bre.*

*Art. 1253.* Etsi carentia febris communis est his omnibus difficilibus respirationibus, poterit tamen etiam febris cum harum singulis conjungi, prout singulæ a diversis morbis procedent, febrim secum ferentibus, vel ipsa difficilis respiratio pulmonis inflammationem sibi necessario sociabit. Si vero peripneumonia, vel pleuritis succedat mortem proximam esse denunciabis. Commune itidem omnibus difficilibus respirationibus est, quod multo difficilius inspiratio, quam exspiratio fiat.

*Essentia-  
lis vel  
per con-  
sensum.*

*Art. 1254.* Sicut autem morbi reliqui, ita difficultas spiritus esse potest essentialis, & per consensum: Idiopathica, cum causa in ipso pulmone viget primario, sympathica cum aliunde in ipsum derivatur. Quia vero fieri potest ut causa hujusmodi per intervalla temporum ad pulmonem derivetur, hinc per intervalla recurreret Asthma sympathicum, & si quidem recursus derivationis sit periodicus, etiam paroxysmus Asthmatis periodicus erit. Sed & Asthma essentialis potest per intervalla temporis, & periodice recurrere, quoties causa in pulmone generabitur, quæ sensim absumatur, atque ita deinceps vel incerto ordine, vel eodem intervallo temporis seu periodo. *Bellinus.*

*Causa.*

*Art. 1255.* Respirandi difficultatis causa non semper in pulmonibus, & thorace latet, temereque & inscianter multi illuc recurrunt, cum sæpe aut hepar tumens, aut hypochondriaca affectio, aut affectus renalis, aut vitium nervorum a spinali medulla derivatorum ortum præbeat.

*Art.*



*Art. 1256.* Usitatum est huic morbo obnoxios, sæpe lectum ingredi non ausos, tantummodo in cathedra, aut super cubile vestibus indutos dormire posse: cujus ratio est, quod corpore stragulis cooperto, & concalescente, sanguis proinde in motum paulo citatiorem concitus, & fervescens, uberiores aëris inspirationem requirit, quam per trachœæ ductus coarctatos suppleri queat: nam quo plus sanguinis quaque Systoles, & Diastoles vice pulmones trajicit, eo propter accensionem simulque eventilationem ejus, aër copiosius & celerius ingeri, regerique debet.

*Asthmaticorum paroxysmus.*

In omni Dyspnœa ob nervosi generis culpam excitata, pulsus ut plurimum satis fortis ac debito celerior, ac interdum intermittens existit.

*Pulsus.*

*Art. 1257.* Si difficulter spiraverit Asthmaticus venam brachii tundito, etiamsi hydrope laboraverit.

*Phlebotomia præstantia.*

*Art. 1258.* Si quis vespere hora somni, sed præcipue post tres, vel quatuor horas somno impensas derepente expergiscatur ingenti Asthmate sive suffocatione correptus, atque aperiat fenestras, liberumque aërem desideret, pro certo habeto illum hydrope pectoris laborare; multo magis si pedes aut manus tumere cœperint, cum faciei nativi coloris recessu; & præcæteris si accedat torpor seu incipiens paralyfis brachii: hujusmodi brachii torpore in aliis quoque pulmonum morbis præsertim Peripneumonia observatur.

*Prognosis.*

Asthmaticis dysuria superveniens bonum, cessante de repente dysuria denuo asthmate corripuntur. Exinde magis confirmatur, quod pluries adnotatum: nempe in morbis pectoris semper ducendum esse ad vias urinæ, natura id mon-

*mon.*

monstrante: nec non inagnum consensum esse inter tibias & pectus, pudenda & pectus, morbosque harum partium ad invicem commutari.

Asthmaticis si apothemata excitentur in crucibus, forsan solvetur morbus. Accessiones frequentiores sunt coelo frigido & humido, præcipue inter crapulandum. Morbus hic a parentibus, vel ab intemperantia vitæ succedit. In senibus, & quandoque in aliis usque ad mortem perdurat. Frequentius obæsos, & cito marcescentes invadit.

*Aliare-* *Art. 1259.* Asthmate detentum si tussis sicca  
*media.* multum exerceat, cum sensu asperitatis, & ac-  
cedinis secundum Trachææ longitudinem expore-  
cto absque stertore tamen, vel sibilo sequente  
remedio uti laudat Dictionar. Medicinal. Auct.  
*℞.* Rad. alth. unc. ij. fol. consolid. maj. man. j. Ju-  
jubar. num. xv. daëtil. exempto nucleo num. x. aq.  
*Syrupus.* commun. lib. iij. coq. & filtrat. add. sacchar. lib. ij.  
tum ad consist. syrup. iterum coq. de quo singula  
hora plenum cochleare ægro exhibeatur, vel cum  
aquæ cyatho agitaturn propinetur. Emulsionem  
quoque refrigerantes, & demulcentes plurimum  
conveniunt.

*Lactis* Si æger capitis dolore, & febre careat lacte  
*usus.* vaccino utatur. Ante lactis usum alvo probe  
purgata per septem, vel octo dies quotidie ca-  
piat mane stomacho jejuno lapid. cancror. pulv.  
ʒj. in vini tepidi cyatho additis etiam Ol. Tar-  
tar. p. d. gutt. iij.

*Salvis.* *Art. 1260.* Si contra admodum oppressus æger  
videatur cum respiratione difficili, & stertore, ejus  
respiratio expedietur sequenti remedio, quod num-  
quam fallit. *℞.* Sal. Armoniac. pulv. gr. xx.  
Croc. gr. x. in. & cum vini Rhenani, vel albi  
cyatho propinetur.



Delicatiores in asthma proni per decem dies quotidie vespere, vel ante lecti ingressum ovum molle forbeant, cum flor. sulph. gr. x., & flor. benzoës gr. iij. quod remedium sub ingressum exitumque hyems in primis usurpare debent.

*Art. 1261.* Asthma subinde a stomachi plenitudine gignitur, ut eluonibus accidit, cognosciturque ex acidis eructationibus, vel amaris, vel flatuosis, quo casu Vomitorium semel, vel bis repetitum morbum ipsis in incunabulis opprimit.

*Art. 1262.* Dantur etiam Asthmata convulsiva ex agitationibus tremoribusque artuum dignoscenda, unde evidens est nervos affici; pro quibus sequens præparatio quolibet opiato præstantior mitos effectus præstat, ubi opus sit sanguinis spirituumque perturbatos motus compescere: *Liquor Anris- pasmus- dicus.*  
*℞. Vitriol. virid. lib. sem. quo ad solem vel ignem usque ad albedinem exsiccato f. pulv. atque in vin. spir. rectific. unc. xxx. infund. in vase vitreo subere, mastice, & suilla vesica probe clauso, & in fimo caballino ad digerendum reponatur per mensem, priori fimo recens subinde addendo. Deinde hoc tempore elapso liquor decantetur, & ad M. B. destilletur usque dum lutea guttula prodeant, tunc enim igne remoto liquor destillatus servetur usui. Hujus dosis est ad gutt. xij. in vino albo vel jure carniū &c. non solum pro Asthmate convulsivo verum etiam pro Epilepsia & ad somnum leniter conciliandum, atque tandem ubi occasio detur.*

*Art. 1263.* Potio *coffee* omnium maxime certissimeque inflationem mirum in modum cicurat & compescit in ipso paroxysmo. *Musgrave. Coffee.*

*Art. 1264.* „ In paroxysmo diuturniori & periculoso conveniunt *vesicatoria* præcipue tibiis *Epispastica.*  
 „ applicata, ex *Hippocratis* præcepto.

*Art.*

Remedia  
varia.

Art. 1265. Remedia sequentia iudicio prudentis medici permittuntur. *Flor. benzoin. dos. a gr. v. ad xij. nitrum saturnisatum. Serum sinapium. Sp. nitr. dulc. decoct. expectorans. Emulsio asthmatica. Emulsio Brunneri. Expressio asthmatic. expressio milleped. hydromel. Joetis (in Asthmate humido) loboch. viride (in moribundis) mistura expectorans. Oxymel. asthmatic. Floyeri.*



## C A P U T V.

*Sive Fasciculus Morborum quintus.*

### M O R B I C O R D I S.

Cordis  
Morbi.

Art. 1266. **C**or variis Morbis gravioribus obnoxium esse, & revera affici ex defunctorum sectione satis patet. In Historia Medica occurrunt exempla *vermium* in ipsis ventriculis latitantium, item *calculorum* ibidem reperiendorum. *Tumores scirrhusi* & id genus alii Cor occuparunt; *apostemata, abscessus, & exinde sordida ulcera* ipsam Cordis substantiam & auriculas obsederunt. Omnes Cordis Morbos absolute lethales non statim existimandum est; contrarium etenim ex *Bartholomaei Cabrollii* observatione constat. Ipse ego (inquit) praesente *Rondeletio* duo mirabilia satis in duobus cadaveribus exhibui, in uno in basi Cordis ad coronariam *cicatricem* duos latos digitos longam detexi; in altero *ulcus* in Corde latitudine folii myrtini sat profundum. *Observ. Anatom. 26.* In adolescentis cadavere (inquit *Cheselden. Anat. p. 160.*) magnam vim puris in pericardio; & Cor ipsum exulceratum inveni. Et in homine tabi-



tabide mortuo pericardium undequaque Cordi adhærens, & portio ipsius Cordis ossifacta, fere unius digiti lata, reperta sunt.

*Art. 1267.* Verisimillimum est medicos interdum hallucinari inflammationem cordis, cum peripneumonia confundentes: æquum est enim, ut supponamus, cor inflammatione tentari, secus vix credibile est suppurationes, & ulcera ibidem existeret, nisi præeunte inflammatione. Dies melius docebit.

*Inflam-  
matio  
Cordis.*

*Art. 1268.* Quocirca quoties propria Cordis substantia constitutione aliqua præternaturali afficitur, æque solliciti debent esse medici ac in morbis hepatis, cerebri, neque negligenda sunt media, quæ aliarum partium Morbis similibus subvenire solent.

*Art. 1269.* Vermiculos, & in corde, & in capsulis ejus gigni, extra dubium est; & Morbus hic virginibus familiaris est. Noscitur ex puncturis & doloribus Cordis, & convulsio plerumque est signum diagnosticum. *Remedia mercurialia* hic præ cæteris profunt, immo *argentum vivum* in substantia exhibitum est maxime efficax, *Hartman.*

*Reme-  
dia ad  
Vermes.*

### *Ægineta sententia.*

*Art. 1270.* Cor si primario affectu fuerit læsum, procula Medicorum præsidio abest, vitam cum morte subito commutans, quando inflammationes, & ignitas rubedines, quæ erysipelata dicuntur, vehementesque intemperaturas in acutissimis febribus, sanguinis item fluxum, ex levi potissimum sinus cordis vulnuscule experitur. Si autem per consensum afficiatur, ex cerebri, jecinoris, oris ventriculi affectu, sique ex moestitia, & metu, aliisque compluribus causis,

*Morbo-  
rum cor-  
dis dif-  
ferentia.*

syncope appellantibus; qui repentinus est virtutis casus, oboritur.

Syncope a resolutione, & animi deliquiis, exiguo arteriarum percussu, extremarumque partium perfrigerationibus, & circumfluis sudoribus significatur, quæ si validior est, nullæ remediorum suppetiæ succurrere possunt. Virtute vero adhuc, vel tantillum constante, nonnumquam subvenire datur.

Validæ ad hæc cordis palpitationes subinde ex multitudine, aut fervore sanguinis in eo concepti, oboriuntur.

Cor vero iddem superexcalsfactum magnam, & frequentem inducit respirationem; refrigeratum autem, exiguam, atque raram.

*Lancisii sententia.*

*Duplex  
cordis  
palpitatio  
ratio.*

*Art. 1271.* Duplex cordis vitium memorat: adhæSIONem, nempe, pericardii, & sarcomata valvularum. Ut enim illud frequentius est malum apud tabidos, ac præsertim asthmate vexatos; ita longa disquisitione non indiget; nam satis est notare, obstructis ostiolis, unde intra pericardium liquor depluit, ac deficiente prorsus omni humiditate; quæ ambas cordis, ejusque capsulæ superficies ab adhæSIONe disjungit, illas inter se necessario cohærere, atque conjungi: præcipue si pericardium breviori orbe (natura, vel sæpiusculis contractionibus factum) contineatur, ex quo fiat, ut sit cordi propinquius.

Igitur ad posterioris animadversionem transeuntes, ingenue fatemur, hoc sarcomatum vitium in tot observatis cadaveribus, numquam, alias nobis fuisse compertum, nec adhuc ex aliorum lectione cognitum, utcumque viderimus hujusmodi valvulas cartilagineas, osseas,

exe-



exesas, phlogosi affectas, aut cum sanguiferis varicosis.

*Art. 1272.* Alia insuper cordis vitia ex aliorum auctoritate recensendo subjungit: Nota pluribus est, illa per Harveum memorata observatio de carne fungosa, externo cordis cono accreta. Nec ignoramus aliam Joh. Jacob. Martini de exsiccato corde, quod centum tuberculis tota externa superficie oblitum erat. Similiter notatu dignam censemus eam, quam refert Joh. Conrad. Peyer. de corde, cujus inæqualem superficiem carnei veluti lemnisci externe cingebant. Concretiones item Riverius, aliique caruncularum in modum intra cordis ventriculos invenisse referunt, sed quæ polypeam tantum substantiam, non vero sarcoma cum ejusdem cordis carne continuum representabant.

*Singulares quædam alia cordis affectiones.*

### *Ballonii sententia.*

*Art. 1273.* Nonnulli existimarunt cordis tremorem, & palpitationem iddem esse. At differunt longe, & ipsa definitione, & aliis multis: Nam palpitatio motus est momentaneus, tremor diu affligit. Savonarola tremorem cordis, & palpitationem confundit cum cardiaca passione. Aliud tamen longe est.

*Opiniones varias.*

*Art. 1274.* Palpitationis causa aliquando in corde ipso adest, & tum periculosior existit: aliquando a partibus vicinis est, aliquando a remotioribus, ut ab utero, a maligno tibiæ ulcere. Tuberculum in corde, abscessus item, *palpitationis* causa esse potest, multus sanguis obstructionem faciens, intemperies calida, vermes cor vellicantes, subita evacuatio, imprægnatio. Quemadmodum enim mulieres quædam veteribus affectionibus prehendi solitæ, quum

*Cordis palpitationis causa.*

utero conceperunt, iis liberantur, & miraculo absolvuntur, edito vero foetu repetunt, itaqueque pręgnantes mulieres insolentes morbi possunt invadere, ut palpitationes, & Epilepsię, dentium dolores implacabiles, & capitis gravitates.

Pręter causas commemoratas ipsius cordis inflammatio recensenda est, vel in eo sponte oborta, vel a propinquo pulmone ex peripneumonia communicata; unde animi deliquia facile accedunt. Item adnumeranda, aqua tunica cordis inclusa, si tunica aut humorem putrem, ac male olentem in se contineat, aut lapillos. Item venenata qualitas, spirituosus aut crassus halitus, vel ab arteriis, vel a corpore cordis, aut a pulmone, aut aliene, aliave parte, aut propinquiore, aut remotiores elatus. Adhęsio pericardii corpori ipsius cordis, quod in duobus hydropicis observatum est. Mucus per quamdam colliquationem in cor illabens.

*Diagnosis causarum.* *Art. 1275.* Si palpitationem, aut inflammationem, aut erysipelas committit, febris ingens adest, pulsus durus, & veluti ferratus. Si a venenata aura inferne in cor surgente, fugax est malum. Quum a venenata aura in pestilente statu, pręceptis virium omnium lapsus est. Quum a mucositate per modum colliquationis in cor fuso, æger fit anhelosus, parva & densa spiratio est. Vidimus palpitantem affectum ob aneurisma in liene.

*Prognosis.* *Art. 1276.* Si in corde ipso aneurisma sit, lethalis est affectus; Quę palpitatio syncopen veram junctam habet, insanabilis est. Quę ab adhęsu pericardii, lethalis est. Quę a colliquatione insanabilis; item & ea quę a venenata aura est. Ideo enim metuendus hic morbus est, quod connatam in se debilitatem, & quasi annexam



nexam syncopen habeat; quæ quidem syncopes morti finitima est.

*Art. 1277.* Quod præcipua hujus morbi cura *Phlebotomia.*  
in phlebotomia sita sit ad lypothimiam usque, id dumtaxat, intelligendum est eo in casu, quo inflammatio codis adsit, aut apostema ejus imineat, unde mors subita intentetur; in cæteris vero a largis istis evacuationibus temperandum est.

## PALPITATIO CORDIS.

*Villius.*

*Art. 1278.* Palpitatio Cordis est motus ejus *Palpitatio convulsiva.*  
( *convulsiva* ) adeo vehemens & immanis, ut non solum tactu manifestius percipi, verum & oculis conspici, imo interdum ad distans quoddam audiri possit. Porro ab authoribus fide dignis narratur ipsas costas interdum effringi, aut in junioribus foras propelli, p. 102. &c. de hoc morbo egregie scripsit *Villius*.

*Etmulleri sententia.*

*Art. 1279.* Causæ sunt variæ, aliquando exi  
crescentiæ verrucæ Cordi adnatæ, ossificatio *Causæ functionaria.*  
arteriæ magnæ prope cor, vermes in ipso Corde, aut pericardio, abscessus in corde, status sanguinis præternaturalis, palyposæ concrescen-  
tiæ, calculi, flatus, ataxia spirituum animalium affectum spasmodicum faciens, ( chlorosis seu pallidi virginum morbi, catameniorum obstructio. )

*Art. 1280.* Quæ a scorbuto aut affectione hy-  
sterica ortum ducit, est curabilis; quæ a reli-  
quis causis ut plurimum incurabilis. Cavendum *Curatio est difficilis.*

est ab opio, *venesection* in dubium vocatur, (*Galenus* vero, de locis affect. capitis, instat urgente paroxysmo *venesectionem* omnibus remediis præferendam esse.) Cura aggredienda est *martialibus*, *coralliatis*, *cinnabarinis*, *volatilibus*, & *succinatis*. *Ol. cinam.* laudatur a *Lindano*. *Rosmarinus*, *crocus*, *camphora*, *ambra*, *moscus*, *sal. volat. viperin.* (& alia *viperina*) *castoreum*, verbo uno *antispasmodica*. „ Si diutius protra-  
„ hatur, periculum ostendit *repentinæ mor-*  
„ *tis*. Qui hoc morbo in *juventute* tentan-  
„ tur, nunquam *senescunt* ex *observatione Ga-*  
„ *leni*.

*Remedia varia.* *Art. 1281.* Medicus peritus de usu sequen-  
tium quomodo & quando bene noerit; „ *au-*  
rum *mosaic. cataplasma stomach. emplast. stomach.*  
*fotus spirituosus*, *julap. moschat. mistur. hysteric.*  
*spirituos. saccul. stomach. tinctur. epileptica*, hæc ex  
*Pharm. Fullerii*. Item, *Pulv. ad guttet. sp. C. C.*  
*succinat. sp. lavend. comp. &c.* Vide etiam reme-  
dia ad singultum (907.)

### Meadii Sententia.

*Cordis palpita-*  
*rio ple-*  
*rumque*  
*a convul-*  
*sione.* *Art. 1282.* Non alienum est adnotare affectio-  
nem hanc plerumque esse *convulsionem*; qua  
cum cor sanguinem uno nisu non satis propel-  
lere possit, vim suam repetere debet: documen-  
to sane insigni, motus etiam istos, qui non  
voluntarii dicuntur, ab animo nostro, regi &  
mutari.

Illud etiam præsagationis loco adjungendum  
videtur; quod violenter infestans, & sæpius re-  
currens, hoc malum in *syncopen* tandem, seu  
fatalem virium defectum plerumque desinit.

*Curatio.* *Art. 1283.* Tot variis casibus medelam etiam  
variā accomodare oportet. Illud autem in uni-  
versis



versis tenendum est, nisi vires sint admodum imbecillæ sanguinem detrahi posse; quo, cum debiliior sit ad propellendum vis cordis, minuat-ur liquoris propellendi pondus. Et quidem non raro a plenitudine etiam oriri non tantum cordis palpitationem, sed & ipsam syncopen, animadvertimus; ita soliti cujusvis fluxus suppressioni, ut ex naribus, & hæmorrhoidibus, frequenter succedit præceps iste vitium lapsus; unde ad præcavendum hoc malum utilissima certe erit sanguinis missio. Vix autem aliæ quævis exinanitiones ferri possunt. Resolutio fibrarum ea, quæ in capite de paralyti sunt exposita, desiderat. Crassior sanguis, qui polypum generat, medicamentis attenuantibus, qualia sunt spiritus volatiles dicti, & gummi graveolentia, emendatur. Vesicatoria autem in primis si sopor urgeat, deficiente animo, optime stimulant, & languentem excitant.

## TREMOR CORDIS.

*Willisii Sententia.*

Art. 1284. Tremor cordis est carniū ejus *Tremor*  
*convulsio spasmodica*, seu potius *trepidatio*, qua *ris Cor-*  
fibræ motrices celerrime, ac tantum semicon- *dis de-*  
tractæ vices ocissimas, verum abruptas & quasi *scriptio.*  
dimidiatas efficiunt.

Art. 1285. Ad curam quod attinet, tria re- *Curatio.*  
mediorum genera maxime proficua esse solent,  
viz. *testacea*, *chalybeata*, & *sale volatili* prædita.

*Ettmulleri Sententia.*

Art. 1286. In tremore cordis pulsus inæqua- *Cum*  
lis est, & languidus, subinde virium ingens pro- *palpita-*

*ione  
Cordis  
frequen-  
ter con-  
fundi-  
tur.*

fratio & imbecillitas junc̃ta esse solet; & cor tremulo motu vibratur; adeo ut Tremor Cordis pertineat quodammodo ad *lipothymias*: pulsus aliquando est vermicularis; pauca apud authores prostant de hoc affectu seorsim; quoniam ordinario cum *palpitatione cordis* confunditur.

*Art. 1287.* „ Est potius plerumque *symptoma*  
Plerum- „ alterius morbi; quam morbus *primarius*;  
que est „ ideoque causa exquirenda est diligenter; &  
morbis „ morbus *primarius* inveniendus; & cura pari-  
secunda- „ ter instituenda.  
rius.

### Farrago sententiarum.

*Cordis  
tremor  
in quo  
differat  
a palpi-  
tatione.* *Art. 1288.* Cordis tremor differt a palpitatione, quod hæc majorem cordis partem immotam, quæ cor exerceat; hic quamdam ejus; locum differat sæpe mutando; & minorem partem. Ut plurimæ causæ utriusque affectus communes sunt; ita etiam curandi ratio eadem.

*Præcipue  
horum  
affectio-  
nū causa.* *Art. 1289.* Palpitatio cordis potissimum; & maxima ex parte, aut sanguini; aut vasis cordi appensis imputanda videtur: Prioris ratio sanguinis constat, in quantum sanguine aquoso, atque ad effervescentiam; aut accensionem minus apto prædito, ut virgines chlorosi laborantes; atque viri, & mulieres cachetici, huic morbo plerumque obnoxii reperiuntur; & insultum ejus a corporis motu citatiore fere constanter pati solent.

*Cautela.* Practici omnes in palpitationi obnoxiiis a vehementioribus purgantibus abstinere, ne humor commotus, aut vapor affatim in cor irruat, idque opprimat.

*Diuretica quæ-  
dam mi-  
lia.* *Art. 1290.* Diuretica palpitationi cordis obnoxiiis, ubi ex crasso sanguine cor hujusmodi morbo laborat, prohibet *Septalius*, quod exhauriant



riant serum sanguinis, huncque crassiores red-  
dant. In ea vero, quæ ab humore aqueo, &  
feroso ortum ducit, nihil est, quod facilius vim  
hujus morbi evincere possit.

In omni palpitatione cordis flatulentum quid  
adeft, & *anemia*. Observari potest in palpi-  
tationis vehementi paroxysmo majora esse pulsa-  
tionum intervalla, & quo longiora hæc sunt,  
eo violentiores esse istas.

*Art. 1291.* Venæ sectio, & purgatio quoniam *Remedia*  
exinaniunt simul & revellunt, optime hic res- *evacu-*  
pondent. Sive morbus a nimio spirituum im- *antia, &*  
petu, sive a nimia sanguinis rarefactione, aut *revel-*  
cohæsiōe sit, levamentum certe in singulis ca- *lentia*  
sibus a sanguinis quantitate imminuta expectari  
potest.

*Art. 1292.* In Palpitatione cordis cave ab o- *Nec o-*  
piatis, nisi ea fuerit per consensum. Si ægro *piū, nec*  
gratificandum sit pillulis, aloeticæ non excedant: *purgan-*  
scammonium & helleborus hinc exulent. Pur- *tia va-*  
gatio blanda sit, & per vices in palpitatione per *lida fa-*  
essentiam facta; secus in ea quæ fit per con- *ciunt.*  
sensem: modo vires ferant, additis semper cor-  
dialibus. *Hercules Saxonia.*

*Art. 1293.* Accessionis tempore, si vires non *Cucur-*  
admittunt sanguinis missionem, hirudines, & *bitula*  
cucurbitulæ cum scarificatione in usum veniant. *quando*  
Notandum vero cucurbitulas amplas corpore ad- *utiles.*  
huc pleno, cum flamma copiosa, & profunda  
scarificatione dorso admotas, sanguine in tho-  
racem attracto, vitium hoc excitare. *Saxon.*

Extra accessionem, corpore nondum purga-  
to; cucurbitulæ non sunt dorso admovendæ, sed  
artubus, quandoquidem materiam in partem  
affectam attrahunt. *Silvaticus.*

*Art. 1294.* In Palpitatione recenti ac frequen- *Cante-*  
ti, vesicatoria magis conveniant; in antiqua *ria, &*  
*vesi-*  
*cantia*  
& ra-

& rara cauteria infernis artubus admota; Præterea in diuturna, & frequenti vesitatoria, & cauteria applicentur brachiis, si materia defluat a capite; cruribus vero paullo supra vel infra genua, si affectio sit per essentiam. *Mercurialis.*

*Corporis  
labores  
proxii.*

*Art. 1295.* Peccante materia crassa, & suffocante, motus non sit laboriosus, nec localis, sed ejus loco sufficiunt extremorum frictiones, deinde blandæ ad pectus. Exercitatio mediocris convenit. Motus animi vitandus præcipue timor. Venere omnino abstinendum. Barba sæpius radenda sic enim spiritus dilatatur. *Matthæus de Gadibus.*

## L I P O T H Y M I A, S Y N C O P E, & Asphixia.

### *Tralliani sententia.*

*Syncopes  
causa.*

*Art. 1296.* Virium ruinæ, quas Græci Syncopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum præsertim os ventriculi gravantium copia, aut ex biliosis, nimiumque tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus; interdum vero etiam, dum ad os ventriculi confluunt, ut hac quoque de causa vires convelli, prostrernarique contingat. Quoniam igitur virium ruinæ non una ex causa, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus, biliosisque humoribus oboriuntur, videndum est: quomodo horum differentia discerni, notarique debeant.

Qui sane ob crudorum humorum copiam in syncopen incidunt; primum sane faciem habent tumidiorem, pallidioremque, os ventriculi totumque ventrem flatibus distentum, adhæc pulsus exiguos, raros, & tardos; insuper ructus  
susti-



sustinent acidos, habitumque pituitosiores præsentant.

Qui ob biliosos, tenuisque humore syncope laborant hac ratione internosci possunt. Primum sane facies ipsorum squalida est, & sicca; pulsus exigui, inæquales, & inordinati apparent, dejectio autem biliosa est, vigiliæ magis quam in aliis urgent, sitisque affligit.

*Art. 1297.* Curandi sunt qui ex crudorum humorum copia in syncopen incidunt tenui victu, atque omnibus, quæ extenuare possunt. Quamobrem si vires robustæ, & copia, quæ offendit, admodum ampla fuerit; vena secanda erit. Sin autem imbecillæ fuerint, & cruditas multa subsit, frictionibus incumbendum; at frictionem incipere convenit a cruribus deorsum, deinde ad totam spinam, & brachia transeundum est: postea rursus a brachiis ad inferiores partes, & pedes, idque frequentius faciendum est, ita ut virium ratio habeatur, quæ alimento opportuno, & meri potu refocillandæ sunt.

*Curatio.*

Contrario modo curandos esse constat, qui ex subtiliorum humorum putredine in syncopen incidunt. Cremor igitur halicæ istis convenit, aliaque edulia, non una vice, sed particulatim & ex intervallis offerenda. Vinum his aquosum dari debet, quale est Cnidium, aut Sareptinum, aut generosum Sabinum.

*Art. 1298.* Quoniam vero animi quoque defectiones syncopas inducentes agris contingunt viresque repente dejiciunt, consentaneum est, ut de his quoque generalius disceptemus.

*Lipothymia.*

*Art. 1299.* Qui igitur ob choleram, intesti-

*Lipothymia ab evacuatione curatio.*

aut

aut digitis, aut pennis inditis, imo, & manus, & crura ligare convenit, ac deligaturæ plures, vehementioresque esse debent, in superioribus quidem partibus si deorsum vergat evacuatio; in imis autem si sursum erumpat.

*Ab ute-  
ro.*

*Art. 1300.* Quæ ex utero animo deficiunt; eis mulsam potui dato, in qua thymum, aut origanum, aut Pulegium, aut hyssopum decoctum sit. Ac crura potius, quam brachia earum deligare, ac fricare oportet. Quibus sanguis ex utero immoderate profluit; earum mamillis cucurbitas defigere solemus, ita quibus uterus sursum, & ad latus attractus est, inguinibus femoribusque admovemus, & naribus ea, quæ foetidissimum odorem habent.

*Ex corde.*

*Art. 1301.* Sin autem ex propria facultatis, quæ corpus regit, imbecillitate animæ defectio contingat, quæ intemperiem illarum partium comitatur, unde vires ducunt originem, contrariis curabitur, calefaciendo quidem frigida; refrigerando autem calida: atque in aliis simili ratione. Facultas igitur, quæ vitalis dicitur, ex corde proficiscitur, quam ex obscuris pulsibus cognosci, demonstratum est; quæ autem ex jecore provenit, cruentis dejectionibus, quæ per initia quidem, aquosæ, & tenues, postea vero, amurcæ instar, crassæ fiunt. At quæ ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari vocabulo animale nuncupant, ex voluntarii motus imbecillitate cognoscitur.



*Ettmulleri Sententia.*

*Art. 1302.* Hi affectus differunt saltem gradualiter, non essentialiter. *Lipothymia* est (gravis languor) cum insigni spirituum defectione. *Syncope* est gravius animi deliquium, non multum ab *apoplexia* distans; atrociora adsunt symptomata, ægri inopinato concidunt, sensus & motus abolentur, respiratio vix ulla, aut pulsus, partes corporis frigent & pallent cum sudore frigido. In *asphixia* omnia hæc sunt adhuc graviora, ita ut cum pulsu plane abolito, & aliquamdiu ad sensum cessante, ægri instar mortuorum jacent.

*Horum  
affectuum  
differentia.*

*Art. 1303.* Horum affectuum causæ reliquæ, præter evidentes, quales sunt evacuationes nimix, balneationes nimis longæ, potus frigidus post corporis incalescentiam, animi pathemata, &c. sunt ut plurimum obscurissimæ, ut sunt *cordis abscessus, polypi, vermes, &c.*

*Causæ*

*Art. 1304.* Indicantur *spirituosa, volatilia, & aromatica, ol. cinnam. ambra,* præ omnibus *sal. volat. viperarum, aq. cordial. citr. croc. castor. (spir. carmin. sylv.)* externe *sp. sal. ammoniac. ol. succini, fumus succini;* aliquando confert *venese-*  
*ctio.*

*Indica-  
tiones  
curati-  
væ.*

*Art. 1305.* „ In syncope facies in colorem ca-  
„ daverosum mutatur, dentes, os, atque manus  
„ tam arcte clauduntur, ut vix recludi possint,  
„ pulsus fere nullus & vix ulla manifesta respi-  
„ ratio, sudor frigidus erumpit, & externa fri-  
„ gent: atque his signis diagnosticis ab *apople-*  
„ *xia* facile distinguitur.

*Syncope*

*Art. 1306.* Frequenter ex *polypo Cordis* ortum

*Causæ*

„ du-

„ ducit. *Vesperus* crurum fibroforum ramos ul-  
 „ nã longitudinem superantes extraxit a fœmi-  
 „ na cardiaca *syncope* interempta: talem in ju-  
 „ vene cavitatem venæ cavæ fere implentem re-  
 „ periit, & in aliis quamplurimis.

*Quid* Art. 1307. „ *Sternutatoria* naribus immitten-  
*endum,* „ da sunt, *cardiacis* & *volatilibus* imprimis in-  
*est.* „ cubendum est, *cucurbitula* sunt affigendæ.

*Bellini sententia.*

*Accura-* Art. 1308. *Syncope* vox apud *Hippocratem*, &  
*ta ho-* antiquos Græcos in usu non fuit, & ejus vice  
*rum af-* utebantur nominibus *lipothymia* *lipopsychia*, *af-*  
*fectuum* *phyxia*, & *apopsytia*, quorum *asphyxia* gravissi-  
*differe-* mum est malum, reliqua ejusdem fere gradus.  
*ntia.* Circa tempora autem *Galen*i inventa vox *synco-*  
*pes*, quæ significat morbum graviorem *lipothy-*  
*mia*, & duobus reliquis, *Asphyxia* leviolem, &  
 definitur præceps virium omnium lapsus, vel si  
 velis, ex vi Græcæ vocis, subita virium omnium  
 simul rescissio. *Lipothymia* autem est deliquium  
 animi similiter *lipopsychia*, deliquium animæ,  
 & idem sonat *apopsytia*. *Asphyxia* autem est  
 destitutio, vel privatio pulsus in toto corpore.  
 Demum *Eclipsis*, est enervatio, vel exolutio vi-  
 rium. Est igitur *Eclipsis* omnium horum mor-  
 borum levissimus, gravior *lipothymia*, *lipopsy-*  
*chia*, vel *apopsytia*, his gravior *syncope*, gra-  
 vissimus omnium *Asphyxia*. Differunt igitur hi  
 morbi secundum magis, & minus, nempe ma-  
 jorem, aut minorem virium lapsum, & quidem  
 subitum, qui cum pendeat e majori vel minori  
 pulsu, pulsui minimo succedit demum *Asphy-*  
*xia*.

*Syncope* Art. 1309. Cum *syncope* conjuncta observan-  
*diagno-* tur: præceps omnium virium lapsus, respiratio  
*sis.* ob-



obscura, aut nulla sensibilis, pulsus similiter minimus, aut etiam re ipsa nullus, (quibus duobus præcipue, atque unice distinguitur ab Apoplexia, in qua respiratio major, & cum stertore, & pulsus ut plurimum major, & plenus; & ab uteri strangulatione, in qua respiratio tollitur, sed non pulsus, nisi quando etiam syncope sympathicam producit), nulli convulsivi motus (quo ab Epilepsia distinguitur), pulsus demum omnino cessat; facies summe pallida est, aut livida: totum corpus, & ad extrema præcipue frigidum: sudor frigidus, ideo syncopiticus, præcipue in temporibus, collo, & thorace; color albidus præsertim in labiis: non vident, non audiunt, non loquuntur, subito collabuntur: facies hippocrática, nares, nempe, acutæ, oculi concavi, collapsa tempora, cutis arida circa frontem. Cum desperata est, & confirmata syncope, collum invertitur ut in strangulatis, & color faciei fit viridis.

Cum autem intorsio colli fiat per motum musculorum, & quidem alterutrius ex contranitentibus; quando in syncope hæc contingit, siue illa sit in latus, siue antrorsum, siue retrorsum, alterius contranitentis resolutio, vel valida convulsio alterius moventis necessario contingit, quod utrumque diversis etiam de causis irreparabile est.

*Art. 1310.* Qui sæpe & vehementer sine causa manifesta animo linquntur, ii repente moriuntur *Hipp. Aph. 41. sect. 11.* Igitur causa ejus deliquii interna est, atque permanens, licet non semper operans; operatur autem sæpe, & vehementer, igitur per illam frequentiam, ac vehementiam vires imminuuntur, unde tandem etiam si causa illa non fieret intensior, ad tantam virium diminutionem redigitur æger, ut cau-

*Prognosis.*

causæ illius insultum ulterius sustinere non possit, adeoque ipso statim invadente statim, seu repente moritur. Quia vero causæ morbificæ eo sunt intensiores, quo vires ægri imminuuntur; ideo eo facilius, & citius fractus ille viribus repente moritur.

*Farrago sententiarum.*

*Animi deliquii causa.* **Art. 1311.** Sectis cadaveribus syncope interemptorum detectum est, plurimos a concreto in ventriculis cordis sanguine, aliove humore ibidem stagnante ejusmodi morbi genere affectos periisse: alios a vermibus, & lapillis: alios a crassis, viscosisque succis in vena cava, & auricula dextra cordis hærentibus: alios ab affuso in pulmones sanguine, alios ab inflammatione pericardii, ulcere, sanieque cor obsidente: & quod majus, a pancreatis, ventriculi, & præcordiorum abscessibus, *Lucas Tozzi.*

*Curatio si ex stomachi vitio.*

**Art. 1312.** Notat *Hartmannus* in lipothymia ex stomachi vitio prodesse primum, quæ vomitum movent, deinde quæ roborant: ut oleum zedoariæ, essentia melissæ cum sp. vin. & aliquot gutt. ol. junip. Id quod observandum in lipothymia ex veneno assumpto, si adhuc ventriculi cavum occupet; imo vomitorium ex pinguibus, & oleosis conficiendum.

*In paroxysmo.*

In omni syncope, confert illico in faciem languentis inspergere spiritum, vel aquam rosarum, flor. mal. aurant. lilior. convall. cæterorumque hujusmodi, vel etiam aquam communem frigidam, excepto quando alvi fluxus adest: ut opportune observat *Matth. de Gadibus.* Tempora, nares, palatum, arteriæ in carpo, & cordis regio inungi poterunt oleo, vel balsamo succini albi, cinnamomi, caryophyllorum, rutæ,



*tæ*, *melissæ*, *citri*, de *scorpionibus Matthioli*, aut *Magni Ducis*; odor etiam *Ambari*, & *Moschi* cito succurrit, in *foeminis* autem, tum ab his, tum a reliquis rebus odoratis cavendum. *Theriaca* quoque, & *mithridatum* opem ferunt, si *vino veteri*, & odorifero diluta propinentur.

*Methodus vulgaris* commendat spirituosiora, interne propinanda ad spiritus, ut dicitur, excitandos, sed sanguinem fortius exagitant, ac morbo sæpe incrementum adferunt. Et licet ad sensus revocandos aliquid præstent, plus tamen vellicationes, frictiones, & punctiones in partibus sensibilibus ad hunc scopum contribuunt. Sic etiam post excitationem vitrum generosi vini plus analepticæ virtutis præbet, quam omnia balsamica acriora: nisi forte speciali odoris suavitate aliquid præstent.

*Art. 1313.* Non vana est, vulgaris illa commendatio, quod lipothymicis post paroxysmum propinari debeant medicamenta, sanguinem coagulatum resolventia: in tali enim ad interiora congestione, non tantum spissitudo sanguinis inducitur, sed facile etiam stases circa viscera, & febres inflammatoriæ exoriuntur. Natura namque ipsa hanc ministrat indicationem: cum profunda illa suspiria, post excitationem nihil aliud intentent, quam sanguinis præcipue circa pulmones, & hypochondria hærentis, discussionem. *Junkerus.*

*Art. 1314.* Si a concrecente sanguine syncope dependeat, dissolventia expostulantur; qualia sunt sp. & sal vol. C. C. sal. ammoniac. & viperar. elixir magnanimit. sp. vini.

*Art. 1315.* Si a vehementibus animi pathematis, ut præcipue contingit in pannico terrore, violenta iracundia, repentino gaudio, ingenti mœrore, postquam æger ex inspersis li-

*Post paroxysmum.*

*Si a sanguinis coagulatione.*

*Si ab animi pathemate.*

98 *Lipothymia, Syncope, &c.* CAP.V.  
quoribus resipuerit, blande in oppositas affectiones deducendus est.

*Si a ni- mia eva- cuatione.* Art. 1316. Si ab hæmorrhagiis, irruptionibus, depositionibusque sanguinis, aliorumque humorum evacuationibus lipothymia, aut syncope procedat, sistendus ille, cum fluit, dissolvendus vero, & per sudorem, si fieri potest, difflandus erit.

*Ab aliis causis.* Art. 1317. Cæterum cum syncope a variis causis dependeat, illarum ratione etiam diversum curandi modum desiderat. A quacumque causa fiat, urgente paroxysmo sequentia conveniunt: Supinus decubitus, vinum generosum aqua cinnamomi, vel cardiaca quævis: si ex defectu nutrimenti originem syncope ducat, alimenta potenter restaurantia conceduntur; si malum ab hysterica passione oriatur, remedia convenientia adhibeantur: si a maligna, aut venenata qualitate producat, alexipharmaca usurpentur; si autem a superpurgatione fiat, laud. opiat. gr. j. prodest. *Verzascha.*

## POLYPUS CORDIS.

### *Malpighii sententia.*

*Polypus Cordis.* Art. 1318. Polypi nomen a substantiæ piscis similitudine ortum, peculiari cuidam tumori in naribus excitato adaptari cœpit, donec observata quadam in præcordiis luxuriante materia, novus hic Cordis & vasorum morbus jam nunc *Ejusdem* audit. Figuram sortitur loci in quo generatur. *accura- ta de- scriptio.* Moles Polypi major est ut plurimum in dextro Cordis ventriculo, quam in sinistro; in dextro autem color est subalbidus, laridi instar, seu excreti succi, quem vulgo pituitam appellamus, & interdum rubra quædam, vel subnigra stigma-



ta conspersa habet : in sinistro autem colorem plerumque atrum , & densiorem obtinet substantiam . Morbosa hæc excrementa suam structuram habere videtur, etenim præ se fert congeriem superpositarum extensarumque pellicularum , quæ substantiæ modo nervosum corpus cum aliquali tamen mucositate referunt , & si eadem laceretur, solvi videtur in oblonga & solida filamenta ; hæc manifestiora redduntur in ejus appendicibus, quæ fasciculi instar in fibras quasi nerveas resolvuntur. Ex tota concreti sanguinis mole, grumosa pars appellata, affusa licet purpura, multiplicibus lotionibus cum aq. factis, rubicundæ illæ particulæ detergentur , & sanguis concretus tractu temporis albescit , & ejus contexturam plane fibrosam & reticularem oculis certe armatis videre licet ; & hæc est materia procul omni dubio ex qua generantur Polypi . *Malpighius de polypo Cordis* , p. 158. &c. consulendus est author , qui hujus morbi ætiologiam & descriptionem longe optimam literis mandavit . „ De polypis in auriculis & „ ventriculis Cordis hydropicorum repertis ( vid. „ *de Hydrop. Per.*

*Art. 1319.* „ Concrementia polyposa in apo- *Causa*  
 „ plexia demortuis frequenter inveniuntur ; & *est fre-*  
 „ procul omni dubio plerumque sunt causæ plu- *quenter*  
 „ timorum *symptomatum* atrocissimorum , nec *mortis*  
 „ non *mortis inopinata*, raro deprehenduntur an- *repenti-*  
 „ tequam ægrum jugulent. *na.*

### *Lancisii sententia.*

*Art. 1320.* Illud plerumque in præternatura- *Polypi*  
 li corporum constitutione solet accidere, ut vi- *genera-*  
 tium, quod simplex initio morbi fuerat , pro- *tio ex-*  
 gressu temporis geminetur , & quod a solidis *plicatur.*

incoepit, postmodum propagetur in fluida. Hoc sane evidenter apparet in forti seu valida compressione, vel vinculo ipsarum arteriarum; hæc siquidem affectiones, si diu perseverent, non tantum sanguinis excursum per illam arteriam præpediunt, & morbosam ejusdem liquidi repercussionem inducunt, sed efficiunt, ut tenaciores quædam cruoris partes, cum minus ad reflectionem sint mobiles, agglomerari invicem, paulatimque lateribus arteriæ adhærere incipiant, donec plenior ex novo affluxu facta moles, consimilium particularum, fila referentium, indensum, & fibrosi speciem exhibens corporis, quod polyposum dicimus, coalescat.

*Experi-  
mentis  
explica-  
tio illu-  
stratur.*

*Art. 1321.* Probat vero nostrum de generatione polypi assertum, ipsa experientia, quam sæpe in canibus firmavimus: etenim denudatam apud illos, unam ex arteriis Iliacis, cerato filo ante constrinximus; deinde curandum vulnus eorundem salivæ relinquentes, post 15. aut 20. dies secata per longum arteria, expositam concretionem canaliscavum, ita opplevisse animadvertimus, ut etiamsi soluto vinculo omnis tubo libertas redire potuisset, obstructio tamen ab irruente sanguine postmodum omnino tolli non voluerit; quia nempe substantia polyposa, vel nunquam, vel nonnisi longo tempore, seu repetitis pressionibus, & salis volatilis alluvione rursus dissolvi potest.

*Polypi  
cordis  
ratio.*

*Art. 1322.* In polypo cordis negligi certe a doctis viris non poterit examen causæ, cur sanguis in ejusdem cordis ventriculis non quidem consueta tenaci densitate, sed friabili, ac diffuente consistentia inveniat. Hoc sane phenomenon, ex defectu mixtionis rubræ cum fibrosa, & alba sanguinis parte, quæ intra cordis sinus in polypos coaluerat, deduci posse,

cen-



censemus : reliquum enim sanguinis facile diffuit fibrarum retinaculo solutum ; ut passim contingere videmus, etiam in extracto per venæ sectionem cruore, in quo cum superior pars in albam concrescat gelatinam, inferior, quæ nigra apparet, semper solito fluidior occurrit.

*Art. 1323.* Polyposas sanguinis concretiones, notatu dignum est, extra corpus ab acidis menstruis tantum dissolvi, ab alkalinis fixis vero, aut volatilibus nequaquam, quod ad dirigendum Therapejam in hujusmodi affectionum curatione plurimum facit.

*Qua polyposas sanguinis concretiones dissolvant.*

*Kinps-Macoppe sententia.*

*Art. 1324.* Clariss. & Eruditissimi Viri Caroli Patini describens morbum, litteris ad eum datis talia habet. Quæ ex morbose Iliade excerpti hæc sunt : Te scilicet ex valida, & activa constitutione sexagenarium factum, sollicitudinum varietate, ac litterariis laboribus attritum, vitæque sedentaria emollitum, duobus ab hinc annis in faciei pallorem, cacheticum habitum, & aliqualem extremorum emaciationem inclinasse, cum pulsu inæquali, & perturbato, ac dyspnœa præcipue, dum per plana inclinata digrediebaris ; Ptyalisimo aliquando copioso albo viscidiusculo nulla, vel tenui tussi, nullo dolore aut pondere in præcordiis, vel in dilatatione, aut constrictione thoracis sensibili, nulloque sonitu, aut stertore in respiratione, sed cordis anxietate, tremore, vel levi palpitatione, per vices exacerbaris ; quibus affectionibus phlebotomia, cathartica, bechica, ac sudorifica mereri consilium cum fuerit, in Hypochondrio excitato sudore, omnia symptomata exasperata fuisse, ita ut Orthopnoicus summo vitæ discrimi-

*Polypus cordis Symptomata.*

mine factus fueris; a quo repetita venæ sectione emersus, etsi per viginti circiter dies, symptomata omnia parum relaxari visa sunt, de-  
nuo tamen sensibilem cordis palpitationem, respirationem concitatam, anhelosam, ac cum efflatu, uti festinantibus, & suffocatis contingit, cum pulsu continuo inæquale, deficiente, ac recurrente, quibus etiam recrudescentiis repetitam phlebotomiam, quæ sanguinem densæ texturæ, cum crassamento glutinoso ad instar membranæ superextenso, uti in inflammatoriis affectibus apparet, opem tulisse fertur.

*Hujus morbi diagnosi difficilis.* **Art. 1325.** Quidam te pectoris, aut pulmonis hydrope laborare contendunt, quidam Asthma-  
te humoroso a phlegmate intercepto intra bronchiales fistulas, quidem vero asthma tantum sicco, & convulsivo. Alii pulmonis lobos vomica, vel crudis tuberculis obsideri, aut ejusdem membranas costis adnatas esse, alii leves arterias crassis humoribus, vel tuberculis obstrui conjiciunt. Nec desunt qui arteriarum aneurisma, vel auctam cordis substantiæ magnitudinem &c.

*Instantis mortis signa.* **Art. 1326.** „ Sed in dies ingravescente magis dispnoea ortopnoicus tandem omnino factus, triclinio affixus, diem noctemque transigebat. Pedes cedematoso tumore inflari cœperunt; sed ortopnoea ad extremum deducta, assiduis vigiliis, crebrisque suffocationibus, atque intra horar. 24. spatium sævissimis symptomatum insultibus laceffit frigidus pectoris, vultusque sudore, livoreque, VI. Id. Octob. ad meridiem apnoicus, sive exsolutus succubuit.

*Anatomica descriptio.* **Art. 1327.** „ Aperto cadavere, & ad cor accedentes arteriam magnam, ita dilatatam offendimus, ut aliud cor in pericardio contentum æmularetur, maxime quia tunica disse-

„ cta



„ Etia corpus cordi simile erueretur, quod nihil  
 „ aliud tamen erat, quam polyposa concretio,  
 „ quæ tendinosis principiis, brevibusque produ-  
 „ ctionibus supra semilunares valvulas aortæ in-  
 „ nixa, latiori ventre in laciniatum apicem de-  
 „ sinente ad divaricationem usque arteriæ por-  
 „ rigebatur. Apertis cordis sinibus dexter ina-  
 „ nis erat, sinister sanguinis infarciebatur gru-  
 „ mis, columnis tendinosis ipsius cordis adhæ-  
 „ rentibus, ut polypi rudimenta viderentur.  
 „ Sinistra auricula ita coagulato sanguine reple-  
 „ batur, ut serofitas ipsa immixta secederet.  
 „ Pericardium nec flatu nec aqua distentum e-  
 „ rat, imo exhaustum conspeximus.

## C A P U T VI.

*Sive Fasciculus Morborum sextus.*

### G R U D I T A S A C I D A & Nidorosa.

*Celsi Sententia.*

**Art. 1328.** **S** Tomachum infirmum indicant pal- Stoma-  
 lor, macies, præcordiorum dolor, chi debi-  
 nausea, & nolentium vomitus, in jejuno dolor litas ex  
 capitis. Quæ, in quo non sunt, is firmi stoma- causa  
 chi est. Nec credendum utique nostris est, qui frigida.  
 cum in adversa valetudine vinum, aut frigidam  
 aquam concupierunt, deliciarum patrocinium in  
 accusationem non merentis stomachi habent.

**Art. 1329.** At qui tarde concoquant, & quo- Eadem  
 rum ideo præcordia inflantur, quive propter ar- ex causa  
 dorem aliquem noctu sitire consueverunt, an- calida.

tequam conquiescant, duos tresve cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam adversus tardam concoctionem clare legere, deinde ambulare, tum vel ungi, vel lavari assidue, vinum frigidum bibere, & post cibum magnam potionem, sed (ut supra dixi) per siphonem, deinde omnes potiones aqua frigida intercludere.

*Ubi ci-* *Art. 1330.* Cui vero cibus acescit, is ante  
*lus ace-* eum bibere aquam egelidam debet, & vomere.  
*scat.* At is cui ex hoc frequens defectio incidit, quoties alvus ei constiterit, frigida potione potissimum utatur.

### Etmulleri sententia.

*Obglist-*  
*cario la-*  
*sa.*

*Art. 1331.* Morbi plerique, præcipue chronici, a depravata coctione originem ducunt; duo sunt vitia insigniora, cruditatis in coctione, viz. *cruditas acida*, & *nidorosa*.

*Crudi-*  
*tas aci-*  
*da.*

*Art. 1332.* *Cruditas acida* est, quando alimenta abeunt in liquamen acidum fixum plus minus viscidum, nec sufficienter attenuatum, & volatilifatum, fundamentum & origo morborum chronicorum.

*Signa*  
*crudita-*  
*tis aci-*  
*da.*

*Art. 1333.* *Cruditas acida* cognoscitur ex fœda, ructibus acidis & copiosioribus; quæ rejiciuntur per vomitum vel natura vel arte, sunt admodum crassa, viscida, ac pituitosa; alvus plerumque adstricta est.

*Curatie.*

*Art. 1334.* *Cruditas acida* corrigitur per *absorbentia* & *acidum destruentia*, ac *aromatica volatililia*, *nucem moschatam*, *zinziber*, *sp. C.C. &c.* Destructo in hunc modum acido, *purgantia* demum adhibenda sunt: nisi enim hæc methodus observetur, nihil per purgantia evacuabitur; sed



tormina & motus convulsivi excitabuntur. Usus *cancrorum fluviatiliū* mirè proficius est, ut & *Gelatina*, C.C. &c.

*Art. 1335.* Cruditās *Nidorosa* est, quando alimēta corrumpuntur ita, ut abeant in liquamen putrilaginosum horridi saporis & odoris, & omnino nutritioni ineptum; quod vocatur *Nidor*; exhalant ructus graveolentes *Nidrosi*. Appetitus est index, qui loquitur, & monstrat quasi, quæ sunt assumenda; hinc nobis inculcat *Hippocrat. in aphorism.* quod appetita facilius longe digerantur, quam non appetita. Verum est proverbium; *quod sapit, nutrit.*

*Cruditās nidorosa.*

*Art. 1336.* Ingestio variorum alimentorum ad Cruditatem *Nidorosam* disponit. Masticationem qui negligit, *Arabibus* animam suam odisse dicitur. Conqueruntur ægri de dolore gravativo stomachi duobus horis post pastum, item de ructibus 5. vel 6. hor. post alimentorum assumptionem, iisque non acidis, sed nunc insipidis, nunc putridis, nunc sulphureis, nunc genuinum saporem & odorem assumptorum repræsentantibus; mox post pastum adest rubor faciei, quasi essent ebrii.

*Diagnosiss cruditatis nidorosa.*

*Art. 1337.* Cruditās *Nidorosa* ructus habet fetidos, aut saltem horridos instar ovorum frigorum, aut piscium putridorum; percipiunt imprimis manè saporem peregrinum & abominabilem, quasi cinereum, seu ligni putridi, quem sufficienter esprimere nequeunt. Subinde amaror cum *cardialgia* & aliquali *nausea* percipitur, ex ore & stomacho; quæ vomitu rejiciuntur, sunt liquida; flava, & omnino insipida, aut quodammodo amaricantia, aut insipida dulcia, aut ex amarore dulcescentia; præterea habent alvum sæpius plus solito apertam. „ Cruditās „ *Nidorosa* juxta veterum principia est *intemperies*.

*Signa cruditatis nidorosa.*



*Intemperies ventriculi calida.* „ *peries ventriculi calida*, in qua omnia assumpta mutantur in bilem; signum hujus est fa-  
 „ por tetricus in ore, incipiente vel peracta  
 „ chylicatione.

*Curatio.* *Art. 1338.* Quoad curam convenit vomitus aut saltem evacuatio per *rhabarbarum & tamarindum*; post horum exhibitionem mire conducunt *julapia acidulata, succus aurantiorum, citrorum, elixir proprietatis acid. sp. salis dulcis, vitriolata, &c.*

*Nota bene.* *Art. 1339.* „ Probe notandum est (ut therapia rite instituat) ægroto incumbere non  
 „ modo remediorum sibi præscriptorum usui,  
 „ ut decet, insistere, sed quod cane & angue  
 „ pejus fugere alimenta sibi noxia, fomitem cau-  
 „ sis morbificis, & mala exacerbantia. Qualis  
 „ erit diæta, petendum præcipue ex nocentibus  
 „ & juvantibus, in quæ itaque diligenter diri-  
 „ gere oportet medicum.

*Flatus.* *Art. 1340.* Flatus in stomacho & intestinis fiunt per fermentationem vitiosam ab acido præternaturali in subiecto viscido excitatam. „ In cu-  
 „ ratione omnem paginam absolvunt *digestiva*  
 „ & *evacuantia* cum victu regulari.

*Apepsia.* *Art. 1341.* „ Ventriculus corporis *culina* ap-  
 „ pellari potest: ejus officium est alimenta reci-  
 „ pere tanquam in promptuarium, eademque  
 „ concoquere est ejusdem actio primaria; unde  
 „ „ *apepsia, sive indigestio* est totius œconomiae  
 „ ruituræ indubitata denuntiatio.

*Digestio.* *Art. 1342.* Digestio est opus simpliciter naturæ, nec arte promoveri potest; opus naturæ saltem adjuvare possumus & fermentum ventriculi corrigere ita, ut in statum naturalem reducatur. Propinanda sunt *vomitiva, cathartica, &c.* postea *stomachicis & corroborantibus* insistendum est, „ Mirum videtur in quibusdam so-

„ mnum



„ mnum, in aliis exercitium, coctionem prom-  
 „ ptiore ac faciliorem reddere, quod tamen  
 „ monet quotidiana experientia.

*Art. 1343. Remedia stomachica, & ventriculi Remedia*  
 lum roborantia insigniora sunt, quæ sequuntur. *Stoma-*  
*Mentha, absynth. utrumque, aromata, zedoaria, chita.*  
*grana piperis integra deglutita* (ad cruditates aci-  
 das) *rad. helenii, calami aromat. raphani rustica-*  
*ni, ari; plebeia quidem, sed optima stomachica:*  
*succus cydon.* (cum fumo sulphuris servatus,) tin-  
 cturæ ex *amaris & aromaticis* (cum ol. sulphuris  
 per campan. extractæ) *pulvis pepticus ex pelle*  
*interiore ventriculi gallinae, & tinctura ejusdem;*  
*chalybeata, cortex Peruvianus, cortex aurant. citr.*  
*conditus, item zinziber, & allium conditum,*  
*tartarum vitriolatum, tinctura sacra, elixir pro-*  
*prietatis, aqua gentian. comp. absynth. comp. spiri-*  
*tus menth. syrupus cydoniorum, rob. & miva eorun-*  
*dem, species diambra, crusta panis vino generosa*  
*ebria & cum pulv. N. M. caryoph. &c. conspersa, &*  
*ita instar scuti stomacho tepide applicata, &c.*  
 „ Stomachica alia celebriora & in praxi Londi-  
 „ nensi usitatiora sunt *Elixir magnum vitrioli,*  
 „ *tinctura stomach. amar. Quincii ad imitationem*  
 „ *Stoughtoni; vel sequens, quæ præstantior vide-*  
 „ *tur.*

„ *℞. Cort. aurant. sicc. ℥j. rad. gent. ℥ij. sem. car-*  
 „ *damom. min. zedoar. ana ℥j. caryoph. croc. ana*  
 „ *℥j. cochinel. ℥ss. sp. vin. Gallic. ℔j. f. tinctura s.*  
 „ *a. vel infusum sequens.*

„ *℞. Rad. gent. ℥ij. summit. absynth. Rom. p. ij.*  
 „ *calam. arom. ℥i℔. cubeb. ℥j. cort. aurant. ℥iij. in-*  
 „ *fund. in aq. bullient. ℥xxx. colatur. add. aq. absynth.*  
 „ *magi comp. ℥iij. misce; vel*

„ *℞. Rad. gent. zedoar. cassumunar. sem. carda-*  
 „ *mom. min. ana ℥j. cort. flav. aurant. sicc. ℥ij. in-*  
 „ *fund.*

„ fund. in aq. bullient. ℥ij. colatur add. aq. gent. ma-  
 „ gis comp. ℥ij. sp. lavend. comp. ℥ss. misce.

„ In omnibus fere imbecillitatibus & morbis  
 „ ventriculi *masticatio rhabarbari* conducit, præ-  
 „ cipue in alvum habentibus adstrictiorem.

„ Item *Electuarium e zinzib. mistura stomachi*  
 „ & *julap. stomach.* Et pro usu externo *Fotus sto-*  
 „ *mach. epithema, scutum, sacculus emplastr. robo-*  
 „ *rans, ex Pharm. Fullerii*, quandoque usurpari  
 „ possunt.

*Art. 1344.* „ Stomachica debent esse tempe-  
 „ rata, (ut recte annotavit *Vualdschmidius*) ne  
 „ fortioribus remediis calorem nimium vel au-  
 „ geamus vel extinguamus, & ne fermentum  
 „ reddamus acrius vel debilius, hinc præstat  
 „ pauca dosi & per intervalla remedia *stomachi-*  
 „ *ca* exhibere, quam uno impetu ventriculum  
 „ remediorum mole obruere.

*Nausea* *Art. 1345.* Nausea & vomitus: in genere vo-  
 „ & vo- mitus omnis, qui non est *nimius*, ut plurimum  
 „ mitus. est *salutaris*.

*Curatio.* *Art. 1346.* In omni vomitu unice observetur,  
 „ ut *alvus*, quantum fieri potest, teneatur *aperta*.  
 „ Ad vomitum sistendum conferunt *cydoniata*,  
 „ *syr. & tinct. coral.* præ reliquis *succus cydon. sp.*  
 „ *menth. sal. absynth. cum succ. limon. &c.* Externe  
 „ *decoct. absynthii, menth. cort. granator. flor. ros.*  
 „ *rub. &c.* in vino rub. coct.; *sacculus crocæ* ventri-  
 „ culo admotus egregie vomitum sistit, ut & ca-  
 „ taplasmata ex *fermento & pulv. aromaticis*. In  
 „ genere præmissis rite universalibus *stomachica*  
 „ (1343.) sunt usurpanda; *decoct. fracastr. elect.*  
 „ *zinzib. julap. stomachicum, coral. mislur. stomach.*  
 „ In vomitionibus ab emetico fortiori excitatis  
 „ (teste *Vualdschmidio*) si detur coch. j. *spiri-*  
 „ *tus vini*, vomitum in momento compescet.

*Art.*



*Art. 1347.* Vomitus *cruentus* frequenter a pancreate oritur; quando, scilicet, vasculum ejus a succo acriori corroditur, ex irritatione duodeni partim sursum in ventriculum propellitur, partim inferius defertur, dolor gravativus, & obtusus in superiori lumborum regione, ubi situm est pancreas, præcedere solet. Non raro decipiuntur medici, qui vomitum materiæ *nigricantis* habent pro *cruento*. In vomitu *cruento* Hæmorrhoidum fluxus est salutaris; est enim evacuatio quasi vicaria.

*Art. 1348.* Ipse ventriculus quandoque gravissimis *Hæmorrhagiis* obnoxius est. Et revera vomitus sanguinis a quacunque causa oriatur, periculo haud vacat. Nimia sanguinis ejusmodi effusio intra ventriculi parietes, vel extra corpus ejectione mortem subitanæ interdum infert; vel si sanguis in ventriculo extravasatus restat, ibidem grumescere solet & corrumpi; inde graves *Lipothymie* & *suffocationes* creantur.

*Art. 1349.* Remedia in hoc affectu sunt succus *urticæ*, sem. *hyosciami*, *catechu*; lap. *hematit.* cum blandis acidis, aut succ. *cydon.* Aliquando etiam pus exernitur, & per vomitum rejicitur. Convenit *antimon. diaphoret. antihect. Poterii*, *sacchar. saturni*, *haustus japonicus Fulleri*, *tinctura antiphthisica*, &c.

*Art. 1350.* *Anxietas præcordiorum* est insignis dolor circa scrobiculum cordis. Malum hoc oritur semper ab affecto plus minus orificio ventriculi sinistro.

*Art. 1351.* *Cardialgia* est ventriculi orificii superioris dolor admodum molestus, & intensissimus; oritur ex effervescentia succorum heterogeneorum, maxime bilis, unde percipiuntur chlogoses, & insignis ardor. Causæ hujus mali sunt

sunt variæ, bilis vel succi pancreatici vitia, lumbrici, ulcus orificii ventriculi, &c.

**Cura.** Art. 1352. Dosis *theriac. Andromach.* egregium est *anticardialgicum*. Cura ut plurimum inchoanda est cum vomitorio, & postea opiata cum purgantibus admiscenda sunt. *Tinctur. sal. tartari* a gutt. xl. ad l. item *pulv. testac. cum castor. oleum amygd. dulc.* est maxime efficax; laudatur decoct. *fassafr. externe linimenta, empl. e tacamahac. caran. & balsam. Peruv.*, *Pulvis interioris pellicula* „ *ventriculi musculosi gallinae ad ʒj.* in vehiculo „ appropriato est efficacissimum remedium huic „ malo (inquit *Sharrv.*)

**Anorexia.** Art. 1353. Anorexia sive inappetentia est, quando ægri destituuntur desiderio ad alimenta. Ratio habenda est morbi alicujus tanquam causæ, unde *indicationes curative* petendæ sunt, & postea *stomachica* (343.) sunt usurpanda, &c.

**Malacia & pica.** Art. 1354. Malacia est appetitus nimius, unde interdum, plus quam conducit, comeditur. Pica est appetitus insuetorum, ut cruda animalium carnis, carbonum, calcis vivæ, &c., „ In „ virginibus *chlorosis Picam, vicissimque Pica* „ *chlorosin fovere solet.* Pica est affectus chroni- „ cus, & non infrequenter ad *hydropem, cache-* „ *xiam, vel marasmm* viam sternit. Non so- „ lum virginibus accidere solet, sed plerumque „ gravidis quoque; iis vero non adeo pernicio- „ sa est. “ Hi affectus oriuntur ex depravato stomachi fermento; ideoque *evacuationibus, & stomachicis* sunt curandi.

**Bulimus.** Art. 1355. Bulimus seu appetentia canina, est voracitas nimia; ægri copiose deglutiunt alimenta, sed non comminuunt; est affectus plerumque ab extremo ambientis aeris algore pro- genitus, in cibi fastidium brevi desinens. *Appetentia canina* est semper cum vomitu vel diar- rhœa,



# CAP. VI. *Ventriculo Morbi.*

III

rhoea, „ Præcipua cura in diætâ est quærenda.  
 „ Omnia pingua, & dulcia temperata illi pro-  
 „ sunt, ut & leniter purgantia. “

*Art. 1356.* „ Crapula, per quam intelligo id, *Crapu-*  
 „ quod nostro idiomate vocamus a *Surfeit*, est *la.*  
 „ mala corporis habitudo cum sensu gravitatis  
 „ ad ventriculum, & ægritudine; supervenire  
 „ solent plerumque *Eruptiones cutaneæ & febr-*  
 „ *cula*: Causa usitatioꝝ hujus affectus est edi-  
 „ lium vel potulentorum nimia voracitas; in-  
 „ gesta autem non minus qualitate, quam quan-  
 „ titate peccabili lædencia esse possunt; aliæ quan-  
 „ doque etiam sunt causæ, uti potio nimis lar-  
 „ ga frigida, vel cerevisiæ tenuis æstivo tempo-  
 „ re, exercitium nimis violentum, fervida ac  
 „ sulphurea aeris constitutio, & similia. Eru-  
 „ ptiones cutaneæ sunt de genere *Erysipelatoso*,  
 „ quod ordinario appellamus a *Rash*.

*Art. 1357.* „ In omnibus hisce affectibus, & *Cutanea.*  
 „ præcipue a Crapula proprie dicta originem du-  
 „ centibus vomitorium, quam primum est pro-  
 „ pinandum, & si febris nondum invaserit do-  
 „ sis tincturæ hier. die proximo exhibenda est.  
 „ Si eruptiones in conspectu veniant, susten-  
 „ tandæ sunt cardiacis, & lenibus diaphoretici-  
 „ cis; potus sit serum lact. vino Canariensi al-  
 „ teratum, & alias infusum salviæ. In habitu  
 „ plethorico, ubi febris intensior fuerit, *phle-*  
 „ *botomia* locum habere potest.

## *Farrago sententiarum.*

*Art. 1358.* In morbis ventriculi non minus *Vomitor-*  
 ea quæ cavere, quam quæ facere oportet pro- *nes fre-*  
 ponenda habeto. Et primo quidem, quamquam *quentio-*  
 pituitam viscidam, quæ stomachum gravat, vo- *res ob-*  
 mitu interdum ejicere maxime necessarium sit; *sunt.*  
 fre.



frequentibus tamen vomitionibus motum illum naturalem , quo alimenta deorsum pelluntur , invertere, concoctionem ciborum plurimum perturbat, & impedit.

*Stomachum roborantia.* *Art. 1359.* Appetitum ad cibos acuunt herbarum amararum infusiones, quæ ipsam sæpe concoctionem adjuvant; at metus est, ne longus illarum usus fibras musculares nimis calefaciat. Quocirca acidis quibusdam, præsertim elixire vitrioli *Mynsicht*, illas simul adstringere non raro convenientius est; ea tamen adhibita cautione, ut dum adhuc tenax est, quæ ventriculo inhæret pituita, illis abstineatur. Frequentissimum enim stomachi malum est, quo resolvitur; idque certe fibrarum ejus constrictionem desiderat. *Richardus Mead.*

*Cupiditas item que, fastidium ciborum quid porrendat in morbis.* *Art. 1360.* Aliqua etiam animadverti circa appetentiam, aut fastidia ciborum possunt. Optimum signum est omnibus in morbis bene se se ægros, ad alimenta, quæ offeruntur, habere. At cibum adversari coepisse, per longos morbos, & post eos, malum est; itemque post cibi cupiditatem fastidio ejus affici. Nullum leve malum timeri in longa appetentiæ amissione potest, maxime si contractum a frigore id vitium fuit. Æque perniciosum est boulimo aliquem, aut canina urgeri appetentia coepisse. In hac ipsa desiderium plurimum epularum est, multumque voratur: quod quia onere ventriculum gravat, iterum vomitum extruditur: atque sic levatus homo vorare denuo nova cupiditate incipit, rursusque, ut canis, quod assumptum est, vomit. Sæpe hoc vitium bulimum, & altum soporem, & lævitatem intestinorum, & hydropem, & atrophiam, ipsamque necem intulit. In eodem ægri primum multa fame urgentur, quæ tamen non omnino im-



moratur, quin enim animus subinde deficit, simulque concidit spiritus, extremaque refrigescunt. Tum profecto in propinquo syncopes est, quam ipsa excipit mors. *Lommius.*

*Art. 1361.* Observandum: viscera esse, quæ sanguis non hoc, vel illo sui succo, sed tota sua mole impetere solet; unde concludendum non ab hoc aut illo succo venire impetus, qui viscera illa lacescunt; proindeque istiusmodi impetus ex iis non erunt, qui purgationi obsequuntur. De illorum viscerum numero est stomachus, qui a sanguine una pati consuevit, quidquid illi evenit mali. Saltem a sanguine nasci consueverunt vomituritiones, quibus lacescitur stomachus cum mensibus, & hæmorrhoidibus morantibus aut suppressis incessabilis illi veniat vomendi cupido. Inde quod vix apud vulgus inveniet fidem, a purgantibus finiuntur minus, quam exacerbantur vomendi molimina, quæ sanguinis vacuatio magis, quam humorum evacuatio sedat. *Hequetus.*

*Stomachi vitia non semper ab humorum cruditate.*

*Art. 1362.* Ventriculus cum viscus sit omnium membraneum, nervoso generi universo commodo, aut incommodo in primis est. Hinc ægritudinum fere quarumlibet origines a stomacho nasci, tam vera suspicio est, quam certa fides a solidorum (quæ nervi sunt) vitio maximam morborum partem oriri. Etsi affirmabis alimentum ætate delabente siccandis indurandisve partium flaminibus aptum, esse longævitati contrahendæ, vel accelerando senio opportunum, ubi addas incommoda discriminave, quæ ex tardata aut imminuta partium oscillandi vi exsurgunt, causas habebis imminutæ, aut imminuendæ hominum longævutatis, simulque morborum, quibus conflictantur origines; quorum

*Non raro ab imminuta fibrarum elasticitate.*

præcipui sunt: stomachi infirmitas, ructus, flatus, pro quibus exinde corrigendis imminuendisque meri potum senes plurimum habent, suumque læc vocitando laudibus extollunt.

*Plurima Soda causa.* Art. 1363. Morbus quem recentiores Medici *Soda Galli* vero *Fer-chaud* vel *ardor stomachi* vocant, dolor est exurens, vel potius ardor, qui a ventriculi orificio secundum oesophagi longitudinem usque ad fauces extenditur. Hic a diversis quidem causis produci potest, ut ex acida indigestione, ex bile in stomacho congregata, ex hujus visceris inflammatione, vel etiam ex acidorum liquorum abusu: ut *Cerevisiæ* &c.

*Remedia ad sodæ essentialem.* Art. 1364. Prior *Sodæ* species quæ ab acidis indigestionibus producitur eos frequenter corripit, qui Castaneis torrefactis abutuntur. In hac conveniunt haustus copiosi aquæ tepidæ & infus. herb. *Thè*. Altera species ex acri bile in stomacho congregata proveniens cognoscitur ex oris amaritudine, viscerum ardore, siti &c. Colagoga purgantia ad hanc requiruntur, quibus potus *Thè* copiosus largusque præmittitur. Tertia species sanguinis emissionem reposcit, *Ptisanas* & juscula pulli gallinacei &c. Quarta species Potatoribus familiaris, absorbentibus feliciter curatur. Testatur etiam *D. Homberg* lapides cancrorum dicto citius hunc morbum compescere.

*Ad symptomaticam.* Datur etiam sodæ species, quæ symptomatica est, quia ab uteri, vel jecuris, vel aliorum viscerum inflammatione excitatur. Hujusmodi symptoma ceteris sæpe evidentius in hujusmodi morbis prodit, a quo etiam morbi species indicatur; quare eadem methodo, qua principalis morbus, curatur. Pro omnibus stomachi mor-

mor-



morbis rite percipiendis consulatur opus D. *Hecquet: De la Digestion* &c. gallice inscriptum edit.

1730.

*Art. 1365.* Inter casus oppido raros recenset *Ventriculi prolapsus.*  
Morgagnius in *Epistolis Anat. Med. Lib. III. epist. 39. §. 14.* quem observare contigit eximio Valsalvæ de procidentia ventriculi cujuscmodi, sequens est: Mulier gracilis, annorum circiter 40. cum hysterica affectioni multum esset obnoxia, ejusque præsertim gravioribus paroxysmis, qui convulsivis motibus universum corpus, præcipue autem ventris viscera concutiebant, cumque nonnullos tandem cæterorum gravissimos passa esset; animadvertere cœpit manifestam tum in epigastrica regione depressionem tum in hypogastrica extuberationem. Illa nunquam mutabatur; hæc sæpe intra unum diem. Nam majorem, & prædurum tumorem cum ostenderet; sæpenumero hic repente concidebat. Item cum alimenta sumebantur; hæc eodem usque præcipitari mulier sentiebat, eaque pars inde magis attollebatur; graviorque fiebat ponderis sensus, qui semper ibidem erat: interjectis autem quatuor aut quinque horis dolores acerbissimi, & tormina, & animi defectiones excitabantur. Ægra sæpe querebatur, sibi omnia viscera; sic enim agebat; e suis sedibus esse prolapsa. Coctiones manifesto vitiatas habebat: febricitabat, erat valde emaciata. Cum tres menses sic, ut diximus, affecta vixisset; decessit.

In cadavere id inventum est, quod suspiciebatur; ventriculus ad hypogastrium prolapsus, vix ut quatuor transversæ digiti inter ipsum pubemque intercederent; pars enim illa ventriculi, quæ gulæ respondet, usque adeo in lon-

gum producta erat, ut fundus totus esset in hypogastrio. Causa videtur Morgagnio convulsiones viscerum, quæ ventre continentur, quippe quibus eam partem extenuando, eoque longiorem efficiendo, quæ gulæ continuatur, hucusque detractus sit ventriculus. Nec profecto alias causas, quæ huiusmodi prolapsum efficere possunt prætergreditur, quas imo ad duo præcipua capita revocat, viz. ad tractionem ab imo venientem, aut ad compulsionem de summo. „ Trahebatur enim, inquit, in Vesalii „ ægro a gravissimi omenti pondere, in Meryi „ observatione a tenuibus intestinis pene omnibus in scrotum devolutis, aut in prælongum „ alterum saccum, ut in observatione Henrici „ Papen; Compellebatur vero deorsum depresso diaphragmate, aut prægrandi jecure, cuiusmodi in duabus Fantoni Patris observationibus aliisque a Valsalva aut a me captis,





## CHOLERA MORBUS.

*Hollerii sententia.*

*Art. 1366.* Cholera morbus est accuratissimus, *Morbi*  
 sine febre fere, quæ vel uno die, vel altero, *defini-*  
 vel certe paucis diebus hominem rapit, substan- *tio.*  
 tia corporis effusa, partim assiduis vomitioni-  
 bus, partim iisdem dejectionibus.

Hippocrates cholerae siccae meminit de ratio- *Et na-*  
 ne victus in acutis §. 4. cujus naturam, & cu- *tura.*  
 rationem ex eo loco intelliges. In humida vero  
 animadvertendum in primis est, ut si fieri po-  
 test, vomitus componatur, & relinquatur mo-  
 tus, qui ad intestinum est. Corrupta fere, ac  
 exitiosa materia, quæ excernitur, initio reti-  
 nenda non est, sed tum primum, cum vires  
 inde concidere videntur.

*Art. 1367.* Itaque initio aquæ tepidæ, aquæ *Carallo.*  
 hordei, aliquando etiam adjecto momento sac-  
 chari, aut mellis, ubi frigida materia est, im-  
 perandus est potus ad unc. vj. Quod si æger bor-  
 borygmis, & flatibus sollicitatur, cochleare di-  
 midium seminis cumini poterit aqua incoqui.  
 Hac arte fluctuans materia, & ad vomitum in-  
 citata repurgatur, deinde sistendo vomitui in-  
 tendendum est.

℞. Jalap. ros. unc. iiij. succ. granator. unc. j. sem.  
 Misce, & utatur æger brevibus intervallis duo-  
 bus, aut tribus cochlearibus. Conveniunt & syr-  
 rup. Rosat. Myrthin. de cydoniis, de granatis,  
 & similis in causa frigida, in causa autem ca-  
 lida omnino iidem, sed conspersis pulveribus  
 spicæ, cinnamomi, nucis moscatæ, & similibus.  
 Hæc omnia oportet cochleatim assumere brevi-

bus intervallis, & sine aquis. Largior enim potus hic non convenit.

*℞. Santal. rubr. rosar. ana ℥ij. galliæ moschat. ℥sem. Camphor. gr. v. aq. ros. unc. iv. acet. unc. j. sem. misc.* Panniculi in hac miscella merfi, & expressi, quantum fieri potest frigidi, toti ventriculo applicentur. Potest inungi stomachus oleo rosato, de cydoniis, de spica, de absynth. ut res exigit.

*Si æger facile, & assidue vomat.*

Quodsi nihil contineat æger, prius data aqua tepida, cucurbitulam magnam affiges ventri, & interim dum ea cucurbitula affixa est, cibum exhibebis. Brevibus intervallis cucurbitulam figes, & refiges, & ita nutries.

Consensus est veterum Medicorum dropacismum impositum ventri singulare esse remedium assidue vomentibus. Parabis dropacem ex quatuor partibus picis, & olei cydonior. una, simulque liquatis: super alutam extendantur. Postremo medicamentum calidum ventri applicabis.

### *Scardone sententia.*

*Cholera sicca descriptio.*

*Art. 1368.* Violenta aeris per superiora, & inferiora cum impetu, & sonoro strepitu eruptio, *cholera sicca* appellatur, quæ tum excitatur, cum particulae aeris spasmodica fibrarum oesophagi, pylori, & totius canalis intestinorum constrictione comprimuntur, ac carcerantur, mox hisce resolutis libere, ac violenter erumpunt.

*Descriptio humidæ.*

*Art. 1369.* Choleram humidam ventriculi, & intestinorum vehemens dolor, inflatio, distentio, pulsus parvi, frequentes, animi deliquia, singultus, spiratio celerrima, sudores frigidi



gidi, extremorum refrigerationes, eorum contractiones, convulsiones non raro sequuntur.

*Art. 1370.* Cholera certis temporibus recur- *Progne-*  
rens, quæque declinationibus febrium superve- *sis.*  
nit salutaris. Ceterum acutissimus morbus est,  
atque 24. hor. spat. hominem interficit.

*Art. 1371.* In cholera sicca ol. amygdal. dulc. *Curatio*  
f. i. r. e. ad unc. v. cum laud. liq. gutt. vj. vel x., *sicca.*  
nec non clyster. ex decoct. fl. Chamomil. cum  
furfure unc. vj. ol. lil. alb. violar. ana unc. j.  
sem. philon. roman. vel Theriac. ℥ij. sæpius in-  
jecti eximiam operam præstant. Vinum matu-  
rum, lene, odoriferum, calidum quotidie bis  
exhibeatur.

*Art. 1372.* In cholera humida jusculum pulli *Curatio*  
ægro ad libras per intervalla tepidum propine- *humida.*  
tur. Clysteres eodem tempore injiciantur ex  
eodem jusculo add. syrup. portulac. lactuc. violar.  
Post quatuor vel quinque hor. sequens mixtura  
exhibeatur: ℥. Aq. menth. e succ. flor. chamo-  
mil. Theriac. ana unc. j. aq. cinnamom. el. ℥ij. sy-  
rup. berb. ℥vj. Laud. liq. cydon. gutt. x. m. Ex-  
trinsecus Emplast. ex theriaca, vel sequens Ce-  
ratum ventri applicetur. ℥. Cerat. Tachamac.  
unc. sem. Camphor. Opii ana ℥ sem. dissol. camph.  
& opio, cum sp. vin. reformetur ceratum pro  
usu dicto.

*Art. 1373.* Quid non præstant interdum, ubi *Quid*  
de ægro fere conclamatum est, aquæ perquam *faciendū*  
frigida potiones? Uti nimirum initio morbi *in ex-*  
aquæ tepida, ita decursu ejusdem frigida mi- *tremis.*  
rum in modum conferre visæ sunt.

*Sydenhami sententia.*

*Art. 1374.* Malum ex se cognoscitur: adsunt *Cholera*  
enim vomitus enormes, ac pravorum humorum *morbi*  
cum maxima difficultate, & angusta per alvum *descri-*  
dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehe- *ptio.*

mens, inflatio, & disientio, cardialgia, fitis, pulsus celer cum æstu, & anxietate, nausea, artuum contractura, extremorum frigiditas, animi deliquium, &c., Bilis supra infraque magno impetu prorumpit, primum liquidior, pallida, & subflava; dein crassior, majoremque colorem exhibens, flavum scilicet, praefinum, coeruleum aut etiam nigrum.

*Metho-  
dus me-  
dendi.*

*Art. 1375.* Pullus tenerior elixetur in aq. font. cong. circiter iij. *hujus decocti* cyathos plenos exhauriat æger, eodemque tempore injiciatur *enema* ejusdem liquoris semel atque iterum, vel ad 3<sup>am</sup>, 4<sup>amve</sup> vicem; his addi possunt *syr. portulac. lactuc. violar.* &c. Exantlato hoc eluvionis penso detur *paregoricum*. Si vires ægri exhaustæ fuerint, & valde debilitatæ ante adventum medici ita, ut extrema frigescant, recto cursu ad *laudanum* confugiendum est. Vix ultra *Augustæ* limites evagatur.

### *Ettmulleri sententia.*

*Prognosis.*

*Art. 1376.* In genere qualiacunque symptomata fortem ac deleteriam antimoniam purgationem, aut helleborum album sequuntur aliudve catharticum, ea similiter obvia sunt in cholera. Cholera, quæ sponte sua sine causa manifesta externa corripit ægros, ut plurimum est funesta. Est malum peracutum intra 24. horas, biduum, vel triduum, jugulans; periodum fere observat tertianariam, ita nempe ut de 3<sup>o</sup> in 3<sup>o</sup> diem moveatur, seu plus minus exasperetur; quo magis excrementa a *statu naturali* recedunt, eo periculosior. Cholera aliquando est *epidemica & lethalis*.

*Remedia  
qualia.*

*Art. 1377.* Remedia petenda sunt ab *Art. de vomitu*, de *diarrhea*, &c. causa morbi, si in  
veniri



veniri possit , bene pensitata . Vires decocti  
rad. ipecacoan. tentari merentur. Vid. dysen-  
teriam.

*Farrago sententiarum.*

Art. 1378. Cholera duplex est , una in qua humores pravi sursum , deorsumque cientur ; altera sicca , in qua flatulenti spiritus acerrimi-  
que proripitatio est.

*Morbi  
species ,  
& cura-  
tio cum  
cautio-  
nibus.*

In cholera suppressio prodeuntium mala est , quia cruda sunt . Oportet itaque si facile ac-  
cumbenter exeant , permittere , sin minus , ea in-  
citare .

Si vires ægri exhaustæ fuerint , & valde de-  
bilitatæ ante Medici adventum , ita ut extrema  
frigescent , recto cursu ad Laudanum confugien-  
dum est .

In Curatione Cholerae cum primis humidæ ,  
cave ne ab initio talia adhibeantur , quæ flu-  
xum humorum acriorum , & præter naturalium  
omnino cohibent , secus si feceris , recidiva mor-  
bo suo periculosior metuenda est .

Cavendum etiam a purgantibus fortioribus ne  
ignem igni addamus , cum & lenissimi cathar-  
tici operatio magis perturbet , & novos tumultus  
excitet .

Anodyna & Opiata aut parce , aut plane non  
sunt propinanda , ubi vires jamdudum ex toto  
sunt prostratæ , ne somno lethali accedente Me-  
dicus ægrum enecasse videatur .

Gonagram medicamentis repressam , spretis-  
que fonticulis cholicos motus lethales fecisse  
observavit *Prevotius* .

In cholera humida ubi major irritatio quam  
humorum impetus isque minor quam copia est ,  
pharmaca ne sint multum adstringentia , sed me-  
dio-

diocriter laxantia, & aliquo modo roborantia.  
*Rhod. in analect. ad Septal.*

Cholera sicca diuretica, non admittit, inquit Capivaccius, & si vires ægri imbecilles sint Narcotica minime perfert, quæ si omnino exigantur leviora sint.

*Hippocrates 4. de rat. vict. in acut.* Cholera sicca medellam describit per usum clysterum, vini meracioris, olei, & lactis Asinæ, præter, somnum quæ hujusmodis ægris conferre dicit. Rusticis familiare est allium coctum cum ruta: quæ nisi profuerit, etiam enemata ex iisdem parata conveniunt. Caterum laudatur a *Sylvio* sp. nitr. in aqua fœniculi, & syrupo menthæ; itemque spiritus carminativus ab eodem descriptus.

## ALVI RETENTIO.

### *Egineta sententia.*

*Alvi quodiana egestio ad valetudinem facit.* **Art. 1379.** Priscis quibusdam ad valetudinem tuendam abunde visum est diebus singulis alvum, & vescicam citra reprehensionis notam recrementi sufficienter, pro cibi potusque sumpti multitudine, exonerare. Alvo suppetias ferebant terebinthina, instar olivæ, sub somnum devoranda exhibentes. Si vero acrius alvum subducere animus est, exiguum Rhei Barbarici admiscebimus.

*Remedia alvum emollientia.* **Art. 1380.** Conveniunt etiam alvo emollientia ova forbilia, ex oleribus beta, malva, jus cochlearum, & hæc fortasse satisfaciunt. Validiores in hac re vires habet, mercurialis in aqua cum salibus elixa, & comesta, & jusejus epotum, similiter & sambuci folia, polypodii-  
 que



que radices duo denarii fassamento inspersi ,  
aut cum pitana deglutiti . Ejusdem classis est  
serum lactis ad trium aut quatuor heminarum  
mensuras cum sale & melle sorptum .

Jus quoque veteris gallinacei , tam per se ,  
quam cum binis crici denariis acceptum alvum  
emollit . Aloen interim a cena , quæ trium vi-  
cerum magnitudinem æquet , assumere expedit .  
Saluberimus itidem fuerit Epithymus cum vino  
post frugalem cenam epotus . Verum si quis ve-  
hementiore evacuatione egeat , veris tempore  
epithymi drachmam ex oximelite hauriat .

*Etmulleri sententia .*

*Art. 1381.* Alvi retentio cum sit pertinacior , *Alvi re-*  
frequentius est causa mille malorum , dolorum *tentio*  
abdominis variorum : interdum nausea & vomitu- *causa*  
sus , affectuum capitis , cephalalgia , vigilia , *mille*  
vertiginis , &c. , Familiaris est spleneticis , ne- *malorum*  
phriticis , hystericis , arthriticis , literatis ,  
scorbuticis , &c.

*Art. 1382.* convenit *oleum amygd. dulc. vel per Curatio*  
se vel in jusculo ad ℥ij. vel iij. *decoct. tamarind.*  
in fero lactis ; *gum. ammoniacum. Aurum fulmi-*  
*nans* cum extracto *hellebor. nigr. sal. gem.* in cly-  
steribus ad ℥iſs. vel ℥ij. multum laudatur ad fæ-  
ces induratas fluxiles reddendas ; item clysmata  
oleosa *ex ol. lini, ol. raparum, ol. oliv. &c.* In al-  
vo pertinaciter obstructa conducit balneum ex  
*emollientibus & linimenta .*

*Boerhaavii sententia .*

*Art. 1383.* Vires tartari crudi in medicina  
optimæ sunt , cremoremque & crysallos supe-  
rat viribus ad absterfionem primarum viarum ;

*Tarta-*  
*rus cru-*  
*duſ .*

vix

vix sua indole *secundas vias* ingreditur, ob crassitatem & indissolubilitatem, nec invenit tantum liquidi in illis, quantum ad sui solutionem requirit. Si autem humoribus alcalinis occurrit, solvitur penitus, non a liquido, sed a solo alcali occurrente, qui duo sales faciunt tunc optimum salem dissolventem; si vero dissolvitur ab aqua, est adeo crassus ut per pannum non transeat, nec hinc transeat per lactea; & si forte solvitur a bile, aliove forsan liquore, non agit ut Tartarus, sed ut sal neuter, vel sapo: hinc multos morbos ex vitio pituitæ, & vitio primorum viscerum egregie tollit, debet vero dari ad drachmas sex ex jussulo recenti. *Angelus Sala*, *chymicus candidissimus*, qui integrum tractatum, ubi sua arcana, cunctis medicis desiderata, revelat, de viribus tartari scripsit; laudat illum in colicis doloribus, diuturnis obstructionibus primarum viarum, hysteriis, podagra, &c. Sed dabat ad unciam unam, unde purgabantur per duos aut tres dies; hoc continuabat optimo cum successu, nam non intrat sanguinem, sed pondere & stimulo optime agit; ergo reliquam massam sanguinis non turbat, sed saltem alvus diluitur, & emollitur sæx, cum alia purgantia post operationes suas relinquunt semper alvum adstrictam.

Quomodo  
præ-  
cavenda  
est.

*Art. 1384.* „Novi plures ventri constipationi  
„obnoxios curatos fuisse diluculo, & hora prius  
„assueta citius lecto assurgendo: quantum enim  
„a perspiratione solita adimitur, tantum ad  
„alvum lubricandam additur. “ *Vuillis.* „Qui  
„alvum habent sicciorē (inquit *Vualdschmidtus*)  
„nunquam se mane studiis applicare debent,  
„vel foras procedere, nisi alvum prius  
„deposuerint; vult enim sæpius moveri alvus  
„segnior.

*Art.*



*Art. 1385.*, Quibus, dum sunt juvenes, (inquit *Hippocrates*) alvi sunt humidæ, iis senescentibus siccantur; quibus vero, dum sunt juvenes, alvi sunt siccæ, his senescentibus humectantur. Melior est autem in juventute alvus fusior, in senectute adstrictior. Obstructo inferiore ventre (inquit *idem de flat.*) in universum corpus flatus discurrunt.

*Art. 1386.*, In act. philosoph. N<sup>o</sup>. instantiam singularem habemus cujusdam hominis nomine *Phelips*, qui per plures annos non nisi semel in 19. vel 20. diebus alvum exonerabat, nihilominus, quoad cætera bene se habuit: obiit tamen vigesimum tertium agens annum.

## ALVI FLUXUS.

*Art. 1387.*, In genere quod ad alvi fluxum attinet, aliquando cibi nondum cocti aut imperfecte cocti per alvum dejiciuntur, & appellatur *lienteria* vel fluxus *lientericus*; aliquando chylus excernitur & dicitur *celiaca*, aliquando humores excrementitii, bilis, pituita, &c. excernuntur, & vocatur simpliciter *diarrhœa*; postremo quandoque dejectiones sunt sanguinolentæ cum vel sine intestinorum exulceratione, & appellatur *dysenteria*.

## DIARRHŒA.

*Art. 1388.*, Diarrhœa est frequens & copiosa per alvum materiæ tenuis, aquosæ, mucosæ, pituitosæ, spumosæ, adiposæ, biliosæ, nigricantis &c. excretio, ab intestinis proveniens, aliquando eum, aliquando sine excrementis, frequenter, sed non semper torminibus stipatur.

*Phy.*

*Philumeni sententia.**Ex Tralliani lib. VIII. cap. 5.*

*Alvi proflu-  
vium.* *Art. 1389.* Alvus tum in febribus, tum citra febres profluvio laborat. In febribus autem difficilior ejus curatio; animadversionemque, & conjecturam diligentem requirit. Nam inter initia natura aliena salubriter evacuare consuevit; ipsa nimirum natura ad superfluos, incommodosque humores rejiciendos undiquaque cogente. Id autem alias in statu morbi, alias in declinatione contingit, nunc quidem cum magna profusione humorum, subitaque & critica, qua febres solvuntur; sæpe vero paulatim, & multis perseverat diebus, & pene in ipsa declinatione consistit. At tali occasione profluvium, aut sisti non debet, donec ipsa se natura componat, & ad integram perveniat sanitatem, aut motus ejus adjuvari, nam si quis ventrem constringere volet, magnam excitabit ægritudinem.

*Venter non statim sistendus.* *Art. 1390.* Vidimus enim ventrem initio affectus ad quartum quintumve diem profluxisse, & postea fluorem, aut per se, aut medicamenti auxilio substituisse, unde ægri in magnum periculum inciderunt, ita ut Phrenitici, aut Letargici efficerentur, aut perniciosæ in eis parotides excitarentur. Quare initio ea, quæ corporis commodo, atque utiliter excernuntur, minime reprimere convenit, ne materia in aliam conversa partem, supradictos affectus generet, sed ad statum usque contemperari cibis debent.

*Las in alvi profluvio.* *Art. 1391.* Ubi vero diutius jam profluvium perseveraverit, non modo superflua evacuans, sed



sed etiam habitum colliquans, viresque consu-  
mens; tunc sane eis resistere medicamentis de-  
bet. Lac igitur in toto affectu, si febris non  
urget, caprinum, aut bubulum tepidum, recens  
mulctum, aut coctum ad ignem, ita ut semper  
agitetur, donec ad tertias redigatur, potu au-  
xiliatur, quod etiam si per filices fluviatiles i-  
gnitos, & candentes ferri laminas in ipso ex-  
tinctas coctum fuerit, potui datum juvat. Alii  
etiam mel in eo coquunt, atque sic propinant,  
spuma vero dum lac coquitur pinna, aut co-  
chleare auferri debet. Quoniam autem in feбри-  
bus lac purum assumptum plus noxæ, quam  
commodi adferre solet, quarta pars aquæ lacti  
miscenda est, coquique una ad dimidias debet,  
atque hoc modo exhiberi.

*Art. 1392.* Ubi corpus abunde jam evacua-  
tum sit, ipsumque profluvium adhuc perseve-  
ret, fots ex oleo, & vino adhibeatur; sit au-  
tem oleum omphacinum, aut rosaceum, aut  
melinum; efficacius his est myrtheum, tertia  
aut quarta vini parte admixta.

Fots

*Art. 1393.* Potui vero aqua pluvialis bene co-  
cta exhibeatur, sed nec ante cibum, nec cum  
hunc æger assumit; nec vero universa, ac una  
vice, sed paulatim, & modice dari debet. Quod-  
si quinque folii herbæ radices simul incoquantur  
præstantissimum fiet auxilium, item si rubi ra-  
dices simul incoquantur, magis alvum adstrin-  
gent. Nonnulli plantaginis semen contritum,  
& acinos siccos in pulverem redactos, integros-  
que, aut sorba detrita similiter admiscent. Vi-  
num in declinatione, hoc est inflammatione  
remittente, & feбри confidentius dandum est,  
austerum, vel alia vina adstringentia quæ di-  
versis locis nascuntur, experimentisque probata  
sunt.

Potus  
stipricus

Ex vino

Mea-

*Meadii sententia.*

*Diarrhœa quomodo curanda.* **Art. 1394.** Ventr̄is fluxus non difficulter coercetur. De illo loquor, qui sine febre est, nam ubi hæc adest, num morbum solvere poterit, deliberare oportet. Cum sola autem cita alvus exercet, satis plerumque erit, assumpto semel, vel bis vino ipecoachanæ ventrem rhabarbaro aliquoties purgare; deinde aromaticis, adjuncta creta aut bolo Gallica intestina roborare.

*Ettmulleri sententia.*

*Ventriculus præ omnibus est corroborandus.* **Art. 1395.** In cura diarrhœæ ex quacumque causa *stomachus* est corroborandus; & *sudoriferæ* cum *absorbentibus* sunt admiscenda. Diarrhœa oleosa & pinguis (si non ex assumptis) ex colliquefactione pinguedinis corporis oritur.

*Curatio.* **Art. 1396.** In omni diarrhœa potus debet esse parvus. Ad ventriculum restituendum convenit *vinum ustum cum aromatibus*, *vinum absynth.* & maxime *cydoniata*, & externe *fotus*. Sistendus est effervescentiæ humorum impetus; hoc facto, cessat diarrhœa. Decoctum *rad. tormentil.* egregium est in omni diarrhœa & dysenteria, tam *benigna* quam *maligna* & omnibus aliis medicamentis præcellit. *Fructus cydon.* & speciatim *mespillorum*, eorumque *miva* maxime laudantur; *gelatina C.C.* in potu ordinario soluta est admodum specifica in diarrhœis *epidemice* grassantibus, ut & *gum. Arab.* (in decoct. alb. solut.); si adsint *tormina* vehementiora & *tenesmus*, convenit enema ex *lacte tepido* & *theriac. Androm.* In diarrhœis *habitualibus* per longum tempus durantibus conveniunt interne imprimis *martialia* & *aromatica* stomacho grata, imo *therma*.

Diarrhœa



Diarrhœa pertinax & diu durans *radice Ipecacuanha*, quemadmodum *Dysenteria*, debitis intervallis aliquoties repetita curanda est, non neglectis interim aliis appropriatis remediis.

*Baglivi Sententia.*

*Art. 1397.* Mœror nihil aliud frequentius producit quam Diarrhœas, quæ, diu persistente mœroris causa, evadunt incurabiles, iisque demum superveniente febre erratica & atrophia, ægrotautes e medio tollunt. Ad iram pariter diarrhœa supervenit dummodo ingens fuerit ira.

*Farrago Sententiarum.*

*Art. 1398.* Una die fluere alvum sæpe pro *Prognosis.* valetudine est, ac etiam pluribus, modo intra septimum diem conquiescat.

Cum alvi profluvium in vetustatem incidit, tum si ultro vomitus accedit, id ipsum compefcit. Ita sudor diarrhœis superveniens morbum sistit.

Perniciosæ sunt diarrhœæ in morbis pectoris, sunt etiam infestæ puerperis, & infantibus. Quæ vero materiam porraceam, & viridem efferunt, vel mortem, vel diuturnum morbum significant, potissimum in acutis.

*Art. 1399.* Semper observandum est, an diarrhœam febris comitetur: hujus enim habenda erit ratio: non quod curationem variet, sed quod de causis diarrhœæ certiores nos faciat. Observationes practicæ docuerunt per vomitum felicissime curari quandoque diarrhœam, & dysenteriam.

Bonum si diarrhœa iræ, & Ictero superveniat, & si hæc non superveniat, febris saltem accedat.

Curatio diarrhœæ non incipienda ; per adstringentia , nam introducerent viscerum , & intestinorum obstructions difficile solubiles , quibus tandem succedet hydrops pertinax . Catnium esus auget alvi fluxum , cave igitur ab iis quantum poteris .

Spontaneas scorbuticorum , aut ab errore externo natas diarrhœas repentina adstringentium exhibitione noli inhibere , ni hypochondriorum intumescencias , respirationis difficultatem , aliaque mala incurrere velis : idem de diarrhœa dentientium , & variolarum confluentium censendum .

Memini me aliquoties diuturnas diarrhœas , adstringentibus aliisque remediis incassum tentatas , curasse , dum singulis diebus per triduum mane vomitorium darem , licet nulla signa docerent aliquid circa primas vias hære , quod stimulo suo alvi fluxum faceret . *Schombergius* .

In diarrhœis habitualibus per longum tempus durantibus conveniunt interne in primis martialia , & aromatica stomacho grata , imo Thermae .

*Specificum noviter re-  
tertum.* Art. 1400. Præter Ipecacuanhæ radicem ad diarrhœas sistendas cortex arboris cujusdam ab incolis litus Coromandelæ in India Orientali , ubi frequenter sobolescit , *Conessi* dictæ speciem *cadogapala* Horti Malabarici plurimum referentis ab Act. Academiæ Edimburgicæ Tom. III. art. 4. valde celebratur , ex quo pulverato una cum syrupo cortic. aurantior. fit electuarium ad drachmam dimidiam quater in die ægro exhibendum , quod per tres , vel quatuor dies tantum continuare satis est ; nam prima die alvi fluxum augere solet , altera fœcum colorem mutat , tertia densiores facit , ut deinceps naturalem sibi vindicent consistentiam .

Art.



*Art. 1401.* Indusium laneum magnopere conducit ad curandam diarrhœam *habitualement*. *Vv. inuorigt*. Ut & *equitatio* seu *vectio in rheda*. *Fulleri med. gymnast.* Observandum est, appetitu & concoctione salvis, vix unquam nocere diarrhœam.

*Art. 1402.* Narrat D. *Vvalker* in obsidione *Derria Londinensi* nupera milites eo redactos fuisse, ut compositionem quandam ex *sebo & amylo* liberaliter sumpserint, unde non modo nutrimentum, sed & medicamentum egregium habuerunt, nempe diarrhœæ *curativum* in his, *prophylacticum* in illis, idque miraculose & infallibiliter.

*Art. 1403.* Opium (sagaciter observante *Cockburn*) parum aut nihil facit in cura *Diarrhœæ serosæ*; & revera res, si propius illam inspiciamus, & ad calculum accurate vocemus, ita se habere videtur. Opium plerumque dolorem sedat, & somnum conciliat, & dejectiones rariores reddit, sed tamen copiosiores sunt & æque tenues ac liquidæ; ut ante, &, quod probe notandum est, magis foetentes.

*Art. 1404.* Remedia sequentia quandoque prodesse possunt, *laudan. liquid. cydoniat. cataplasma. varia. stomach. epithem. stomach. fots astring. saccul. stomach. decoct. catechu, comp. decoct. fracastor. decoct. sistens, elect. corynth. enema de malicorio, expressio rosar. mistur. coral. elect. ad diarrhœam.*

## LIENTERIA & COELIACA.

*Art. 1405.* Lienteria & Coeliaca videntur esse diarrhœa cum insigni apepsia seu coctione ventriculi depravata conjunctæ; ideoque earum cura partim cum diarrhœa convenit, præcipue quoad evacuantia in principio propinanda: hic

etenim super alia quotcunque radix ippecacuan.  
& rhabarb. locum habent, nec omitti debent.

*Aretæi sententia.*

*Liente-  
ria dia-  
gnosis.* *Art. 1406.* Si a torminibus, & a perlatis val-  
deque profundis superiorum intestinorum ulce-  
ribus cicatrices crebræ, crassæ, solidæque con-  
trahantur; stercora ex his deorsum liquida ab  
alibili indiscreta prolabuntur. Intestinorum enim  
raritas, per quam sursum versus alimonia di-  
scurrit a cicatrice interclusa est. Homo igitur  
nutritionis inopia laborat, & pallor est, & in-  
firmitas. Affectus hic, qui ab cicatrice sit *lien-*  
*terie* cognomen accepit.

Alias vero intestina cicatricis expertia sunt,  
sed præ debilitate retinere non possunt alimen-  
tum elaboratum, quod proinde chilosum sub-  
terfugit.

*Ab aliis  
morbis  
aliquan-  
do pro-  
ducta.* *Art. 1407.* Morbus longus, & malus habitus,  
qui decumbere non cogit lienteriam peperit.  
Aqua intercus nonnumquam in hanc ægri-  
tudinem foeliciter commutata est, ex malo sci-  
licet in malum, sed melior est successio.

*Progno-  
sis.* *Art. 1408.* In hoc morbo si non stabilis, sed  
levis momenti purgatio fiat, simplex a cibis vo-  
mitus morbum solvit.

*Cælii Aureliani sententia.*

*Causa  
hujus  
morbi.* *Art. 1409.* Ventriculosa passio quam Græci  
*Cœliacam* vocant, generatur ex antecedenti in-  
digestione continua, vel tumore vehementi, aut  
dysenteria. Sequitur in hac passione constitutos  
varia stercoreum egestio, qualitate, & colore nunc  
tenuis ac soluta, nunc aspera, & inæqualis,  
vel constricta, & nunc alba, nunc similis uri-  
næ



næ camelorum, nunc flava, & spumosa, nunc *Signa & Symptomata.*  
 prasina, vel livida, aut nigra, aut purulenta,  
 aut sanguinea, cum gravi foetore, & rugitu in-  
 testinorum, atque in exitu sonitu: & post ef-  
 fusionem factæ veluti scatentis stercoreis vescicu-  
 læ: & nunc jugiter nocte atque die, nunc coa-  
 cervatim, sed interjecto spatio, ut per diem bis  
 vel semel, aut interpositis uno, vel duobus die-  
 bus, aut eo amplius: & nunc cum tensione,  
 atque ventositate, & tormento, vel dolore aut  
 singultu, confidente atque conductâ cute, quæ  
 ventrem circumtegit, attestante siti, & ipsius  
 ventris fervore, & levi in interioribus torpore  
 frigido.

Sequuntur etiam vigiliæ, fastidium cibi, &  
 aliquibus plurimus appetitus, virium debilitas,  
 pallor subalbidus, & nunc febres, dehinc cor-  
 poris odor teter plurimus, ut etiam quæ suis  
 manibus tetigerunt, putrescant, & difficile  
 careant odore concepto: tum vultus inflatio  
 atque pedum. Quibusdam etiam dysenteria con-  
 generatur. Est autem passio solutionis, & ali-  
 quando stricturæ complexa.

*Art. 1410.* Cum recens fuerit passio adhibita *Curatio.*  
 requie, & quantum vires permiserint, abstin-  
 tia, somnus curandus erit, atque sitis, & lanis  
 mollibus venter contegendus leviter oleo hispa-  
 no præunctus, vel melino, aut rosaceo, aut mur-  
 tino, aut lentiscino oleo. Facies quoque aqua  
 tepida relavanda: tum cibus dandus: ut alica ex  
 aqua frigida, panis etiam solus, aut cum eo  
 ova, item pulres ex oryza, vel alica, aut far-  
 re, aut milio. Clysteres injiciantur, & potui  
 dabitur aqua frigida, & si febris absit, etiam  
 vinum.

*Art. 1411.* Passione in diuturnitatem abeunte *Symptomatum curatio.*  
 ora ægotantium spongiis ex posca frigida ex-

pressis reficere convenit, articulos ligare, & stomacho cataplasma constrictivum imponere. Aeger frequentius cibo nutriatur, & si accepta non tenuerit, erunt secundo offerenda, adhibita simul articulorum fricatione, cucurbitaque ori ventriculi infixæ, & si fieri potuerit, etiam a tergo inter scapulas. Si vero dolor occurrerit, & singultus ob ardorem, atque sitim, fomentis utendum est, & cataplasmatibus, & spongiarum vapore, & olei injectione, quo possit medicaminibus vexatio celerius obtundi. Perseverante incendio etiam calida, & oleo, & lacte sunt injiciendi. Sudoribus prodeuntibus refrigeretur æger, iidemque asperginibus, & congruo cibo cohibeantur.

*Morbo insistente.* *Art. 1412.* Ac si plurimo tempore ulceratio perseveraverit, cum corporis debilitate, atque fastidio, vitanda erit frequentia medicaminum sive injectionum, sive potionum. Decoctionem tantum lenticulæ secundo, vel tertio, per singulos injiciemus dies, qua sufficienter intestina coercentur, & latenter corpus nutritur. Tum vino leni, atque carne volantum, vel marinorum utendum.

*Morbo gravius insistente.* *Art. 1413.* Si solutio fuerit urgentior frigidus convenit locus ægrotanti, & supina jacendi positio, & requies. Erit denique persuadendum, ne quoties fuerit in egestionem commotus illico ventrem facere festinet, sed quantum potuerit resistendo differat. Injiciatur per clysterem succus plantaginis, aut polygoni, vel intybi, aut uvæ lupinæ, aut sempervivæ, aut mespilæ, malvæ, aut oryzæ, aut decoctio mali punici, &c. Item lenticulæ decoctio: aut licium Indicum cum lacte. Dehinc apponenda ex palmulis epithemata, & malo cydonio, & balaustio, & alumine, & horum similium.



*Ettmullerii sententia.*

*Art. 1414.* Lienteria est alvi fluxus, in quo *Liente-*  
 assumpta prout fuere ingesta, aut parum immu- *ria quid.*  
 tata per alvum egeruntur. „ Dolor ventriculi  
 „ est Lienteriz comes indivulsus, & ægrotum  
 „ post pastum semper magis excruciat, donec al-  
 „ vum exoneraverit. Urina est pauca & valde  
 „ colorata. „ Lienteria *scorbutica* est malum pe-  
 riculosum curatu difficile, & facile recidivans;  
 ad *cachexiam* & *tabem* disponit.

*Art. 1415.* Inprimis stomachus præ omnibus *Curatio.*  
 est roborandus. *Rhabarbarum* propinari debet;  
*coralliata* & *cydoniata* valde laudantur; in ge-  
 nere omnia in vomitu usurpata hic conducunt.  
 „ Stomachica simpliciora & paratu facilia (in-  
 „ quit *Vvaldschmidius*) sæpius plus præstant,  
 „ quam composita: v.g. *nux moschata condita*,  
 „ *zinziber conditum*, *vitellus ovi* cum aceto co-  
 „ ctus, *vinum absynth.* ex *mastiche* parata, &c.

*Art. 1416.* Coeliaca est alvi *chylosa* excretio, *Coeliaca*  
 quando assumpta digeruntur quidem in stoma- *quid.*  
 cho, sed digesta sub forma *chylosa* cum excre-  
 mentis excernuntur; ventriculus ut plurimum  
 est salvus, & appetitus, sed hoc non semper;  
 per alvum excreta sunt albicantia vel grisea,  
 aut saltem pallida. Est malum satis grave &  
 periculosum.

*Art. 1417.* *Aromatica blandiora & amara* ap- *Curatio.*  
 prime conveniunt; *astringentia* malum axaspe-  
 rant. „ *Deobstruentia* procul omni dubio indi-  
 „ cantur, & *martialia* cum *amaris*. Præmissa *tinct.*  
 „ *rhabarb.* dosi una vel altera, elegantem puel-  
 „ lam ab hoc malo diutius laborantem liberavi  
 „ cum *tinctur. mart.* & *vino amaro* sequenti;  
 „ *℞. Rad. zedoar. ℥j. gentian. ℥iij. cort. aurant. ℥iij.*  
 „ *v. winteran. ℥ij. myrrh. pulv. ℥j. flor. cham. p. ij.*

„ *centaur. min. p. j. N. M. ana ʒj.* Infund. frigide in vin. alb. *Hispan.* Biv. coletur usus tempore. „ Forestus valde commendat pulverem *pellicule interioris ventriculi gallinae* in Coeliaca passione ; ut etiam pulverem *integræ nucis moschatae* in vitello unius ovi exhibitum in Lienteria.

*Tozzi sententia.*

*Horum  
fluxu  
causa.*

*Art. 1418.* Quando cibus indigestus egeritur, vitium ventriculi, & succorum dissolventium designatur. At vero si mutatus in chylum deijciatur, malam potius secretionem denotabit, provenientem a succorum in tenuia intestina confluentium defectu, vel inertia, unde purior chyli portio ab inutili minime secernatur; vel etiam ex obstructis, obduratisque glandulis intestinorum, lacteisque tubulis purioris chyli ingressum impredientibus. Num autem ab hac vel illa ex prænarratis causis dependeat, sedulus Medicus ex adjunctis aliis, tum symptomaticis, tum ægritudinibus conjiciet.

*Prognosis.*

*Art. 1419.* Quanti periculi sint ejusmodi fluxus satis perspectum est ex eo, quod inde vires sensim labascant, & corpus universum contabescat; ideo si alium effectum præsertim chronicum consequantur, lethum prænunciant, vel ventosam hydropem vel cachexiam. Ab externis vero causis exorti, crudis videlicet & fugacibus alimentis minus mali portendunt, nam sponte sua salubriter terminantur.

*Curatio  
habita  
ratione  
causarum.*

*Art. 1420.* Pro ratione causarum iidem varias medellam admittunt. Si a ventriculi languore, & succorum fermentatione, dissolutioneque provenerint, expostulantur roborantia, & succos eisdem acuentia; si ab inflammatione, ulcere, acribusve humoribus ventriculus ad depositum.



positionem ciborum proritetur, huc revocanda sunt, quæ inflammationi curandæ, & humoribus corrigendis, educendisque conferunt. A secretionem læsa conveniunt, quæ bilem acuunt, & augent, ut sunt amara ex aromatibus selecta. Obstructionem viarum lactearum, humoresque glandularum, & villosam crustam intestinorum crassiorem redditam emendant deobstruentia, & attenuantia, simulque si opus sit evacuantia. Aromata optima sunt, quæque potissimum sub-amara sunt; vitentur vero oleosa, & pingua, itemque acida.

*Art. 1421.* Externe confert Emplastrum ex *Extrema.* Tacamacha, mastiche, stypticum Mynsicht, Jo. de Prochyte, ex crusta panis cum succo, vel pulvere menthæ, & absynth. mastiche, & nuce myristica, ol. insuper, & essent. inde elicita valde profunt.

*Art. 1422.* Cibus interea ægrotus minime gra- *Vitius*  
vetur, sed pauca exhibeantur, sæpius tamen, & *ratio.*  
grata ventriculo. Liquor expressus ex carnibus assis, cum aromatibus, & succo cydoniorum, vel cerasorum laureorum subacidorum conditus salutaris est. Aliquando memini sanatum vidisse Lientericum graviter affectum sumpta halece salita aceto inspersa.

### *Farrago sententiarum.*

*Art. 1423.* Lienteria est nimis celer, alimen- *Defini-*  
torum ea forma, qua assumpta sunt, per alvum *tio.*  
excretio, vitio retentricis, & expultricis ventriculi, & intestinorum facultatis proveniens. Coeliaca est celer esculentorum, & potulentorum ex ventriculo ad intestina transitus, quo illa chyli, aut cremoris specie perfluunt. *Jon-*  
*stons.*

*Art.*

*Remedia varia.* Art. 1424. Lienteriam ex abrasa villosa intestina. finorum crusta proveniente insanabilem, reputat *Sylvius*; cum nulla medicamenta norit, quæ crustam illam renovare valeant, & quidem talem, quæ transitum concedat chylo ad lacteas vias propellendo. Contra vero lenteriam in sene Saccharo rosato sanasse fatetur *Forestus*.

Amatus Lusitanus feliciter curasse lenteriam cum sacchar. rosato cum theriaca, & succo cydoniorum in formam electuarii testatur. Commendatur ab aliis mithridatum ad ℥j. cum croci martis ꝯ. sem. hepar lupi magnificavit *Hartmannus* cum eodem mithridato, additis magisterio corall. C. C. usto & mastiche. Ab electuario item ex baccis juniperi secundum descriptionem Paracelsi, & Croco Martis magnum juvamentum, non raro prodit.

Remedia quæ ad alvi profluvia hujusmodi commendat Auctor Dictionarii Medicinalis, ita se habent. Si alvi fluxus plurimum non infirmaverit ægrotantem, qui nec a febre, nec inappetentia exerceatur, relinquendum est, ut per tres, vel quatuor dies sponte sua componatur, tum sequenti modo purgabitur. ℥. Rhab. gr. xl. conf. ros. ℥iij. misc.

*Opiatum.* Si vero æger viribus exhauriatur, & alvi fluxus septimum, vel octavum diem prætergrediat, tunc. ℥. Conf. Cynorrhod. cortic. citr. condit. ana unc. ij. Ocul. cancr. pp. ℥j. ros. rub. pulv. rhabarb. torrefact. ana gr. xl. antihæct. poter. ℥j. sem. bacc. querc. pulv. ℥j. misc. & cum Syrup. absynth. q. s. f. opiat. de quo capiat æger quotidie mane ad magnitud. juglandis.

*Aliud.* Ubi habitualis alvi fluxus evadat, & in lenteriam mutetur, sequens opiatum præstat. ℥. Chin. chin. unc. j. coral. rub. ℥ij. conf. cynorrhod. unc. sem. opii gr. xij. Syrup. cydonior. vel granator. q. s. m.



*f. m. f. Opiatum, de quo capiat ager quotidie mane 3j. f.*

Ut vero ingravescentes hoc casu colici dolores compescantur: jubendi sunt clysteres ex ju-  
re capitis vervecis, bis vel ter per diem reite-  
randi. Cæterum animadverti debet, crebriores  
injectiones in alvi fluxu magis magisque inte-  
stina laxare, atque prohibere, ne eadem natura-  
lem suam elasticitatem recuperent. Hujusmo-  
di itidem morbi rad. Ipecacuanhæ granis xxxv.  
fanantur.

*Nota bene.*

## D Y S E N T E R I A.

*Celsi sententia.*

*Art. 1425.* Tormina ex intestinorum intus  
exulceratione, *dysenteriam* Græce dictam, faciunt.  
Cruor cum stercore aliquo semper liquido, mo-  
do cum quibusdam quasi mucosis fœcibus ex-  
cernitur, interdum simul quædam carnosæ de-  
scendunt. Frequens dejiciendi cupiditas, dolor-  
que in ano est. Cum eodem dolore exiguum  
aliquid emittitur, atque eo quoque tormentum  
intenditur. Idque post tempus aliquod levatur,  
exiguaque requies est, somnus interpellatur, fe-  
bricula oritur, longoque tempore id malum cum  
inveteraverit, aut tollit hominem, aut etiam  
( si finitur ) excruciat.

*Dysenteria descriptio.*

*Art. 1426.* Oportet in primis conquiescere,  
siquidem omnis agitatio exulcerat; deinde jeju-  
num forbere vini cyathum, cui contrita radix  
quinquefolii sit adjecta, imponere cataplasma-  
ta supra ventrem, quæ reprimunt.

*Curatio.*

*Art. 1427.* Si vetustior morbus est, inferiori-  
bus partibus tepidum infundere, vel ptisanæ cre-  
morem, vel lac, vel adipem liquatam, vel me-  
dul-

*Quæ faci-  
cienda  
si vetus-  
rior.*

dullam cervinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem album crudum ex ovis, vel aquam, in qua lini semen decoctum sit, vel si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua rosæ floris folia cocta sint. Levant enim dolorem hæc, & mitiora ulcera efficiunt, maximeque utilia sunt; si cibi quoque secutum fastidium est. Themison muria dura quam asperri-  
ma, sit utendum memoriæ prodidit.

*Auxiliū* *Art. 1428.* Si pluribus diebus nihil remedia  
*ab aqua* alia juverunt, vetusque jam vitium est, aquæ  
*frigida.* bene frigidæ potio assumpta ulcera adstringit;  
& initium secundæ valetudinis facit; sed ubi  
venter suppressus est, protinus ad calidam po-  
tionem revertendum est. Ac si sanguis profluat,  
cibi potionesque esse debent, quæ adstringant;

*Sydenhami sententiâ.*

*Dysen-* *Art. 1429.* Dysenteria cum rigore & horrore  
*teria.* aggreditur, calor sequitur; & deinde ventris  
tormina cum dejectionibus mucosis, quibus pro-  
gressu temporis intertexuntur sanguinis linea-  
menta quædam cum dolore insigni; sanguine  
aliquando destituuntur, & nihilominus (modo  
frequentes sint dejectiones cum ventris tormi-  
nibus & colluvie mucosa) recte vocabitur dy-  
senteria. Si sanguis sincerus evacuetur, vita æ-  
gri periclitatur.

*Methodus* *Art. 1430.* *Venesectio* quamprimum celebre-  
*diagnosendi.* tur, & exhibeatur haustus *paregor.* eadem nocte,  
deinde *catharticum* lene bis repetitum; & *parego-*  
*ric.* hor. 4. vel 5. post sing. purgationes; potus or-  
dinarius sit *lac coctum cum aq. tripl.* vel *decoct.*  
*alb.* Si morbus præfractior sit, detur *laudanum* 8.  
quaque hora etiam in maiore dosi, & injicia-  
tur enem. ex *lacte vaccin. & theriac. Androm.* ʒß.  
ubi vires *venesectionem* non patiuntur, detur

fin-



singulis matutinis bolus ex *rhabarb.* ʒß. cum q.  
*s. diascordii & paregoricum* hora somni.

Infantes eodem modo tractandi sunt diminuta dosium quantitate. Methodus in *cholera morbo* in hoc quoque laudatur, ut & *dieta lactea*.

*Vuillisi sententia.*

*Art. 1431.* Quamvis dysenteria vocabulum *Dysenteria* communi acceptatione alvi fluxum cruentum, *tertia in-* sicut diarrhœa humoralem denotat; tamen mor- *cruentæ* bus *Londinensis* anno 1670. Dysenteria appellabatur, incruenta licet. Fuit affectus ille subitaneus & frequenter absque manifesta occasione invadens; laborantes cum vomitu immani & sedibus crebris & aquosis cito in maximam debilitatem inque spirituum horrenda deliquia & virium omnium prostrationem redigebat. Novi plures pridie satis sanos, & valde robustos, intra xij. horas morbi hujus tyrannide adeo dejectos, ut cum pulsu debili & exili, sudore frigido, &c. jamjam moribundi viderentur, & quidem non pauci ab eo cito interibant.

*Art. 1432.* Pro curatione hujus morbi nulla *Curatio* *evacuatio* juvabat; verum remedia tantum *cardiaca*, eaque calidissima commoda fuerunt, in tantum, ut *sp. vini* cum sacchar. parum deflagratus remedium popolare & quasi *epidemicum* fuerit, atque in tali Dysenteria fere semper proficuum; etsi in altera cruenta indifferenter usurpatum sæpe noxium deprehenderetur. Ego exhibui satis feliciter *theriac. androm.* ʒiß. cum *julap. cardiac.* & ventriculo placentam ex pane tosto & *theriac.* illinito vinoque generoso immersam applicari jussi, aut loco *theriac. Androm.* pulv. seq. ʒi. *Pul. e chel. cancr. comp. e contrayerva.*  
*ser-*

*Serpent. virg. ana ℥j. cinnam. rad. tormentill. ana 3℔.  
croc. cochinel. ana ℥j. dos. ℥ij.*

*Dysenteria cruenta.* Art. 1433. De descriptione dysenteriae vere cruenta Londinensis vide authorem, pag. 49. laborantes haud cito interibant, quin plures septimanas, imo interdum menses sanguinem quotidie in magna copia excernebant, &c. In his dejectiones fuerunt liquidæ, & sanguine diluto tinctæ, instar loturæ carniū, in aliis crassiores cruore saturatæ, ac insuper muco albicante, & non raro membranarum frustis refertæ, & de remediorum formulis consulendus est auctor p. 50. & 52.

*Ettmulleri sententia.*

*Tres differentia.* Art. 1434. Dysenteria est diarrhæa cruenta. Hujus morbi tres sunt differentiae. 1. Quando sine intestinorum vitio mero motu & impetu naturæ ex plethora sanguis bonus excernitur tanquam in fluxu *hemorrhoidali*, scorbuticis familiaris est. 2. Quando sanguis tenuis & aquosus loturæ carniū similis excernitur, fluxus *hepaticus* dicitur, sed revera a vasis hemorrhoid. internis provenit. 3. Tertia species dysenteriae est, quando ob vitium intestinorum spasmodicum cum insignibus torminibus, & cum muco albescente, hinc cum purulenta materia *sanguis* ejicitur, atque hæc *κατ' ἐξοχὴν* dysenteria appellatur, diarrhæa cruenta tormentosa; reliquæ species fere semper sunt absque torminibus. Est vel *benigna* sine febre & contagio, vel *maligna* cum febre & maxime contagiosa. In gradu acerbissimo *caruncula*, (signum ut plurimum lethale) quæ excernuntur cum materia purulenta, quid sint, explicatu obscurum est; non enim nisi in Dysenteria diuturniori fit intestinorum exkoriatio, & forsan exulceratio aliqualis; adsunt ali-



aliquando *aphthæ*, & intestina ipsa *gangrena* afficiuntur, ex qua fere omnes, qui Dysenteria laborant, moriuntur. „ Omnes qui Dysenteria „ moriuntur, (teste *Vvaldschmidio*) *sphacelo* pe- „ reunt, ipsis intestinis *sphacelatis*; quod ob- „ servatur triduo ante mortem, ubi fitis non „ magis urget, & extrema frigent.

*Art. 1435.* Cura inchoanda est cum *opiatīs Curatio* & *sudoriferis* & *absorbentibus*, præmissa tamen *dosi rhabarbari* semper in Dysenteria *benigna*, in *maligna* vero eadem methodus observanda est, ac in aliis febribus continuis *malignis*; *tinctura bezoardica* laudatur. *Astringentia* in principio malum exasperant, in declinatione locum habent cum cautela. *Venesectio* & *clysteres* non conveniunt. Summa habenda est ratio *stomachi* externis & internis, uti in quibusvis alvi fluxibus. *Priapum cervi* tanquam specificum extollitur. Semper propinetur *gelatina C. C. pulv. cran. human. & usnea*. *Album grac.* pro pauperibus est insigne remedium, item succus *heder. terrest.* & *cydoniata*, *lac chalybeatum*, in quo *rad. symphit. maj.* coctum fuerit, *gum. Arab. trag. &c.* sed præ omnibus *sacchar. saturni*, & *viperina* (in Dysenteria *maligna*.) *Balsam. Peruv. aut terebin. in clysteribus* aliquando est proficuum. *Oleum lini* præsentaneam præstat operam. Accurate distinguendus est *flux. dysenter. & hæmorrhoid.*

### *Meadii sententia.*

*Art. 1436.* Semper igitur ut ad curationem *Curanda* veniam, primum sanguinem mittere expedit, *metho-* deinde vomitus utilissimus est, quem vino ipe- *duc.* *cacuanhæ* non semel, sed ter quaterve, interposito biduo, vel triduo elicere optimum est.

Inter has exinanitiones, & etiam postea, adhiben-

hibenda sunt medicamenta, quæ fluxum cohibeant, & simul membranulas exulceratas sanent. Neque ullum remedium mihi compertum est, illo præstantius, quod ex confectioe cardiaca, & bolo Gallica, adjuncto extracto Thebaico componitur; ita nimirum, ut illorum singulorum scrupulus unus, hujus granum unum ter in die fumatur.

Neque inutiles sunt infusiones in anum maxime ex jusculis pinguibus, addita theriaca Andromachi; aut saltem electuario e scordio; vel ex decocto albo, adjecto amylo; vel loco illius julapio e creta, adjunctis, ubi opus fuerit, extracti thebaici granis duobus, aut tribus.

*Notandum.*

Illud denique animadvertere ex usu erit, malum interdum corporis habitum efficere, ut hæc omnia parum proficiant. Illis in casibus, non omittis ceteris, ea, quæ humores emendant, in usu vocare oportet; & quidem rhabarbarum, adjuncta mercurii sexies sublimati exigua portione, iteratis vicibus dare convenientissimum erit.

*Vomica accedente.*

*Art. 1437.* Præter hæc incommoda, vomica etiam interdum, sive suppuratio interna, in ventriculo nascitur. Hoc quidem raro fit, non semel tamen accidisse vidi; cum magnam profecto sanguinis simul, & purulentæ materiæ copiam evomebat æger. Terret sane iste casus, at plerumque tamen non magnum periculum adfert; iisque adsumptis, quæ membranas exulceratas conglutinent, in primis balsamo Locatelli, redit sanitas.

### *Farrago sententiarum.*

*Prognosis.*

*Art. 1438.* Qui Dysenteria pereunt omnes fere ex sphacelo intestinorum pereunt: patet id tri-



triduo saltem ante mortem, nam extrema frigescere incipiunt, pulsus sunt exiles, & inæquales, fitis non urget, nec dolor in affecto loco, & nonnulli paucis ante mortem horis in delirium cadunt.

Dysentericis vomitus biliosus in principio malus est. Si singultus progressu accedat lethale est: si angina itidem lethale. Aphthæ vero, & difficultas deglutiendi mortem imminere denunciant.

Observandum est, intempestive suppressa dysenteria quosdam in Epilepsiam incidisse, alios in pleuritidem, alios in insaniam &c.

Si in dysenteria adhibueris Opiata, & altero mane color oculorum ægri est mutatus, certo non superabit morbum: si vero color oculorum immutatus remaneat, indicium est, ægrotum posse reconvallescere.

*Art. 1439.* Temerariam ac sine ratione ab aliquibus usurpatam consuetudinem improbat *Alexander*, qui statim Opiata ingerunt, hæc enim ad tempus quidem humores cohibent, verum, & caput afficiunt, & vires infirmant, & postea fluxum incitant, quamobrem eorum usum, nisi urgente necessitate, prohibet.

*Ab opiat-  
tis prin-  
cipio ca-  
vendum.*

*Art. 1440.* Quantum ad remedia: corticem quemdam luteum, amariuscule, siptycum anno 1713. ab Americæ regionibus primum in Europam delatum, & Simarubam dictum Acta Academiæ Regiæ Scient. Parisien. ad ann. 1729. celebrant; ubi enim D. Jussieu Universitatis Parisinæ Medicus observat pro dysenteria hujus corticis ʒij. in suffic. quantitate aquæ decocti, tertiam partem singula dosi haustam efficacius agere, quam si isdem in substantia assumeretur.

*Specificū  
nuper re-  
pertum.*

## Farrago sententiarum.

*Remedia varia.* „ **Art. 1741.** „ De viribus rad. *ipeacacoan.* est res  
 „ nota ; sed præstat ejus *decoctum* propinare ,  
 „ quam *radicem* in substantia. In Dysenteria *se-*  
 „ *rum lactis* fere specificum ; *Bagliv.* 242. & ali-  
 „ bi. *Radix ipecacoanhæ* præter vim *vomitoriam* ,  
 „ quam obtinet , *sudores* copiosos excitare so-  
 „ let. Atque in hoc ( inquit D. D. *Freind* ) quan-  
 „ tum ego conjectura assequi possum , præcipue  
 „ consistit egregia illa in Dysentericis affectibus  
 „ virtus , quam sibi præ aliis vomendi instru-  
 „ mentis vindicat. Grassante Dysenteria ( inquit  
 „ *Doleus* ) hoc unico medicamento plus centum  
 „ feliciter curavimus , *oleo* , scilicet , *amygdalar.*  
 „ *dulc.* cum succo *citri* commixto , sæpius de die  
 „ assumpto , præmisso tamen *rhabarbaro* tosto ;  
 „ *diaphoretica* semper interponi debent in hoc  
 „ morbo curando , inter quæ eminent *tinctura*  
 „ *bezoardica* & *mistura simplex* . *Nux moschata*  
 „ est egregium *antidysentericum* : prosunt *gela-*  
 „ *tin.* C. C. *ol. rhabarbari* , *cydoniata* , &c. Fungo-  
 „ sa substantia nuclei lobos in nucibus & sepa-  
 „ rans exsiccata & pulverisata in vino exhibita  
 „ modica quantitate exercitum *Anglicanum* in  
 „ *Hibernia* gravissima Dysenteria medicorum o-  
 „ mnium solertiam eludente laborantem felici-  
 „ ter liberavit. Raii Hist. plant. J. *Aubrey* com-  
 „ municavit . Repetitis experientiis ( inquit  
 „ *Toune* in Tractatu de Morbis *Barbadæ* ) se-  
 „ quens electuarium in Dysenteria successu fe-  
 „ licissimo exhibui : ℞. *Conserv. ros. rub.* ℥i.  
 „ *sperm. cet.* ℥j. *cer. flav.* ℥iij. *ol. amygd. dulc.* ℥ss.  
 „ *syr. e cort. citr. q. s. m. f. elect.*

*Alia nō nulla.* „ **Art. 1742.** „ Sequentia quandoque locum ha-  
 „ bent , *cataplasma stomach.* *decoct.* *Fracastr. ene-*

„ ma



ma balsamicum ( expetitissimum plane reme-  
dium ) enema de malicorio ; enema ad tormi-  
na ; epithema stomach. fons ad colicam ; fons  
stomach. tinct. rhabarb. Sennertus de hoc morbo  
copiose & pulchre scripsit.

## T E N E S M U S.

Art. 1443. Tenesmus in genere est assidua cu- Tenes-  
piditas per alvum egerendi ; parum, mucosum, mus.  
aut viscosum, aut cruentum aut purulentum,  
aut nihil omnino excernitur ; pars affecta est in-  
testinum rectum aut sphincter musculus. Te-  
nesmus producitur a Dysenteria, hæmorrhoid.  
verm. ascarid. calculo in vesica, &c. Fons lactis  
rapid. ( cum flor. sambuci incoct. ) tenesimum lenit.  
Enem. emol. cum lumbric. terrest. &c. incoct. est  
exoptatissimum remedium ; item enema ex jure  
carn. vervecin. &c.

Art. 1444. Fluxus hepaticus veterum est me- Fluxus  
rum non ens, est enim fluxus hæmorrhoidalis e hepati-  
venis hæmorrhoid. vid. Dysenteriam. cus.

Art. 1445. Conveniunt remedia hæmorrhagias Remedia  
supprimentia, imprimis martialia. Decoct. e li- varia.  
gnis ( cum aq. calcis ) gelatina C. C. item passula  
maiores, &c.

## Ægineta sententia.

Art. 1446. Si Tenesmus a copia stercoreis in Pro ra-  
recto intestino impacti producat, clysteribus tione  
acrioribus, verbi causa, multa adjectis salibus, causari  
aut aliquibus quæ per os assumpta emolliunt curandi  
( cujusmodi Damascena, aut ficus ; mercuria- ratio.  
lis, serum lactis ) excreto stercore illico desinit.

Si citra ejusmodi causam prompta hæc ege-  
rendi sine effectu voluntas eveniat, lenire in-

inflammationem hordeacea polenta calida, & asperginibus ex vino, oleo myrtino, aut rosaceo, aut omphacino lumbis, ac pectini applicatis, competit.

Mucosa, quæ intestinum rectum obstruunt, mulsi quoque infusione abstergito, muriæque non raro indita, id quod res expostulat, ipsa perficit. Satis vero sunt salis ℥vj. cum aquæ calidæ hemina.

Mitigantur præterea dolores, & disensiones infessu fœnugræci, aut malvæ, aut seminis lini. Quidam etiam sæpius hanc infessionem usurpant. ℥. Rub. myrti, cytini, lauri, & cupressi viridium æquales portiones in aqua decoquuntur; est autem *Marcellium*.

At si in profundo inflammatio, & irritationes torqueant, frumentacei cremores una cum quibusdam stypticis percocti, ab infernis infundendi sunt. Oleum vero dulce immissum, atque plurimis horis detentum, dolorem discutit.

### *Farrago sententiarum.*

*Remedia  
varia.*

*Art. 1447.* Dysenterix assiduus comes Tenesmus esse solet, quo tam crebriter coguntur patientes desidere, irritò sæpissime conatu, ait *Lucas Tozzi*. Inter dysenterias eundem refert *Galenus*, cui curando vix æque præstantius remedium datur balsamo sulphuris *Sylvii de le Boë*, si cum terebinthinæ venetæ spir. oleoso, vel succini, anisive oleo rite fuerit comparatum, ac per se solum, vel aliis admixtum, & podici inditum.

Suffimentum ex Thure commendat *Matthiolum*: additque præterea *Forestus* mastichen, semina myrti, & flores rosarum punicarum arefacta-



etarum. Suffitus conorum abjectis præsentissimum remedium dicitur a *Rumle*.

Interne vero, oleum mastiches ad guttas aliquot in aqua menthæ, plantaginis vel pulegii subito Tenesimum solvere, notat Hartmannus. Auctor vero Dictionarii Medicinalis observat, cum tenesimo quandoque internum ani dolorem conjungi admodum molestum, cui sequenti clystere optime auxiliatur. *℞. Fol. vel flor. succ. sambuc. flor. verbas. alth. ana man. j. aq. lib. ij. capit. pap. alb. num. ij. coq. simul & colat. sit ad usum clyster. vel etiam satis est, singulo bihorio pulp. cass. unc. sem. assumere, nam unica die hujus ope remedii morbus cessat.*

Interdum vero ab hoc morbo, dolor ventrem cingens excitatur, quo mucosæ excretiones reduntur, nonnullis striis sanguinis tinctæ, cum frequenti desidendi conatu, unde vel nihil omnino, vel pauca mucositas tantum deponitur. Hoc autem casu clyster supra laudatus confert ter indie reiterandus, vel balnea mane, & vespere per horam integram adhibenda, mirifice juvant; quibus usurpatis bini cyathus aquæ mannæ hauriuntur, quæ hujusmodi est. *℞. Mann. elect. unc. ij. aq. lib. ij. dissolvit. manna de colat. quinque vel sex cyathus quotidie propinantur.* Hujus equidem remedii virtus in hæmorrhoidibus internis, nihil omnino effundentibus, egregia præstat.

*Art. 1448.* Quando sedato dolore, & inhibita fluxione ulcus superest, primum idem detergendum decocto hordei, hydromelite, melle rosato; tertium deinde exsiccandum est cum gall. ros. rub. oryza torrefacta, in aqua chalybeat. coctis, in qua dissolvitur bol. sang. dracon. Clysteris minima sit quantitas: scilicet ad lib. sem. quia ultima intestini pars tantum abluenda.

*Si ulcus remaneat.*

Ungitur autem ulcus unguento populeo, albo *Rhazis*, cui camphora additur, si ulceri phlegmon sit conjunctum.

*Phlebotomia an instituenda.* Art. 1449. Quoad venæ sectionem, ea mihi, inquit *Franciscus Calmeete*, in isto affectu videtur minime omittenda, initio præsertim, & ipso morbi augmento: imo si febris quandoque adsit, aut intemperies viscerum, & sanguinis calida, aut plethora, viresque vigeant, ut fere semper accidit, iterum, atque iterum celebranda venit, sic namque humorum acrimonia, & calor contemperatur, & eorundem ad intestinum rectum descensus, & fluxus cohibetur; quodsi ab ulcerato, eroso, aut inflammato recto intestino, aliavè quacumque de causa stranguria, sive mejendi difficultas supervenerit, venarum hæmorrhoidalium apertio per hyrudines erit utilissima, sicut & balneum.

## COLICA BILIOSA.

*Sydenhami sententia.*

*Colica biliosa.* Art. 1450. Colica Biliosa est intestinorum dolor atrocissimus præ cæteris omnibus, intestina nonnunquam quasi injecta fasciâ constringit; nunc in punctum contractus quasi terebello perforat: subinde remittitur dolor, mox recrudescebat paroxysmus, quem æger præsentens vultu miserabili atque ejulatu, ceu præsentem, exhorret & averfatur. Sub initio hujus morbi non ita certo ad unum aliquod punctum determinatur dolor, acque in ejusdem progressu, neque tam crebra est vomituritio, neque alvus ita pertinaciter cathartorum vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatius in puncto figitur, vomituritio succedit frequentior, & major alvi



alvi adstrictio, donec tandem ab ineluctabili horum symptomatum vi totalis peristaltici intestinorum motus inversio (nisi maturius quis tulerit suppetias) atque *iliaca passio* procuratur: Quæ hoc morbo excernitur materia, sincera si fuerit atque *αμύνη*, viridis aliquando, aliquando etiam flava, aut insoliti cujusdam coloris spectatur.

*Art. 1451. A nephritide sic distinguitur. 1. Quomodo a nephritide distinguitur.* Dolor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem ureteris, Colicus vero vagus est & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A pastu Colicus dolor augetur, nephriticus potius imminuitur, 3. In Colico dolore ab excretionem per alvum & vomitum majus levamen emergit, quam in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur; in Colica urinæ initio crassiores existunt.

*Art. 1452. Ad curam rite instituendam sanguis e brachio paulo liberius quamprimum educatur, & post horas iij. vel iv. anodynum exhibeatur: postero die catharticum lenitivum & interposito die uno ad tertiam vicem propinetur. Aqua epidem. mirab. vel quæcunque alia cardiaca, postquam longo morbo vires plurimum exhaustæ fuerint, aliquando mirum in modum juvat. Equitatio, quemadmodum in pluribus morbis chronicis, quod maximum est præstat, hæc quoque cæteris non proficientibus curationem nonnunquam absolvit. „ Aliud exercitii „ genus in hoc affectu equitatione longe efficacius in Barbada habemus (inquit Tourne) „ viz. navigationem circa insulam. Vidit quosdam „ in deploratissimo infirmitatis statu, cum aliam „ qualemcunque gestationem ferre non potue-*

*Methodus mendi.*

„runt, hac ratione, ultra quam quod credibi-  
„le est, reſtitutos.

*Parcelli ſententia.*

*Morbi  
deſcri-  
ptio.*

*Art. 1453.* Colica eſt dolor ventris atrociffi-  
mus, quandoque totum abdomen occupans, ali-  
quando ad unum punctum determinatur cum  
cruciatu quaſi terebrante, interdum de loco in  
locum immutatur, nonnunquam videtur ſenſa-  
tio tanquam viſcerum cum funibus ſimul cor-  
reptorum; intumeſcit aliquando totus venter  
ita, ut quaſi diſrupturus eſſet; alvus ut pluri-  
mum clauſa eſt, urina pauca redditur; atque  
hæc ſunt ſymptomata uſitatiora; accidunt etiam  
aliquando graviora: febris, in ore ſapor acidus  
vel amarus, vomitus, ructus, urinæ ardor aut  
ſuppreſſio, icterus, pulſatio magna in abdomi-  
ne, ſenſus frigoris in eodem, umbilici intus re-  
tractio, vel protrufio ejusdem extrinſecus, ma-  
teria flava vel viridis per alvum ejeſta ſine le-  
vamine, excrementa alvina læviſſima & ventofa,  
inſtar ſtercoris bovini, urinæ ſupernatantia. Co-  
lica frequenter in *paralyſi*, *epilepſia*, *arthritide*,  
*hydrope*, *rheumatismo*, aut *tabe* terminantur.  
Dolores Colici ſunt aliquando in *peritoneo*, qui  
frequenter lethales evadunt, ut etiam in *pan-  
create*; vide loco p. 27. & 30. *Spigelius* affirmat  
ſe nullum unquam diſſecuiſſe ex Colica mor-  
tuum ſine inteſtinorum inflammatione.

*Cauſa  
varia.*

*Art. 1454.* Cauſæ colicæ frequentiores ſunt:  
cruditates, flatus, alvi adſtriſtio, humores aci-  
di in ſanguine, bilis acrimonia, herniæ, ab-  
ſceſſus interni & latentes, ulcera, cancri, &c.  
concretiones lapidoſæ in pancreate, hepate, lie-  
ne, inteſtinis, vel ventriculo, inſertio ductus cho-  
lidochi in ipſum ventriculum (vel pylorum,) luxa-



luxatio cartilaginis xiphoidis, constitutio aeris maligna, unde Colica *epidemica*, affectiones nephriticæ, & postremo obstructions & tumores strumosi in glandulis intestinorum (& mesenterii) Colicam producant; hi dolores sunt magis fixi, diuturni, nec adeo acuti; *cathartica* & *enemata* minus prosunt. De structura & situ colæ vide locum part. 66.

*Art. 1455.* Curatio inchoanda est cum *venasectione*, si adsit calor insignis vel inflammatio, vel febris vel ingens humorum affluxus. *℞. Decoct. capit. ovin. vel pedum vitulin. vel intestin. vervecin. ℥x. ol. oliv. ℥iij. m. f. enema.* In frigidioribus enema *ex ol. oliv. vel lini & vino Canarin.* item cum *ol. rut. cham. junip. &c.* cum fructu injiciuntur. Si hæc alvum non subducunt, ad fortiora deveniendum est. N. B. sed notatu dignum. *Nota* est, experientia abunde testante, quod immediate *bene.* te post *venasectionem* clysmata vel *lenissima* promptius operabuntur, quam fortissima ante sanguinis missionem. In acerbissimis torminibus cum vomitu, &c. *Laudan. gr. iv. vel v. in clystere* dolorem in instanti leniunt, quum idem remedium per os nullum omnino afferat auxilium. In *Colica habituali* pannus laneus mollis & subtilis *Colica habitua-* immediate supra cutem ventris continuo gestandus; a *Galeno* & aliis multum laudatur tanquam *lis.* fomentatio perpetua. *„ Virtutes aquarum sulph. „ Bathoniens. (extra paroxysmum) equitationis, „ &c. sunt satis notæ. Commendatur jusculum „ cancrorum fluviatiliū: & radix allii pro pau- „ peribus. Interdum exhibeo oleum seminum ani- „ si larga quantitate viz. a gr. 40. ad 100. in „ paucis saccharo vel aliter cum magno levami- „ ne, præcipue in colica a causa frigida oriunda. Semen anisi vocatur ab Helmontio *sola- „ men intestinorum.**

*Baglioi sententia.*

De apho-  
nia &  
Paralyfi  
ex coli-  
ca.

*Art. 1456.* In Colica Biliosa succedit frequen-  
ter *aphonia*, & vox rauca, & per totum fere mor-  
bi decursum durat. In Colica pertinaci si sudor  
copiosus & universalis superveniat labefactis & re-  
solutis viribus, brevi *paralyfin* expectato: cave  
igitur ne *opiata* copiosius in ea exhibeas.

Remedia  
nonnul-  
la.

*Art. 1457.* Antidotum Colicæ est *chamame-  
lum*, a quacunque causa oriatur. Quando *opia-  
tis* uteris, semper adde *castoreum*, nam & opii  
narcosin corrigit & doloribus medetur. In perti-  
naci malo conducit iter aliquod, ut corpus plu-  
rium dierum *equitatione* excitetur, fibræque me-  
senterii longo dolore laxatæ pristinas resumant  
oscillationes ad morbosas impuritates e mesen-  
terii sinu eradicandas expellendasque. Valde  
prodest *femicupium* in graviore casu & in ipso  
ileo.

*Villisi sententia.*

In colica  
mesente-  
rii pri-  
mario  
afficitur.

*Art. 1458.* Pars primario affecta in Colica vi-  
detur esse *mesenterium*, quod est valde sensile,  
& humorum nervosi generis affluxionibus plu-  
rimum obnoxium, & hinc dolores lumbares a-  
trocissimi, in quantum scilicet nervi quidam  
insignes lumbares mesenterii plexum nerveum  
maximum ingrediuntur. Transitus a Colica ad  
*paralyfin* indicio est materiam morbificam non  
per arterias, sed nervos deferri, ejusque sedem  
non esse intestinorum tunicas, sed *mesenterii*  
plexus nerveos.

Curatio.

*Art. 1459.* ℞. Fol. *malv.* utriusque *mercurial.* pa-  
rietar. ana m. iv. flor. *sambuc. cham. melilot.* ana m.  
ij. caput *vervecin. discissum*; coquantur in q. s. aq.  
font.



*font.* colatura usurpetur pro fotu cum sulphuris laneis calidissime intinctis & expressis, atque vicissim applicatis, repetendo quoties dolores intensius urgebunt. *Omentum agninum aliave brutorum viscera calentia* abdomini imposita & subinde mutata dolores interdum mire sedant. Præ aliis quibuscunque remediis, aqua acidula mineralis ferrata æstivo tempore per mensem epotæ, juvamen maximum conferre solent, & reliqua alterantia longe superant. *Tinctur. antimon. & succini* locum habent.

## COLICA HYSTERICA:

*Sydenhami sententia.*

*Art. 1460.* „ De Colica Hysterica apud nulum authorem usquam legimus, audivimusve „ ante accuratissimum *Sydenhamum*. „ Impri-  
mis cavendum est, ne symptomata foeminis hystericeis familiaria ab aliis, quos sæpe æmulantur, morbis diagnosis errore putentur oriri. *Colica Hysterica.*  
*Colica hysterica* biliosam nonnunquam mentitur, comitem habet dolorem circa cordis scrobiculum, regionem ventriculi & paulo inferiorem; sequuntur humorum viridi aut flavo colore per vomitum ejectiones & animi dejectiones maximæ, post diem unum vel alterum facessit dolor, a levissima vero animi commotione revocatur. *Morb. descriptio.*

*Art. 1461.* Cura radicalis a cap. de hysterica passione petenda est. Nec *venesectio* nec *catharsis* locum habent; nam malum exasperant, immo nociva sunt ipsa *enemata lenissima*; quippe hic morbus a spirituum *ataxia* potius quam vitio humorum nasci videtur; Ideoque præmissis aliquot haustibus *liquoris possetici*, iisque per vomitum rejectis, statim ad *landanum* confugiendum *Curatio longe diversa quam colica biliosa.*

dum est, & in usu ejus persistendum. Aliquando tamen in foeminis sanguineis humorumque copia oppressis vel phlebotomia vel catharsi vel utraque, *anodyno* via aperienda est. In *icterum* interdum transit, qui plerumque sponte sua sensim facessit; sin longas moras neſtat, remediis *ictericis* fugiendus est; observandum solummodo occurrit, quod e catharticis *rhabarbaro* solo utendum.

## COLICA PICTONUM.

vulgo de Poiton.

*Colica Pictonū.* Art. 1462. Colica Pictonum est species quædam, quæ degenerare solet in *Paralysin*, & motus omnimodam manuum ac pedum depravationem, quam hoc nomine *Riverius* in cap. de Colica indigitat; & apud *insulas Caribum* notissima est, utpote quæ magnam vim hominum infestat. Hunc dolorem atrocissimum sanat *Balsamum Peruvianum* frequenter ac magna dosi exhibitum, viz. gr. xx. xxx. vel xl. sacchar. albo instillatum bis vel ter in die: at *paralysis* huic remedio haud cedit. *Galbanetum* pro usu externo.

### Touneî sententia.

*Colica nervosa.* Art. 1463. Colica nervosa seu convulsiva est affectus adeo frequens in *Insulis Caribienſibus*, ut in numero morborum *Endemicorum* jure merito habenda sit. In medicorum scriptis Colica Pictonum nuncupatur, quia *Pictavi* est frequentissima; in insula vero *Barbada* vulgo audit *the dry Belliach*. Inter universas calamitates humanum genus affligentes, ne una quidem tanta acerbitate homines excruciat, ac hæce Colica. Frequenter malum inchoare solet in uno puncto



cto ventris, indeque latius diffunditur, ita tamen, ut omnia viscera, a pyloro ad anum usque, ad istum locum, tanquam *ad miseriarum commune centrum* miro cruciamine contrahi videantur. Omnimodi sentiuntur dolores, urentes, lancinantes, mordentes, pungentes, &c. Multifariæ hujusmodi torturæ ægrum exercent, ad dies fortasse 8. 10. vel 14. alvus interim pertinaciter constipata est, urina pauca, vires fere exhaustæ, extrema frigida; adsunt etiam sudores gelidi, præcordiorum anxietates, animi deliquia, angores, desperationes, & similia donec tandem dolorum atque ægritudinum oneri succumbit.

*Art. 1464.* Causæ præcipuæ hunc morbum atroce[m] producentes sunt acerborum ac immatu- *Causa.*  
 rorum fructuum comessatio, nimia liquoris perniciosissimi ingurgitatio, quem vocant *Rum-Punch*, ex spiritu sacchari ardentissimo & succo limonum sylvestrium, & compositum (vid. *Trat. de Venenis* in fine) & inclementia aeris nocturni itinerantibus, si ante crapulam edormiverint, &c. Cessante aliquanto doloris vehementia ægrotus perturbationem quamdam per spinalem medullam sentit, qua brachiorum ac crurum nervis propagata, imbecillitate statim sensum afficiuntur, indies crescente, donec brevi *in paralyfin confirmatam* definit. „Unde *Vvill-*  
 „ *lisius* conjecturam fecit transitum a Colica ad  
 „ paralyfin indicio esse materiam morbificam  
 „ non *per arterias*, sed *nervos* deferri, ejusque  
 „ sedem non esse intestinorum tunicas, sed  
 „ *mesenterii plexus nerveos*.

*Art. 1465.* Methodus medendi hunc morbum *Curatio.*  
 gravissimum & paralyfin præcavendi, a catharsi  
 primario incipienda est, ad pertinacem alvi ad-  
 strictionem subigendam. In hunc finem cathar-  
 tica

rica leniora forma liquida frequenter repetita optime conducunt, fortiora spasmos adaugere solent, & *Ilei* periculum intentare. Verum propter affectiones intestinorum spasmodicas consultum erit imprimis *Paregoricum* propinare. Opiata paralyfin accelerare nonnulli opinantur, sed longe errant; indubitata experientia doctus larga manu ista non modo innocue, sed semper cum fausto successu exhibui. Sequenti methodo cum prospero eventu frequentissime processi:

*℞. Pil. Matth. gr. viiij. vel x. castor. gr. iv. opobalsam. q. s. f. pil.* statim capiendi deinde elapsa semihora, *℞. Manna opt. ℥ss. crem. tart. ℥ij. syr. rosar. solutiv. ℥j. f. mistura* in haustul. tepid. juscul. avenac. sumenda & 3is horis repetenda, donec alvus soluta fuerit, in intervallis *pil. Matth. gr. iv.* exhibere soleo, vel, si vomitus vehementius urgeat, sequentem haustum *℞. sal. absynth. ℥j. opii purissim. gr. j. vel gr. iß. aq. menth. fort. ℥j. syr. limon. ℥ss. m.* Enema quoque cum balsamicis quaque hora injiciendum est; sequens etiam fottus abdomini usui esse potest; *℞. Fol. cham. ℥iij. bacch. junip. laur. ana ℥j. coq. in aq. font. ℔v. ad ℔iij. sub finem addendo sem. carui, fœnic. anis. ana ℥ss. colatur. add. opii ℥j. sp. saccar. ℔j. m.* *Semicupium* doloribus mitigandis quandoque nonnihil prodesse observatum fuit. Morbi vehementia in hunc modum subacta ad purgantia efficaciora, *mercurialia* scilicet, deveniendum est; *℞. Colomel. pil. coch. min. ana ℥j. opobals. q. s. f. pil.* mane sumend. & quotidie repetend. donec dolor penitus remiserit, & alvus satis solubilis evadat. Deinceps *balsamum Peruvianum* ad ℥ij. vel ultra 6. quaque hora sacchar. crystal. infusillatum vel aliter exhibeo, & rarissime spem meam fefellit. Est & aliud insigne medicamentum apud nos divini numinis favore in hac insula



fula sponte productum, nempe *Pisselaum Indi-* *Pisselaum*  
*cum*, huic malo valde proficuum, prædicto bal- *indicum*,  
 samo adhuc efficacius, nisi quod quibusdam sto-  
 macho non adeo gratum sit; dosis ʒij. ter in  
 diem per longum tempus, donec morbus peni-  
 tus subigatur. Nec datur præstantius remedium  
 pro usu externo, quam dictum *Pisselaum*, cum  
 æquali vel dupla quantitate *sp. sacchari* commi-  
 stum; pro vertebriis dorsii & artubus illinendis,  
 quandocunque paralyseos sit levissima suspicio:  
 hæc vero cum formata sit & confirmata, nulli  
 remedio, quod scio, cedit; nisi forsan *aqua Ba-*  
*thonienses in Anglia* tanto malo succurrere va-  
 leant. „ Immo in ipso casu valere novi.

## DOLORIS COLICI

species.

### *Ægineta sententia.*

*Art. 1466.* Colon crassioris intestini pars a *Colica*  
 dextra iliorum parte oriens in modum zonæ ad *descri-*  
 sinisteriorem excurrit. Cruciatus in eo pluribus *ptio.*  
 de causis suscitantur immensi, aut enim pro-  
 pter crassum pituitosumque humorem, qui in-  
 tra ipsius tunicas insidet, aut propter spiritum  
 etiam crassorem, ac turbidum inclusum, aut  
 propter inflammationem intestini, aut propter  
 acres, vique mordaci vellicantes succos.

*Art. 1467.* Quibus itaque crassus pituitosus-  
 que humor cruciatum infert, his dolor per uni-  
 versum funditus epigastrium diffunditur, præ- *Ex pi-*  
 cipue vero, ubi sensu coli situm terebra perfo- *tuita.*  
 rari autumant. Torsiones hos circa umbilicum  
 excruciant: ructus item, & nausæ, vomitiones-  
 que variæ, sed in primis pituitosæ: alvus gra-  
 viter impedita adeo nihil excernit, ut ne flatus  
 qui-

quidem præterlabi queat. Excretum autem quandoque oletulum, veluti bubulum cernitur leve, & spiritu refertum. Præcedunt hæc vero maxime gelidorum, crassique humoris esculentorum frequens usurpatio, satietas, cruditas, otium, & id genus alia.

*Ex flatu.* Art. 1468. Qui vero dolorem flatulento spiritui acceptum referunt, extensionis potius sensu torquentur.

*Ex inflammatione.* Art. 1469. Qui autem ob inflammationem tormenta sentiunt, loci fervore deprehenduntur, quem febris haud ignava comitatur, una cum stercore lotium retinetur, pulsus ventrem perturbat, sitis, æstus, et nausæ infestant, vomitionesque biliosæ potissimum, quæ nihil malum sublevant. Ea quidem ut uno verbo loquar, omnium infestissima est colicarum affectio, quæ in gracilioris intestini morbum, quem Ileon Græci nuncupant, transitum minitatur.

*Ex acredine.* Art. 1470. His qui propter acres, & mordaces afficiuntur humores, perinde atque cum subest inflammatio, corpus æstuat, sitis, & vigilia molestant. Febriunt autem omnino, aut paulo minus illis. Lotium acre emittunt, & biliosum deiciunt; sæpenumero in alvi dejectione plurimum torquentur, & eduliorum potuumque excalfacientium usu gravius irritantur.

*Curatio visciditatis.* Art. 1471. Medendum itaque doloribus, qui ad gelidos tenaces & spissos humores referuntur, non admodum caloricis, quia ab his in flatulentum magis spiritum rediguntur humores. Quare alvus prius oletulo clysteribus exonerata, oleum in quo elixum sit cyminum, aut ruta cum adipe anserino, vel gallinaceo, vel radicum sylvestris cucumeris decocto, myrrhæque denario, melle, & sicyonio oleo injiciendum est. Quia & oleum commune infusum non raro pituitam



vitream extrahit, infestantemque protinus dolorem sedat. Perseverante cruciatu clyster præmemoratis adjiciendus est, resinæ terebinthinæ unc. j. sive opopanacis ℥j. aut galbani ℥iv. bituminis tantundem cum nitri ℥j. & ol. rutacei unc. v. vel plus. Potioni absynth. & cuminum æquis portionibus, aut panax cum aqua, vel castorei, vel anisi, piperisque ℥j. cum oxymelite præbetur. Quodsi cruciatus his remediis non cedunt, potionandi sunt confectio quæ e tribus piperum generibus constat, vel theriaca. In vehementioribus tormentis mediocriter mitigantibus præsidii utendum est: cujusmodi consentur e castorio confectus pastillus, cum per superna, tum per inferna immissus, & alia ejusdem generis medicamenta, nam quæ vehementer torporem afferunt cavenda sunt, quod diuturniorem affectionem reddunt, & tormenta paulisper leniunt. Pituita vero jam attenuata hiera amarulenta, vel globulis hujusmodi purgare expedit. 24. Aloes, euphorbii, cocci gniidii puri, scammonia, ana ℥ij. m. f. pilul. Victus adhuc ratio calidior, & aridior convenit; a primordio quidem morbi præferenda est inedia; mox inde acriora manducanda: ut poma tosta, apium, asparagus, allia cruda &c.

*Art. 1472.* Ubi vero flatulentus spiritus dolorem suscitaverit, post enemata quibus flatus discipantur potionesque, cucurbitulæ etiam per quam ingentes succensæ, & inanes universo ventri impactæ, nonnumquam satis adminiculi præstiterunt.

*Curatio  
flatu-  
lentia.*

*Art. 1473.* Quodsi intestinum inflammatio torquet e cubito sanguis detrahendus est; si vero mictionis difficultas exercet, vena a mallelo secanda est, & jampridem enumeratis utendum remediis, exceptis acribus, & vehementer expul-

*Curatio  
inflam-  
matio-  
nis.*

purgantibus. Lenientes potius infundi clysteres debent. In oleum quoque descensus commendatur. Cucurbitulas interim utiliter adglutinabimus. Victus sit tenuis usque ad inflammationis solutionem.

*Curatio  
acrimo-  
nia.*

*Art. 1474.* Quodsi acres & mordicantes succi cruciatus pepererint, oleum per alvum infundetur; in quo elixatum sit scenogræcum, aut althea, cum molli adipe recenti anseris, vel gallinæ, vel cremore quoque ptisanæ, cum rofaceo, & lini seminis quoque liquore. Potionandi vero sunt antidoto ex aloë amara. Lavacris ex aquis dulcibus danda est opera. Cibis utendum sorbilibus ex chondro, seu ptisana, piscibusque saxatilibus. Si dolor admodum violentus laborantem exerceat, iis etiam, quæ stuporem inducunt, utendum.

*Colica  
epidemi-  
ca.*

*Art. 1475.* Mea quidem sententia, colica ægritudo, quæ nostra ætate incrudescit, ex talibus humoribus (tenuibus, nempe, & mordacibus) nascitur; cum ab Italiæ quidem finibus incœperit, per pleraque alia Romani Imperii loca instar pestiferæ contagionis grassatur; unde non paucis quidem in morbum comitiale, aliis vero in membrorum resolutionem incolumi sensu, nonnullis autem in utraque delapsis, magna pars eorum qui in comitiale ceciderant, e vivis excefferunt. Quorum vero morbus in paralyfin transierat, plerique evaserunt. Hinc intelligimus a Paulo Ægineta ipso cognitam eam fuisse colicam quæ postmodum *Pictorum* vocata est.



*Ettmulleri Sententia.*

*Art. 1476.* Dolor punctorius & terebrans acerbissimus sentitur in hypochondrio sinistro, aliquando sed rarius in dextro, in utroque colon facit angulum satis acutum in curvatura; dolor contorsionis, lacerationis, & vagæ lancinationis oritur ex spasmodica intestinorum contractione, & plerumque adest in Colica nephritica; dolor rodens & vellicans vermes indicat, dolor pulsans intestinorum inflammationem. Mulieres interdum sub difficili mensium fluxu patiuntur tormina gravia abdominis, quædam post partum (& ante etiam aliquando) dolore Colico laborant, in utroque casu plerumque ex abdominis & intestinorum *convulsione*.

*Art. 1477.* In omnibus intestinorum torminibus tam humorosis quam convulsivis habitualibus, quoad causam antecedentem, respiciendum est inprimis ad *acre acidum* plus minus *austum*; plus minus *viscidum*, ex stomacho ad intestina delatum; adeoque ab assumptis vel vitiosis, vel vitiose digestis eo distributum, vel in plexibus nerveis mesenterii, vicinisque locis membranosis pertinaciter hærens, & a quacunque causa externa excitatum.

*Art. 1478.* In Colica hysterica sensus globi, in abdomine moti; quem mulierculæ & medici ignorantes pro uteri habent motu; est *plexus centralis mesenterii maxime convulsus*; in viris quandoque accidens. Attendendum est præ omnibus, an Colica sit *humorosa*, an *convulsiva*, an sit *accidentalis* vel *habitualis*, an sit *scorbatica*, *hysterica* vel *alia*. Clysmata terebinthinata in Colica *convulsiva* sunt optima.

*Art. 1479.* In Colica *humorosa*, ubi pertinaci

Colica  
biliosa;  
&c.

Ad causam  
antecedentem  
respiciendum  
est.

Semper  
attendendum  
est, ad  
speciem  
Colicæ.

Curatio.

ter hærent stercorea, convenit enema ex *ol. sem. lini & raparum & sal gemme* ad ℥j. vel ij. alias enema emolliens & carmin. ex *urina pueri* in affectibus intestinorum *flatulentis*, etiam cum *terebinth.* aliquando. Si dolor Colicus sit nimis acerbus, prius est mitigandus, quam purgantibus proritetur alvus. *Ol. amygd. dulc. & spermaceti* in Colica convulsiva est remedium proficuum, & *gum. ammoniacum* in humorosa. Succus expressus *stercoris equini* est præsentaneum remedium contra Colicam, p. 1061. (vide locum) speciatim in Colica convulsiva. Decoctum *flor. cham.* in quacunq; Colica maxime laudatur, tanquam specificum, & pene infallibile remedium, *sacchar. saturni* est remedium singulare. Pro usu externo *ol. cham. succini, junip. ol. petreæ, galbanum, empl. fatus*, &c. vid. locum p. 181.

*Diagnosis* *Art. 1480.* In Colica, si urina sit tenuis, & ex aquosa morbus est ut plurimum *nephriticus*. *urina*, (aliquando *hystericus*;) si valde colorata, *scorbuticus*; si respiratio sit difficilis & præcordia perturbentur, *hystericus*. In graviore casu clystma ex *fumo nicotiane* est remedium dolorem mitigans & alvum laxans.

### Foresti Sententia.

*Vires sal. gemme.* *Art. 1481.* In Colica stercoracea aut a pituita viscidior nuncquam obliviscatur medicus *sal. gemme*: nam hoc expertissimum est ad resolvenda stercorea & mucilagines crassas; *Forest. l. xxj. vid. etiam Mess. med. spargyr. sub tit. sal. gem.*

*Remedia varia.* *Art. 1482.* „ Consultendus est *Boerhaave* in his affectibus (uti in fere omnibus) tanquam oraculum. 24. *Flor. cham. miss. coq. paulisper in aq. brion. comp. ℥iv. in colatura dissolv. ol. mac. per express. ℥℥. syr. de mecon. ℥℥. m. f. haustus calidi* „ de



„ de fument. ad dolores leniendos in praxi no-  
 „ stra frequentissime. Decoct. fol. malvæ pro pau-  
 „ peribus præcipue in colica nephritic. Vualdsch-  
 „ midii experientia constat, arenas calidas in sac-  
 „ culo regioni ventriculi impositas vim habere  
 „ dissolvendi ac discutiendi. Allium condit. zin-  
 „ zib. condit. (in frigidioribus) empl. e bacc. laur.  
 „ & Cumin. &c. Pharm. Lond. Enema colic. enem.  
 „ hyster. enem. tereb. fatus ad colic. fatus spirituo-  
 „ sus, mistura hyster. spirituos. „ sunt remedia  
 usu comprobata.

*Farrago sententiarum .*

Art. 1483. Quoniam Mesenterium pars est, Colica  
 valde sensilis, & humorum nervosi generis af- mesen-  
 fluxionibus plurimum obnoxia, morbi Colici terica.  
 fedes merito in eo statuitur. In ea vero colica,  
 in qua inæqualis distentio, & adstrictio ventris,  
 rigidorumque musculorum contractio adsunt, de-  
 notatur nervos potius, quam intestina in eadem  
 affici.

In Colica biliosa succedit frequenter Apho- Nota  
 nia, & vox rauca, & per totum morbi decur- bene.  
 sum durat; hæc vox rauca in febribus a bile  
 ortis apparere quoque solet, unde numerari po-  
 terit inter diagnostica morborum a bile, sive a  
 salino-sulphureis, & adustis massæ sanguineæ par-  
 ticulis.

Art. 1484. Colica Pictonum ab ea, quæ picto- Colica  
 rum dicitur plurimum differt, quamvis ob vo- Pictonū  
 cabuli similitudinem vulgo confundantur. Ea & plur-  
 pictorum a causticis colorum veneficorum pul- bea.  
 visculis conterendo, vel pinsando in auram, &  
 respiratione in os raptis, qui cum saliva mixti  
 in stomachum, & intestina descendunt. Pluri-  
 mi enim colores sunt ex arsenico, cinnabro,

auripigmento, &c. Tertiam item colicæ speciem nonnulli faciunt, quam plumbeam colicam dicunt, quia vitrarios, plumbi ductores, Bractearios, Specularios, & qui circa plumbi, & mercurii mineras operam impendunt corripit non minus, ac Pictores, sed nos hanc eandem omnino cum ea Pictorum facimus.

*Colica  
& Ar-  
thritidis  
consen-  
sus.*

*Art. 1485.* Arcanus quidam ac inexplicabilis consensus observatur inter morbos ventris, & cutis. Dolorem colicum vidimus mutatum in arthriticum, & contra dolores arthriticos, per supervenientem colicam, aut Diarrhœam solutos. Hinc quadrat illud Hippocratis: Alvi laxitas cutis densitas; cutis raritas alvi densitas; ideo observamus in praxi, quod diurnæ Diarrhœæ irritis aliis per diaphoretica promptissime sanari solent. *Schombergius.*

*Prognosis.*

*Art. 1486.* Non retineri excrementa, dolorem locum mutare, nec non & intermittere salutem brevi promittunt. Dolor colicus quandoquo transit in abscessum, & aliquando in hydropem.

Si dolor colicus fixus est, & febris adest in abscessum terminari solet, quia ab inflammatione intestinorum proficiscitur, non ita vero si de loco, in locum mutatur.

Affirmat Spigelius se nullum unquam dissecuisse ex colica mortuum, sine intestinorum inflammatione, quæ indicatur præsertim a dolore pulsante cum febre; dolor contra rodens, & vellicans vermes offendit.

Quando remediis non allevatur dolor, sed figitur in parte, & vomitus post vomitum insequitur, & sudor frigidus oboritur, partiumque extimarum perfrigeratio, ad extremum perventum est. Nihil facilius colicæ supervenit quam paralytis: cave ne opiata copiosius in ea exhibeas:



beas : solet enim post opiata magnus sudor supervenire, & exinde paralyfis.

*Art. 1487.* Quando opiata utuntur in colica, semper addendum castoreum, nam & opii narcotin corrigat, & doloribus medetur. Ante usum opiati semper enema injiciendum; diaphoretica cum opiatis optimum quoque effectum obtinent. *Remediorum cautela.*

Notatu dignum est, experientia abunde docente, quod immediate post venæ sectionem clysmata, vel lenissima promptius operabuntur, quam fortissima, ante sanguinis missionem. In acerbissimis torminibus cum vomitu &c. Laudani gr. iv. vel v. in clysmate dolorem in instanti leniunt, quum idem remedium per os nullum omnino afferret auxilium.

In Colica vomitoria, aut numquam aut cautissime propinentur, ne in passionem iliacam degeneret. Purgantia vero bene cedunt, præsertim si nulli adsint vomitus, nec febris, denturque in forma liquida. In hypochondriacis curandis cavendum a purgantibus fortioribus drasticis, quæ si non valde nocent, nihil tamen efficiunt, quia sennata, & blanda laxantia subjecta hæc facillime contra movent.

Pectori, & intestinis omnia frigida sunt inimica. Caveas igitur ab eis in talium partium affectionibus. Dolor colicus fere semper mitescit in semicupio. In Parefi & colica fugiantur thermæ, quia contracturam inferunt. Antidotum autem colicæ est, chamæmelum a quacumque causa demum oriatur. Valent contra aquæ medicatæ ex chalybe, & nitro &c. Hæ enim liberaliter epotæ copia, & pondere, & aperiendi (h. e. incidendi) vi, mucorum illam viscositatem abripiunt, e qua dolor propagatur. Virtutes item Aquarum Sulphurearum, Bathonien-

sum &c. extra paroxysmum, equitationis &c. satis pateſcunt. Pro pauperibus juſculum cancrorum fluiatilium, & radix allii commendantur. Equitatio demum colico dolore vexatis eſt neceſſaria.

Conſtat arenas calidas in ſacculo regioni ventriculi impoſitas vim habere reſolvendi, & diſcutiendi, tum etiam in colica habituali pannum laneum, mollem, & ſubtilem immediate ſupra cutem ventris continuo geſtatum, perpetuæ quaſi fomentationis locum tenere.

*Remediū ſingulare.* Art. 1488. Memoratu dignum eſt, quod in Volum. IX. commercii Epiſtolici ſub titulo *lettres edificantes & curieuſes* proſtat. In magni Mogolis Imperio pro quavis colicæ ſpecie annulus ferreus, diametrum ſeſquipollicis gerens adhibetur, quo ad ignem excandefacto ægri ſupino ſitu decumbentis ita umbilico imponitur, ut umbilicus ipſe centrum annuli referat. Vix ac ardorem experitur æger annulus removetur, ſicque reiteratur applicatio donec colicus dolor conticeſcat. Repentina enim revulſio, quæ hoc in caſu ab inteſtinis peragitur brevi tempore colicos dolores abigit.

*Colica Piſtorū curatio.* Art. 1489. Piſtorum colica purgantibus curatur, narcoticis, edulcorantibus, ſero lactis, & aquis mineralibus.

*Methodus Pa- riſina pro omni colica.* Art. 1490. Methodus qua omnis generis colica in Charitatis Xenodochio Pariſiis curatur, ita ſe habet. ℞. *Diaphænic. unc. ſem. diaprun. ſolut. ℥ij. ſyrup. nerprun. unc. j. diſſolvant. omnia in apozemat. purgant. unc. vj.*

℞. *Fol. ſen. pulp. coloquint. ana ℥ij. decoct. emollient. q. ſ. coq. & colat. add. diaphænic. ℥ij. benediſt. laxativ. unc. ſem. mel. mercur. unc. ij. f. clyſter, cui ſecundum indicationum exigentiam addi poteſt, ol. auc. vin. emetic. ana unc. ij.*



2. Pulp. colocynth. num. ij. vin. opt. lib. ij. coq.  
& colat. add. ol. nuc. unc. v. m. & f. duo clysteres in  
intervallo quadrihorii successive injiciendi.

De Dolica Nephritica in sequentibus verba  
faciemus.

## I L I A C A P A S S I O.

### Celsi sententia.

Art. 1491. Ileon modo supra umbilicum, mo- *Ilei de-*  
do sub umbilico dolorem movet. Fit ex alte- *scriptio.*  
ruto loco inflammatio, nec alvus, nec spiritus  
infra transmittitur. Si superior pars (tenuioris  
intestini) affecta est cibus, si inferior stercus per  
os redditur: si utrumlibet vetus est, adjicitur  
periculo vomitus biliosus, mali odoris, aut va-  
rius, aut niger.

Art. 1492. Remedium est sanguinem mitte- *Curatio.*  
re, vel cucurbitulas pluribus locis admovere,  
non ubique cure incisa; id enim duobus, aut  
tribus locis satis est. „ Distinguendum autem  
„ est a quibus causis Ileon oriatur, siquidem  
„ ubi inflammatio adest, ut in omnibus inflam-  
„ mationibus a sanguinis missione auspicandum  
„ est, at si a crudis crassisque humoribus fiat,  
„ tum a vomitione, aut purgatione per inferio-  
„ ra injectis, aut enematibus, aut inditis glan-  
„ dibus erit; quare apposite subdit Celsus, ex  
cæteris spiritum evocare abunde est.

Tum animadvertere oportet quo loco malum  
sit; solet enim contra id tumere; & si supra  
umbilicum est, alvi ductio utilis non est, si in-  
fra, alvus, ut Erasistrato placuit, ducatur. Du-  
citur autem percolato ptisanæ cremore cum o-  
leo, & melle, sic ut præter ea nihil adjiciatur.  
Si nihil tumet duas manus imponere oportet,  
supra

supra summum ventrem, paulatimque deducere. Invenietur enim mali locus, qui necesse est renitatur, & ex eodem deliberari poterit, du-  
cenda necne alvus sit.

Commune est, cataplasinata admove-  
re, ac sæpe mutare: brachia cruraque per-  
fricare, demittere totum hominem in calidum  
oleum. Si dolor non quiescit, etiam in alvum  
ex parte inferiore tres, aut quatuor cyathos ca-  
lidi olei dare, nec fuerit, inutile si in eodem  
aliquid scœnugræci, seminis lini, aut radicem  
althææ cum modico aquæ ad aquæ consum-  
ptionem decoquantur. Ubi per hæc conse-  
quuti sumus ut jam ex inferiore parte spiritus  
transmittatur, offerre potui mulsum tepidum  
non multum, nam ante magna cura vitandum  
est, ne quid bibat. Si id commode cessit adji-  
cere sorbitionem.

*Vitius  
ratio.*

*Art. 1493.* Ubi dolor, & febricula quierunt,  
tum demum uti cibo pleniore, sed nec instan-  
te, neque duro, neque valido, ne intestina ad-  
huc imbecillia lædantur, potui vero nihil præ-  
terquam puram aquam. Ac postea etiam vita-  
re oportet balneum, ambulationem, gestatio-  
nem, cæterosque corporismotus; nam facile id  
malum redire consuevit, & sive cum frigus su-  
bit, sive aliqua jactatio, nisi bene jam confir-  
matis intestinis, revertitur.

### *Ettmulleri sententia.*

*Iliaca  
Passio.* *Art. 1494.* Ileos sive Iliaca Passio est motus  
peristalticus intestinorum inversus cum dolore  
circa umbilicum intensissimo; excrementa alvi-  
na motu retrogrado per os ejiciuntur ex obstru-  
ctione alvi contumaciori. Appellatur *Convolutus*  
lus



*lus & Chordapson.* Quoties in sequiori sexu morbum Iliacum observare contingit, *Herniam* adefse tuto fere prædicare possumus, quamvis ob exilitatem ipsæ patientes non observare soleant. Opinio de convolutione intestinorum est falsa; ingressus vero superioris intestini in inferius, & contra, est satis frequens. Dubium est an inflammatio intestini sit causa obstructionis ejusdem vel contra. Morbus gradatim progreditur, in principio nil descendit per inferiora, abdomen sensim durescit, & tumet, ægri nauseant & vomunt primo ingesta, deinde recrementa flavescencia (& pituitosa) & tandem excrementa alvina. Adsunt lipothymia & anxietates inexplicabiles, sudores frigidi (extremorum frigus) urinæ suppressio; vires languescunt, singultus supervenit, qui prodromus est convulsionis, & epilepsiæ, & ipsius mortis. Plures intereunt, quam convalescunt. Si dolor sit acutissimus, & subito sine causa manifesta deficiat, signum est gangrænæ.

*Art. 1495. Venæsectio* celebranda est in initio, *Curatio.* si adsit febris vel insignis calor. *Cathartica* sunt fugienda. quoniam vomitoria evadunt; non prius securitas promittenda est, quam sequitur alvi profluvium sponte vel arte provocatum. *Ægri analeptici & cardiaci* sunt sustentandi. *Ol. amygdal. dulc.* cum juscule pingui, item *Sperma ceti* in decocto *raparum.* Deglutitio *globulorum* aut *argenti vivi* nil prodest, sed potius malum exasperat, ubi adest intestini inflammatio, gangræna, vel hernia, vel ingressus intestini superioris in inferius. *Dos. argenti viv.* est ℥iij. vel iv. ad ℥ss. & amplius, & exitus ejus per clysteres omni studio promovendus est; aliquando non ante aliquot dies redditur, interdum *salivationem* movet. „ Exemplum affert „ ali-

„ alicujus mercurii ℥ij. per octiduum in cor-  
 „ pore habentis & convalentis, sed non sine sa-  
 „ livatione excitata. Mulieri in sectione de  
 „ Lumbricis infra memorandæ gravissima pas-  
 „ sione iliaca correptæ enema lacteum statim  
 „ injiciendum præscripsi, & elapsis duabus ho-  
 „ ris haustum hypnoticum capiendum: & dein-  
 „ ceps post duas alias horas largam dosin pil. ex  
 „ duobus cum calomel. ℥ss. hæc nihil proficie-  
 „ bant; die proximo excrementa alvina per vo-  
 „ mitum ejecta sunt; largam quantitatem olei  
 „ amygd. dulc. in brodio tenui potandam jussi,  
 „ & linimentum ventre illinendo usurpandum,  
 „ & sub noctem enema cum vin. benedict. ℥iv.  
 „ injiciendum; nihilominus nihil per inferiora  
 „ descenderat, sed jugiter sursum omnia. Die  
 „ 4. sudores frigidi superveniebant; viribus fere  
 „ exhaustis; itaque argenti vivi ℥iij. propinavi  
 „ & trihorio post tres alias uncias; elapsa de-  
 „ inde hora una vel altera *ingentem lumbricum*  
 „ evomebat & bis per inferiora purgata est, &  
 „ in futurum alvus satis soluta manebat; argen-  
 „ tum vero vivum (quod mirum videatur) non  
 „ ante finem 7. vel 8. dierum redditum est;  
 „ nihil tamen mali mulieri exinde obveniebat:  
 „ hæc enim etiam nunc post quatuordecim an-  
 „ nos vegeta vivit. „ Omentum ovis recens ma-  
 „ sti calide in abdomen impositum mirum in  
 „ modum dolorem lenit; laudatur etiam cataplas-  
 „ ma ex pomis putridis *Borsdorffianis* cum tantil-  
 „ lo *croco*, vel ex *stercore ovillo* cum lacte cocto;

### Sennerti sententia.

*Misere-* Art. 1496. Barbari superioribus sæculis Iliac-  
*re mei.* am Passionem *miserere mei* vocabant, quoniam  
 malum est commiseratione dignum; in hoc mor-  
 bo



bo clysteres; imo & glandes vomitu rejiciuntur ob motum intestinorum inversum, ideoque aliquando intestinorum viæ in ileo non penitus præcluduntur. Signum hujus morbi proprium est, quod nihil descendit per inferiora; accidit plerumque vomitus bilis & pituitæ, frigiditas totius corporis, dolor plurimus, spirandi difficultas, &c. & morituris fudor frigidus. Omnis Ileus periculosus; rarissime convalescunt, qui sterqus per os ejiciunt.

*Art. 1497.* Venter foveri debet *decoct. emol. & Carat. linimentis* inungi. Oleum *amygd. dulc. & jussula pingua* ore sumenda sunt, & quamvis semel atque iterum talia vomitu rejiciantur, continuandus tamen est eorum usus ad fibras relaxandas. *De causis* A tribus potissimum causis exoritur, ab inflammatione, ab aliis tumoribus & exulceratione, & *sis con-* denique a facibus induratis, de quibus singula *sulatur* tim consulendus est author. p. 429. *author.*

*Barbette sententia.*

*Art. 1498.* *Fabricius Hildanus* observavit principium & originem hujus affectus fuisse circa *Causa* *Intestinum Cecum*; ego vero existimo valvulam *proxima.* in principio coli primum ex intestini cæci inflammatione adeo contrahi & constringi, ut plane nihil permeare possit. In omnibus fere hoc affectu extinctis dissectis accuratiores invenerunt, vel intestini gangrænam, vel tenuis intestini coarctati ingressum in partem proximam flatu prius turgidulam. Si gangræna jam aderit, cognoscitur ex eo, quod dolor statim cesset. *Omentum* & etiam *ipsa intestina* ex vivo animali quam calidissime abdomini applicari possunt multo cum levamine. Convenit *venæsectio* initio, si malum ab

ab inflammatione oriatur; Immo in corporibus robustis nunquam omitti debet.

Gangrena morbi causa.

Art. 1499. Plures ab ileo defunctos aperui, & intestini cujusdam inflammationem & sphacelum fere in omnibus, & morbi & mortis causam fuisse deprehendi; *Voillis*. Sæpius in hoc morbo defunctis (inquit *Dolens*) intestina plane vacua invenimus; unde manifestum est sæpius spiritus animales peccare.

### Sydenhami sententia.

Methodus medendi.

Art. 1500. Ventriculus primo loco præ omnibus corroborandus est, & vomitus, si fieri possit, sistendus; ideoque *sal. absynth.* cum succo *timon.* præscribo (subinde) sumend. intermediis vero temporibus exhibeo coch. aliquot *aq. menth. stillat.* sine alio quovis additamento. Dum hæc fiunt *catulum viventem* nudo ventri indefinenter accumbere jubeo; dolore hoc modo profligato, exhibeo *Pil. coch. maj.* ʒj. in *aq. menth.* dissolut. quam etiam *aquam* (quo certius vomitus recursum prævertam) toto catharseos tempore injungo. Victus sit tenuis per totum morbi decursum; & decumbat æger in lecto, donec convalescat. Usus *argenti vivi* & *globulorum* author minus probat.

Cura.

Art. 1501. In hoc affectu quotcunque cathartica propinaveris, ea statim emetica fiunt; ideoque *vena brachii* tundenda est & *fumus nictianæ* (de hoc vid. *Fulleri* enemata *oleos. amar.*) in intestina infundendus est quam validissime (omnium enematum, quæ mihi innotescunt, hætenus efficacissimum esse duco) ideo quoque post moram aliquam reiterari potest. Hoc successu carente, necesse est *catharticum fortissimum* exhibere;



bere, sed præstat hora una aut altera *paregoricum* propinare, ut sub *laudani* tutela *catharticum* retineatur; & suo munere defungatur. Sched. mon. p. 48. De usu follis, &c. vide enema *oleosum amarum Falleri*. *Fotus ad colicam*, *fotus spirituosus*, *mistura corallata*, omnia ad colicam quandoque in usum veniunt. Demulcentis doloribus conveniunt *femicupium*. In *Ileo stercore vacca* quam recentissimo universa ventris regio emplastratur; hoc etenim remedio, aliis nihil proficientibus, viam intestinorum aperui (inquit *Zacutus Lascian. in praxi admiranda.*)

*Art. 1502.* „Infans vix semestris a nativitate *Historia*  
 „ perfecte valens & vegetus subito in gravissima  
 „ ventris tormina lapsus est; subsecutæ sunt  
 „ vomitiones enormes, nihil omnino per inferiora  
 „ descendente, præter exiguum sanguinem.  
 „ Ad infantulum succurrendum omnem operam  
 „ ac studium navavi; sed frustra; nam triduo  
 „ expiravit. Abdomine aperto intestina omnia  
 „ usque ad inferiorem Ilei parte flatibus valde  
 „ distenta invenimus; & jejunum leviter inflammatum:  
 „ jamque paulo inferius morbi sedes in conspectum venit:  
 „ portio etenim Ilei, *sex digitos longa*, (quod prodigiosum erat in sub-  
 „ jecto tam parvulo) in *colæ* cavum, *cum mesenterio*  
 „ *adjuncto*, collapsa est; pars affecta in tumorem  
 „ attollitur tunicis intestinorum incrassatis,  
 „ nigricantibus; gangrænosis, & quibusdam in locis  
 „ sphacelatis per totius involutionis tractum,  
 „ unde intestinorum *oppilatio insuperabilis*,  
 „ qua instar *Polypi* visa est. En luculentum exemplar  
 „ *Passionis Iliacæ* perfectissimam morbi ideam  
 „ complectens in infante nondum semianniculo;  
 „ quod rarissimum esse credo.

*Ruysschii sententia.*

*Passionis  
Iliacæ  
causa.*

*Art. 1503.* Medici quidem de Iliacæ passionis, vulgo *Miserere* dictæ, Natura, & causa nequam conveniunt, cum alii videantur intestina tenuia in nodum, & circumvolutionem contorqueri, alii contra impossibilem hanc intestinalium revolutionem credant quousque mesenterio adhærent, quare ubi mesenterium putrescat id tantum possibile habent. Mihi autem animadverti ad ea, quæ in cadaverum dissectione, observavi, persuasum est, quod pro certo affirmari liceat, in atonia quadam seu elasticitatis fibrarum intestinalium defectu iliacam affectionem consistere, a qua tum vomitus frequentiores, & alvi segnities, tum sæpissime atroces cruciatus non minus quam repentina mors proficiscatur.

Hujusmodi elasticitatis defectus in fibris intestinalibus producit, 1.º a nervorum ad eadem intestina euntium obstructione, qui si non omnino, ex parte quadam tamen obturati, spirituum animalium influxum ad tenuia præsertim intestina impediunt, quæ proinde inertia remanent & motu suo peristaltico carent. 2.º Eadem atonia interdum producit ab intestinalis ductus obstructione, ob induratas fœces, vel os aliquod magnum, durum, ingestum vel etiam ob quodvis aliud solidum corpus circumjectum. 3.º Hujusmodi morbus oritur aliquando a portione quadam intestini in proximam immissa, vel quod immissio hæc ab inverso motu peristaltico ortum ducit, vel quod a convulsivo quodam motu peragitur, vel quod a nimia dilatione portionis cujusdam intestinalis fistulæ expeditur, vel etiam a nimia contractione ejusmodi portio-



tionis; unde fit, ut portio latior capax evadat contractiorem minoremque portionem recipiendi, & diversis intestinorum motibus adjuvantibus altius admittendi. 4°. Cognovi etiam hunc morbum ab intestini contractione oriri, cum idem interdum, adeo contractum invenerim, ut nisi ægre admodum digiti annularis extremitatem admitteret, a qua constrictione fœcum, flatuumque transitus interceptiebatur. 5°. Sæpenu-mero strangulatus intestinorum in hernia, quæ intestinalis proinde dicitur: hunc ipsum morbum facit, 6o. atque demum inter ejus causas inflammatio intestinorum merito recensetur.

*Art. 1504.* A nervorum obstructione affectionem hanc produci supra innui, nec immerito quidem, cum id ipsum in muliere amstelodamensi viri litterarum studiosi conjuge evenisse non dubitem, quæ postremo alvi omnimoda stypticitate, & continuo vomitu correpta, absque eo quod aut febre, aut dolore multo vexaretur his symptomatis confecta, brevi vitam cum morte commutavit. Bis etiam in cadaveribus vidisse recordor, intestina tunc a proprio munere desistere, cum ab induratis fœcibus obturarentur. Nec dubitare licet, ut tertio monui, morbum hunc interdum ab intrusione portionis cujusdam angustioris in latiore ejusdem intestini produci, cum bis publice id ipsum ostendissem, prima nempe vice in filio cujusdam Pistoris, altera in hominis cadavere, quando extractis intestinis eadem per longum aperui. Li dum inter vivos agebant, pluribus morbis obnoxii fuere, in primis vero torminibus quotidie una, vel altera hora a prandio recrudescentibus. Tertium hujus rei exemplum in cadavere iterum offendi, quod coram Cl. Viro D. *Joa-chimo Schradero* peritissimo Chirurgo fecavi.

*Que  
anotom-  
cis ra-  
tionibus  
proban-  
tur.*

Monui præterea hunc morbum a contractione intestinorum oriri, quod profecto inter secunda cadavera aliquando reperi, ubi eorum intestina adeo contracta occurrebant, ut vix minoris digiti extremitatem reciperent. Si ergo hoc in casu excrementa duritiem quamdam fubeant, & si retenti flatus exitum non nanciscantur, ut quid mirabimur inflammationem supervenire, & ex vehementia dolorum subito interimi?

*Van Schvieten sententiâ.*

*Ileum  
ab in-  
flam-  
matione  
febris  
præcedit.*

*Art. 1505.* Quam maxime attendendum est, ad signa, quæ inflammationem in hoc morbo præsentem docent, quæ satis evidentia sunt, ita ut peritus Medicus hic falli nequeat. Ubi ab inflammatione fit, tunc solet febris plerumque præcedere, quæ per horas aliquot tantum affligens in hunc morbum desinit, ut *Sydenhamus* optime notavit: idemque in pleuritide, angina, aliisque morbis inflammatoriis pariter observatum fuit; nempe febrim per aliquod tempus præcedere, & dein sequi inflammationem in hac illave parte corporis.

*In ileo  
convul-  
sivo fe-  
bris se-  
quitur  
inflam-  
matio-  
nem.*

*Art. 1506.* Ubi vero absque febre prægressa intestinorum convulsio sævos dolores produxerit, tunc inflammatione nata, febris sequitur. Simul tunc adsunt omnia illa symptomata, quæ & febrim acutam continuam, & inflammationem comitari solent; fitis nempe, calor, & reliqua; in primis vero debilitas summa. Verum omnia hæc symptomata adsunt in initio morbi, & cum subito in perniciem tendat, nisi succurratur illico, mutantur, & cito in contraria fere abeunt: calori magno succedit frigus, dolor cessat, pulsus antea durus, & fortis, fit debilis, intermittens, cœterimus tamen, quod optime *Areteus* notavit.

Adest



Adest quandoque tanta constrictio ani, ut clystma injici nequeat; quod symptoma pariter *Aræus* notavit, uti & *Hippocrates*.

*Art. 1507.* Ex his intelligi potest, quare in *Progn.* alio loco *Hippocratis* legatur: *At si remisso volvulo, febris illum prehenderit, desperatus est, fortassis enim etiam soluta alvus inferior interficiet.* Si enim a spasmo valido volvulus natus perstiterit diutius, sequitur inflammatio, quam febris comitatur quidem, sed cum citissime tunc soleat gangræna sequi, remittit, imo integre cessat dolor brevi, & tunc gangrænoso intestini affecti loco non amplius resistente contentis, illa per alvum ruunt, & moritur æger; non quidem ob hanc alvi evacuationem, sed ob gangrænam intestini.

*Art. 1508.* Si absque inflammatione, ut ait *Curatio.* *Aræus*, sed ob corruptionem aut validum frigus ileus provenerit, venæ sectione omissa, ad flatum evocandos cuminum, & ruta adhibeatur, simulque oleosa, & mollia externe ac interne usurpentur, non vero spiritus illi simplices vel compositi aromatici sp. vin. parati, quibus officinæ luxuriant, quia licet a solo spasmo absque inflammatione dolor abdominis oriatur, minime tutum est, audacter similia fumere, quia semper periculum est, nisi subito levent, quod pessime nocere possint. Licet enim ab inflammatione morbus non duxerit originem, convulsionem tamen intestinorum flatum creantem inflammatio facile sequi poterit. Longe tutius est leniora talia aromata remedia, ut semina quatuor calida majora, aut minora dicta in officinis, aquæ infusa dare; tunc enim vix nocebunt unquam. Verum ubi ex signis novimus inflammationem adesse, tunc etiam ab his abstinendum est.

Vidi octava hora jam lethalem ileum, dum sex uncias spiritus ex feminibus levistici destillati miser æger hauserat.

*Farrago sententiarum.*

*Colica  
ab Ileo  
differen-  
tia.*

*Art. 1509.* Hoc vitii genus omnium quæ intestinis insidiantur acutissimum est, & nisi resolvatur intra septimum diem occidit.

Magna Colicæ, & volvuli cognatio est, non parum tamen etiam differunt; colicæ enim natura præcipue in dolore consistit, & ad colicam satis est, insignis intestinorum dolor, etsi alia symptomata non adsint: Ilei vero in primis in defectu expulsionis per inferiora, & inverso naturæ ac facultatis expultricis in intestinismo. Licet enim vomitus in Colica accadat, tamen non ita violentus est in Colica, ut in Ileo, neque omnia alimenta, multo minus excrementa per os rejiciuntur, id quod Ileo accidit, in quo etiam clysteres, & glandes ano immissi superiora versus trahuntur, & per os rejiciuntur.

An in tenuibus, an vero in crassis intestinis, causa Ilei consistat, alii aliter sentiunt, verior est sententia plerumque in tenuibus consistere, quæ ob venarum copiam, & sanguinis abundantiam facilius inflammantur, & natura sua angustiora sunt. Quandoque tamen etiam crassis affectis hoc malum generari potest, cum causæ omnes, quæ ileum producant, etiam in crassis reperiri possint.

*Prognosis.*

*Art. 1510.* Etsi Ileus alius alio periculosior sit, exitialem tamen ut plurimum esse experientia constat, præsertim is, cui accedit vomitus materiæ fœculentæ; & ex hoc nulli evadunt. Qui periculum effugiunt, his vel causa fuit secum retentio, vel enterocèle, vel flatus exitum supra vel infra non inveniens.

*His.*



Iliaca passione laborantes alii celerius, alii tardius moriuntur; quibus ab inflammatione malum ortum ducit, intra quatuor dies moriuntur. Si alvi fluxus spontaneus superveniat, aut acuta febris æger brevi moritur. Facilis item est transitus Ilei in stranguriam, & vice versa. Si flatus multi, & foetidi pedendo erumpant, mors ostia pulsant. Minus periculi esse solet, ubi dolor locum mutat, quam ubi fixus una in sede consistit.

*Art. 1511.* In hoc morbo omnia purgantia e- *Remedia*  
tiam leniora per os exhibita fugiantur, quia *varia.*  
motum intestinorum inversum, atque adeo vomitum augere possunt; fugiantur quoque opiata, si suspicio inflammationis adsit, alias gangrænam, & sphacelum inferunt.

Paræus se multos ab Ileo desperatos ab imminente morte liberasse refert, haussis scilicet argenti vivi in aqua sola libris tribus. Tanta vero mercurii quantitas valde pertimescenda est; in casu igitur desperato satius est minorem quantitatem exhibere.

Hinc cautius præcipit *Meadius* aliis auxiliis nihil proficientibus, argentum vivum bibendum præbeatur libræ minimum pondo, quod repetere etiam plerumque opportunum erit; nam duplicem quidem usum hic præstat; partim pondere suo inversum intestinorum motum restituendo, partimque lubricitate excrementa alvi opplentia emolliendo, & deorsum propellendo. Idcirco diu tardare hoc experimentum non debet, quoniam metus est, ne, quod non raro fit, inflammationi superveniat gangræna, qua corruptis intestini tunicis, in abdomen effunditur ponderosum metallum.

## L U M B R I C I.

*Ægineta sententia.*

*Lumbricorum species.* *Art. 1512.* Tres sunt omnium lumbricorum differentia; una quidem tereti forma secundum crassitudinem est; altera vero latiore, unde latos nominant; tertia eorum quos ascaridas nuncupant.

*Art. 1513.* Lumbrici igitur teretes formam nemini obscuram continent, quoniam hi reliquis frequentiores sunt. Accidunt vero lumbricos teretes habentibus: morsus intestinorum, & ventriculi, tussis non magnæ, aridæ, & irritantes, quibusdam etiam singultus. Dormientes palpitant, & sine ratione experrecti eriguntur. Nonnulli cum vociferatione expurgiscuntur, sed rursus in soporem ruunt. Pulsus inæquales sunt, & augentur febres absque ordine, quæ cum extremarum partium algore ter quaterve interdum vel noctu præter rationem invadunt.

*Eorum diagnosi.* Infantes supervacue mandunt, & linguam temere exerunt, dentibus stridunt, oculis connivent, silentium amant, excitantibus indignantur, suffunduntur malæ rubore, atque rursus mutato colore livescunt, atque hæc quidem per exigua intervalla. Non paucis vero venter etiam multas esculentorum corruptiones excernit, atque tympani instar inflatur.

*Lati lumbrici signa.* *Art. 1514.* Latus lumbricus est intraneæ succingentis intestina membranæ, in corpus quoddam instar animalis mobile (ut ita dicam) permutatio, quod per partes interdum redditur, plerumque totum simul excernitur, incredibilem longitudinis speciem exhibens; dissolutus vero non coalescit. Comitatur eum, qui affectus est,



est, corporis gracilitas, pulsusque imbecillitas, cum inæqualitate: sed infallacissimum indicium est, si cum alvi excrementis quædam semini cucurbitæ similia excernantur. Abundat quandoque in non febrientibus, quandoque febricitantibus per diuturnas ægritudines accedit, continuos stomachi morsus inferens, appetitusque ad cibos intemperatos.

*Art. 1515.* Ascarides lumbricorum species *Ascar* sunt, vermibus persimiles, qui in extremo in- *dum si-* testini recti, & muscoli anum stringentis initio, *gna.* sphinctere Græcis appellato, consistunt, vehementem his partibus pruritus inferentes.

*Art. 1516.* In India etiam, regionibusque supra Ægyptum animalcula quædam viva lumbricis similia, dracontia ab animalis specie nuncupata, in musculosis corporis partibus, puta brachiis, cruribus, furis: in pueris etiam in lateribus sub cute consistunt, aperteque moventur. Deinde ubi diutius extremum aliquod dracontii remanserit, locus suppurat, & aperta cute foris progreditur. Dracontii principium si rahatur cruciatus excitat, maxime quando dirumpitur, *Soranus* autem non animal aliquod precipuum; sed nervuli alicujus substantiam dracontium esse autumat, opinionem dumtaxat animais, eo quod moveatur, inducentis.

*Dracunculorum descriptio.*

### *Sennerti sententia.*

*Art. 1517.* Lumbricorum tres sunt species frequentiores, viz. *teretes* sive *rotundi*, *lati*, & *ascarides* (ex ovis insectorum oriuntur); aliquando sed rarius vermes anomali ejiciuntur, cornuti scilicet, hirsuti, quadrupedes, multipedes, bicipites, tricipites; cauda bifurcata præditi, &c.

„ Præter vermes intestinales, sunt & alii, omnes

*Vermium species varia.*

*Vermes* „ fere corporis partes incolentes , uti vermes  
*in variis* „ *dentales* , *gingivales* , *rhinarii* , *pulmonarii* , *car-*  
*corporis* „ *diaci* , *sanguinarii* , *urinarii* , *cutanei* , *umbili-*  
*partibus.* „ *cales* , *helcophagi* , vermes in *hepate* , in *saliva* ,  
 „ &c. Sed hi omnes non nisi in statu morbido  
 „ inveniuntur.

*Teretes.* *Art. 1518.* „ Lumbrici teretes sunt frequen-  
 „ tissimi & satis noti , Lumbricis terrestribus si-  
 „ miles , nisi aliquantum albidiores sint.

*Lumbrici lati* „ Lumbricus latus , tania a *Plinio* , *Pla-*  
*descri.* „ *tero* , &c. appellatus , est inftar fascie dua-  
*ptio.* „ rum vel trium ulnarum , aliquando longior  
 „ geniculis transversis per totum divisus . *Ni-*  
 „ *colaus Andry* affirmat unum esse tantum in  
 „ corpore , unde *solum* appellatur . At *Mr. Ha-*  
 „ *geunot* taniam in ventriculo felis aliamque in  
 „ duodeno reperit . *Memoir. de l'Acad. Vol. xvii.*  
 „ *p. 484.* Et *Mr. Geoffroy* taniam in tinca pisce  
 „ duos pedes & amplius longam observavit .  
 „ *Hist. de l'Acad. Vol. xiv. p. 50.* hunc Lumbrici-  
 „ cum in cane ipse vidi tres circiter pedes lon-  
 „ gum ; ideoque in aliis animantibus præter ho-  
 „ minibus generatur.

*Latus* „ *Art. 1519.* Latos Lumbricos qui habent , a-  
*lumbrici* „ petentia cibi nimia laborant , ac nisi cibis offe-  
*gna.* „ ratur , dolor & morsus in ventre percipiuntur ,  
 „ &c. Certissimum vero signum est , quod cum  
 „ alvi excrementis corpuscula quædam cucurbitæ  
 „ seminibus similia excernuntur . Hi difficulter  
 „ necantur ; commendatur *rad. filicis* ad *℥j.* &  
 „ decoctum *corticis rad. mori.*

*Remedia* „ *Art. 1520.* Ad latos Lumbricos educendos ad-  
*ad lum-* „ hiberi debet vomitus ex oleo , non ex radicibus ,  
*bricum* „ & alia die clystere utendum admixta ni-  
*latum.* „ tri parte vel salis ; danda etiam aqua sassa po-  
 „ tui , aut *glycyrrhiza radicis* decoctio , aut si-  
 „ militer incocta *glycyrrhiza.*

*Art.*



Art. 1521. „ Ascarides sunt tenues Lumbrici, *Ascarides.*  
 „ filorum particulas referente, qui in parte in-  
 „ feriori crassorum intestinorum, & juxta sphin-  
 „ cterem musculum residere solent.

Art. 1522. „ Signum pathognomonicum *asca-* *Remedia*  
 „ *ridum* est pruritus in ano vix tolerabilis; æ- *singula-*  
 „ grotantes aliquando *syncopen* patiuntur, & fre-  
 „ quentissime *tenesmum*. Ad *ascarides* facit ex-  
 „ perimentum Aetii, suppositorium scilicet for-  
 „ matum e *carno veteri salita*, pinguedine da-  
 „ rafa.

### Fulleri sententia.

Art. 1523. Ascarides sunt quidem gens pusilla, sed expugnata difficillima; namque licet omnes ad unum enematis vi exterminarentur, nova tamen & numerosa proles ab ovulis in recto depositis mox nascetur. Ideoque non tanti erit parentes solos proscripsisse; nisi insuper & natos, & semina etiam ipsa radicitus extirpentur, & ejiciantur. Hocque optime fiet, si postquam ascarides jam disparuerunt, non statim a remediis abstinamus; sed tertius quartive diebus per aliquot vices; ac deinde semel in hebdomada hujusmodi deturbantia enemata repetamus; quod nemo authorum hactenus notavit. Ideo minime dubitandum est *enema amarum* seq. *℞. Rad. ser-* *Enema*  
*pent. virg. contus. ʒj. pulp. colocynth. (in nodulo li-* *amarum.*  
*gat.) ʒj. herb. tanacet. summit. sabin. ana Mʒ. coq.*  
*in aq. font. p. s. ad ʒvj. colatur. add. ol. hyperic. ʒss.*  
*ol. absynth. chym. ʒss. spec. hier. pier. ʒss. m. singu-*  
 lis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, ascarides interrempturum, exterminaturum, & funditus deleturum prodesse.

Art. 1524. „ A Lumbricis vomitus, cardial- *Sympto-*  
 „ gia, syncopa, singultus, vocis privatio, tor- *mata a*  
 „ mina *lumbri-*  
 „ cis.

„mina intestinorum, capitis dolores, sopor gra-  
 „vis, deliria, moeror, tristitia, febres, angi-  
 „na, pleuritis, & alia innumera gravia sym-  
 „ptomata.

*Remedia* *Art. 1525.* „In genere amara fere omnia sunt  
*vermifu-* „*vermifuga.* Privatim pulv. cort. aurant. mercu-  
*ga varia.* „*rialia, Æthiop. min. merc. dulc. &c. muscus coral-*  
 „*lin. ens veneris, semen Santonici* in vino cla-  
 „reto est anthelminthicum insigne. *Floyer.* De-  
 „crescente luna vermes sunt aggrediendi. *Pulv.*  
 „*colocynthid. cum felle bovin. subact. cum gut.*  
 „aliquot *ol. absynthii* umbilico applicatus, Lum-  
 „bricos pellit. Ad *ascarides* necandos enemata  
 „cum *colocynthid. incoct. mercurialia, &c.*

### Baglioli Sententia.

*Vermes* *Art. 1526.* Quod ut plurimum homines ex  
*anomala* improvise, & sine ulla causa manifesta, & signis  
*& insoli-* alios morbos comitantibus, in subitum vitæ di-  
*ta sym-* scrimen incidunt, & cadunt veluti *apoplectici*  
*ptomata* cum extremitatibus frigidis, pulsu exilissimo (qui  
*sape pa-* fere semper signum est vermium latentium uti  
*riunt.* & singultus) aphonia, quandoque improvisa ma-  
 „nia, tunc de vermibus dubitandum, in tali ca-  
 „su nil potentius est, quam statim dare cum bro-  
 „dio gr. xij. *merc. dulc. & gr. v. scammon. sulphurat.*  
 „in adultis. In pueris vero minoretur dosis, vel  
 „potius detur *mercurius crudus* ad magnitudinem  
 „pisi cum brodio, nam erit ad miraculum. *Che-*  
*sneau.*

*Nota* *Art. 1527.* „Probe notandum est, quod nul-  
*lene.* „lum tam peregrinum sit symptoma, tamque  
 „*Διμωμιασόν*, quod vermes excitare non possint.  
 „Horrenda quidem symptomata quandoque a  
 „vermibus exoriuntur, ut non raro ex incan-  
 „tatione produci vulgo credantur. Periti me-  
 „dici



„ dici multa adstantium admiratione cacodæmo-  
 „ na non raro ejiciunt.

Art. 1528. „ In praxi quotidiana horrenda *Ex vom-*  
 „ hujusmodi symptomata a vermibus excitata *mibus*  
 „ vidimus. Homo quinquagenarius subito in *epilepsia*  
 „ gravissimam *epilepsiam* lapsus est, & intra de- *mania*  
 „ cem dies sex vel octo violentissimos insultus *moria*.  
 „ cum horrendis spasminis passus est; deinde in  
 „ *maniam* incidit per diem unam aut alteram,  
 „ & postremo in *moriam* & fere omnium rerum  
 „ *oblivionem*. Die 16. Lumbricum mortuum ex-  
 „ crevit, & sensim pristinam sanitatem nactus  
 „ est, nisi quod *memoriam* nunc biennio post  
 „ nondum integre recuperavit.

Art. 1529. „ Adolescentula quædam febre ver- *Cacitas*.  
 „ minosa laborans stupendis motibus convulsivis  
 „ correpta est, unde *visum* penitus amisit, &  
 „ luce orbata ad quatrimum mansit, interim a  
 „ spasminis fere libera; die 5. alius paroxysmus  
 „ convulsivus supervenit, & acies oculorum re-  
 „ stituitur. Exhibita erant medicamenta antif-  
 „ spasmodica, & præcipue anthelminthica, Æ-  
 „ thiop. mineral. & calomel. &c. Vermes com-  
 „ minuti & contriti excreti fuerunt, & puella  
 „ convalescebat.

Art. 1530. „ Alia puella ex Lumbricis inte- *Obmute-*  
 „ stina incolentibus primo raucescit, & febre *scentia*.  
 „ acutissima laborabat; post paucos dies vocem  
 „ penitus amisit, & ad dies aliquot muta reman-  
 „ sit; & cum omnia symptomata mortem in  
 „ propinquo esse monstrabant, aliis vermifugis  
 „ minus succurrentibus, exhibui *decoctum folio-*  
 „ *rum hellebori nigri* fere in ipso articulo mor-  
 „ tis; vermes quamplurimos excrevit, & con-  
 „ valuit. Ejusdem remedii ope plures, qui in  
 „ extremo vitæ discrimine fuerunt versati, re-  
 „ stitutos vidi; & longa experientia didisci hel-  
 „ lebo-

leborum nigrum optimum esse & certissimum  
; vermifugum in tota pharmacorum familia.

*Lumbrici* Art. 1531. Ex Historia Medica abunde constat  
*cus um-* Lumbricos nonnumquam ventriculum, intesti-  
*bilisalis.* na, hypochondria atque inguina perforare & fo-  
ras prorepere. Plusquam viginti abhinc annos  
ex umbilico pueri octennis exulcerato *Lumbrici-*  
*um teretem* 6. vel 7. digitos longum propriis  
manibus evulsi; post Lumbricum coch. j. vel ij.  
*puris flavi* effluxerunt, quod excrementa alvina  
non olebat. Ulcus non tenere sanandum esse  
judicavi; ideoque foramini turundam adaptari  
jussi; ut materia purulenta quotidie evacuaretur;  
per septimanam & diutius pus ubertim ef-  
fluebat, sed indies minori quantitate; deinde  
post triginta dies sine ullo incommodo ulcus  
exsiccatum est, & puer integre restitutus. Ut-  
cunque tamen proximo anno in *ascitem* lapsus  
est, a qua causa nescio; ex hoc etiam morbo  
remediis appropriatis illum feliciter liberavi, &  
etiamnum sanus ac vegetus vivit.

*Lumbrici* Art. 1532. Fœmina quadraginta quinque an-  
*ci ex in-* nos nata, robusta, & laboribus assueta, dolore  
*guine* colico quandoque obnoxia; alias sana; circa qua-  
*prodeun-* tuordecim abhinc annos tumorem habuit in in-  
*tes.* *guine sinistro*, ovum gallinæ æquantem; quem  
*herniam* esse ipsa credebat; durabat enim inte-  
grum annum ante disruptionem. Interea circa  
dictam periodum fœmina *ileo* correpta est, de  
quo alibi infra, a cujus morbi cruciatibus  
ac immani vomitione, &c. ruptus est *tumor in*  
*inguine*, & effluxit tenuis humor flavescens, tur-  
pethi mineralis colorem æmulans: advocatus est  
chirurgus, qui stylo immisso largam cavitatem  
detexit; foramen sensim spongia præparata di-  
latatum est, & magna vis prædicti humoris in-  
dies evacuatur; die 10. in foramine apparuit

*Lum-*



*Lumbricus vivus*, quem chirurgus coram astantibus detraxit, figura, colore, & magnitudine *Lumbricis* intestinalibus omnino similem. Post duas vel tres septimanas eductus est *alius Lumbricus* priori non dissimilis, nisi quod aliquanto rubicundior esset. Vermifuga interne propinabantur, & decocta *anthelmintica ex fol. hellebor. nigr. aloe, sem. sanctonic. &c.* in ulcus sinuosum injecta fuerunt. Tribus circiter mensibus sanatum est ulcus, & mulier, adhuc viva, ex illo tempore bene se habuit.

*Art. 1533.* Si quis de *Lumbricis umbilicalibus* & *inguinalibus* plura velit, *Schenckium* adeat, *Observ. p. 408. 409.* item, *Bonetum*, p. 631. *Inguinalium* recentiora exempla habemus apud *D. Merton Hist. Natural. Northamptonia*, p. 467.

### *Farrago sententiarum.*

*Art. 1534.* Ex *lumbricis teretes*, & *ascarides* *Lumbrici* pueros, lati, qui omnium pessimi, adultos maxime infestant. Lati autem descriptionem additis etiam iconibus omnium accuratissime tradidit Vir Doctissimus *Daniel Clericus Hist. Nat. & Med. latorum lumbric. Geneva 1715.* Ex illo excerpta sunt, quæ sequuntur, & primo quidem hunc non unicum esse vermem; sed plurium vermiculorum catenam, ex illo genere quod cucurbitinos vocant, continuata serie aliorum aliis adnexorum, manifesto apparet. Hi autem digiti latitudinem habentes interdum singuli ac separati in intestinis jacent, & per alvum excernuntur. Totus denique vermis conjunctus unum caput sortitur, idque satis acutum, rostro haud absimile; quo intestinis infixio valde pertinaciter illic hæret, ore pro nutrimento chylum sugens. Sed hac de re adeatur *Lancisus*.

*Art.*

Singula-  
re ad la-  
tum lum-  
bricum  
remediū.

Art. 1535. Propriam autem curationem desiderare lumbricum latum observat *Meadius*, qui jam a multis annis sequens remedium efficacissimum esse comperiit. Stannum rasum cum æquali portione coralli rubri in pulverem subtilissimum teritur; hujus drachma una, cum conserva summitatum absynthii maritimi in bolum redacta bis die devoranda est.

Dracon-  
tii enar-  
ratio.

Art. 1536. Dracontium de quo ex *Sorano* dubitare vidimus supra *Æginetam*: an potius nervulus sit quam vermis, testatur modo laudatus *Cl. Meadius* vermem revera esse, in *Æthiopia*, *Africa*, & *India* frequentem. Est autem insectum aquaticum; quod acuto capite, & exili corpore, hominum membris, cruribus præsertim, inter lavandum se insinuat; & exiguum primo, membranas musculorum humidas depastum, majus fit, & longius; mox rodendo cutim inflammationem cum humore excitat, quo suppurante, caput exerit animalculum; duos sæpe, aut tres, interdum & plures pedes longum. Mihi enim, inquit, in nosocomio hujusmodi casum intueri licuit in Nauta quodam ab *Africa* reverso.

Vermi-  
um cor-  
poris spo-  
cies va-  
ria.

Art. 1537. Corporis humani vermes, ait *D. Andry*, si eos excipias qui in stomacho, & intestinis generantur, vulgo in decem classes partiuntur: videlicet in *Encephalos* quorum, qui in cerebro sunt *Encephali* proprie dicuntur, qui in naribus *Rhinarii*, in auribus *Auriculares*, & in dentibus *Dentarii*; in *Pulmonares* quorum alii muscarum figuram habent juxta *Avenzoar*; & *Alfaharavium*, alii figuram strobili juxta observationes *Thomæ a Vega*, alii demum cimicibus similes sunt, ut *Joachim Camerarius* in *Schenckio* observat; in *Hepaticos* qui secundum *Hartmannum* præcipue in hydropicis occurrunt, in *Cordia*.



*diales* non tam in cordis ventriculis, quam in ejus pericardio degentes; in *Sanguineos*, qui fecta vena non raro erumpunt; ut *Rhodius*, *Riolanus* & *Etmullerus* alique memorant; & foliorum myrthi speciem referunt; in *Vesiculares* una cum urina prodeuntes limacis formam, vel lumbricorum, vel millepedum gerentes: ut ex *Tulpio*, *Ambrosio Pareo*, & *Dureto*; in *Spermaticos* nisi microscopio conspicuos; in Helcophagos exilissimos; qui in ulceribus tumoribus, & apostematibus generantur: ut in Variolis ex *Borello*; & in Gangranis ex *Hauptmanno*, & *Kirker*; in Cutaneos quorum alii ex capillorum similitudine *Crinones* dicuntur, alii instar Acari exiles *Cirones*; alii *Dracunculi*, qui nisi in Africa, Ethiopia, atque India occurrunt, alii demum *Toms* dicti, in America tantum obvi; atque in *Umbilicales* denique, qui circa umbilicum in pueris hospitantur. At præter hujusmodi vermes alia dantur insecta, quæ subinde circa palpebras congregantur & ophtalmiam producunt; ut ex sequenti observatione innotescit. Intolerabili oculorum pruritu conquerebatur Puella, quos etiam rubentes inflammatosque gerebat. Plurimis in cassum tentatis remediis, quidam ei adhibendum proposuit ovi ad duritiem cocti vitellum; ut tepidum sibi oculis applicaret; quod ubi fecisset; plurimis a palpebris insectulis lentium figuram referentibus tali modo elicitis, liberata est.

*Art. 1538.* In *Eruditorum Diario h. e. Journal des Sçavans* die 20. Maii 1675. casus refertur Juvenulæ 22. vel 23. annorum natæ; quæ cum in Porticu Gymnasii Medici Parisiis *D. Perrault* convenisset, ut morbi quo diu vexabatur consilium peteret; narravit ei se duobus ab illinc annis vomitu vermium exerceri; quo.

quotidie eadem hora regulariter magnis convulsionibus corripiente, atque jam jam hora qua loquebatur accessus tempus instare. His dictis manibus tam fortiter adstantem quemdamprehendit, ut per horæ quadrantem, quo convulsio duravit, non reliquerit, tandem plurima aqua vomitu redita in qua 28. vel 30. vermes hyrudinum formam gerentes innatabant viventes admodum alacresque, liberata est. Differabant autem ab hirudinibus hi vermes hoc unq, quod albescente colore notabantur. Additum fuit puellam hancolim vomitu plus quam centum eorundem vermium ejecisse. Duobus ex his vermibus, a D. *Parrault* in lignea pixyde inditis post horam eosdem vivos reperiit, cognovitque rostrum in lignum infigisse, ut sibi exitum pararent, extractis autem, & solis radio expositis calore parto validiores mobiliorefque fieri videbantur. Quamobrem habita consideratione a calore hos vermes roborari, remediaque ad eorum expulsionem adhibita amara, vel purgantia fuisse, atque proinde calida, in consilium venit, ut experiretur: an frigus eosdem proportionaliter infirmaret. Hinc frigida aqua super eos affusa, dum plurima agilitate celeritateque moverentur, cum cognitum fuerit quod illico moriebantur plurima inde habita fuerunt experimenta, quibus ratum habebatur frigidam, aquam, sed validius ipsam glaciem eos, qui a vermibus excruciantur, efficaciter subvenire.

*Vermis  
lati seu  
genia ve-  
ror de-  
scriptio.*

*Art. 1539.* Negligenda quidem non est quoad vermem tænia præmemorata *Lancisii* observatio, & sententia, qui sane nec vermen esse nec vermiculorum aggregatum seu geniculatam cohesionem ut *Danieli Clerico*, aliisque visum est, sed mucosam tantum inorganicam substantiam de polyporum genere: ut apertissime in dis-

ser-



sertatione sua de triplici intestinorum polypo , & in Epistolis ad *Blanchardum* , *Morgagnum* , & *Vallisnerium* demonstrat. Quam quidem *Lancisii* sententiam ex observato tænia in muliere, cum exacta iudicii lance ponderavit vir in Medicis experientissimus *Antonius Pujati* in Patavino lyceo P.P. Medicinæ Practicæ hæc subiungit : Ita *Lancisius* ratione optima , polypos intestinales, quia in intestinis genitæ essent, concretiones eas vocavit, quas antea vellatos vermes, vel membranas simpliciter, ac frusta membranosa vocaverunt veteres. Neque enim ille primus corpora quædam e podice excreta, compressa, lata, & oblonga, aliquando cava, latum vermem non esse cognovit; cum *Platerus* ante ipsum ea animata esse negaverit, & fascias membranas ex chylo genitas asseruerit. *Jonstonus* etiam aliquando pro verme tænia, membranosam fasciam, cucurbitinos inclusos habentem, cognovit. *Lancisii* igitur, aliorumque Cl. Virorum, qui post ipsum tales concretiones polypeas vocare solent, exemplo (& auctoritate fretus, quam mulier excrevit, polyposam ipse quoque voco; quæ cum meo iudicio intra ventriculum genita sit, polypi ventriculi nomine, indigare non dubito.

*Art. 1540.* Contra intestinorum vermes sequen- *Remedia*  
tes globuli celebrantur. ʒ. Aloes subtiliss. pulv. *varia.*  
unc. sem. colocynthid. pulv. & spir. vol. sal. armon.  
insper. inde exsiccat. ʒj. scammon. ʒj. f. syrup. absynth. q. s. m. f. massa cujus dosis a gr. 24. usque ad 48.

*Amatus Lusitanus* primum & præcipuum contra vermes remedium semen santonici saccharo incrustatum habet, licet non desint, qui exinde potius oriri vermes autument. *Borellus* au-

tem seminis fantonici essentiam umbilico applicatam commendat.

Apud *Schenckium* efficacissimum dicitur semen tanacetum ex syrupo violarum, addendam vero consulit *Hoeferus* radicem primulae veris.

*Bartholinus* nihil vino, & spiritu vini ad lumbricos enecandos praestantius esse, ait, quod experimento confirmatum vidit eruditissimus *Redius*.

At omnibus palmam praeripit Mercurius tum crudus, tum diversimode praeparatus. Crudus exhibetur ab *Hartmanno* ad ℥j. alteratus tamen, domitus, & coercitus cum succo mali limonii, postea commixtus cum semuncia conditurae rosarum persicarum, & modico fl. benzoini, & *Baricellus* cum saccharo tubro illum praeparat in mortario vitreo, commiscetque ol. amygdal. dulc. gutt. aliquot, & ex sacchar. viol. vel ros. exhibet a ℥j. ad ℥j. *Riverius* vero curatos multos narrat usu Mercurii dulcis ad gr. vj. viij. & xij. cum pari, vel subdupla dosi diagridii vapore sulphuris correcti: confirmatque id ipsum *Simeon Jacot.* & *Cardilacius*.

Utuntur alii aqua, in qua stamnum ignitum pluries extinctum sit.

At de his, quae haecenus credita sunt adversus lumbricos antidota efficacissima, dubitandi ansam praebuit diligentissimus *Redius*, eo quod illis non adeo adversari, expertus est; saccharum vero, & mel, quae unanimi Medicorum consensu vermibus amica putantur, deprehendit, eisdem esse summe nocua, & mortifera.



## C A P U T VII.

*Sive Fasciculus Morborum septimus.*

## D I A B E T E S.

*Areteæ sententia.*

*Art. 1541.* Diabetes qui vocatur affectus, mi- *Diabe-*  
 raculum quoddam est, haud ita sæpe homini- *tis de-*  
 bus usitatum, carniū videlicet, ac membro- *scriptio.*  
 rum in urinam colliquatio. Neque enim hujus-  
 modi ægotantes cum intermissione lotium red-  
 dunt, sed perinde atque canales laxati sint, in-  
 desinens est profusio. Diuturna est hujus mor-  
 bi creatio, & longo tempore parturitur: velox  
 autem est colliquatio, & festina interdum mors  
 advenit, & vita fœda est, ac vexata doloribus.

Sitis intoleranda est, potusque copiosus; mul-  
 titudini tamen lotii non respondens: copiosius  
 enim lotium redditur, neque eos quisque aut  
 a potu, aut a mictu inhibere potest. Quod si tan-  
 tillum inhibeatur potus, os ficcatur, corpus are-  
 scit, viscera conflagrari videntur, omnia ægri  
 fastidiunt, de omnibus dubitant, & ardentissi-  
 ma siti haud multo post vita orbantur. Sin au-  
 tem vel parum temporis a menjendo abstinue-  
 rint, intumescunt eis lumbi, testes, & ilia, &  
 cum remiserint lotium, calefactione profundun-  
 tur, & tumidæ partes detumescunt.

Quando hic morbus futurus est, os humore  
 privatur, saliva est albida, spumans, perinde ac  
 in siti: nondum tamen sitiunt. Præcordia gra-

via sunt, calorem, aut frigus a ventre in vesicam tendere sentiunt; Prout adventans morbus progreditur, tum etiam paulo plus lotii, quam moris erat, effunditur; sitis adest, sed nondum vehemens. Cumque amplius incrementum accipit calefactio parva quidem, sed mordax visceribus inhærens exoritur, abdomen fit rugosum, venæ extant, totus corporis habitus gracilescit, urinæ profluunt, & sitis augetur.

*Ejus causa & sympto- mata varia.* *Art. 1542.* Hujusce morbi causa aliquis acutus morbus esse potest, haud incredibile est, etiam aliquod perniciosum venenum ex iis, quæ vesicam, & renes infestant, huic affectui causam præbuisset. A Dipsace morsum talis affectus consequitur. Dipsas enim reptilis fera, si quem percusserit, sitim non ferendam accendit, isque copiose bibit. Adeo inextinguibilis est, bibendi cupiditas, ut potu non medeatur; sed in ventrem humor obruit. Si quis ob ventris distentionem doleat, graveturque humoris copia, & ideo paululum temporis a potu abstineat; iterum sitiens largissime bibit. Alii præterea sunt, qui lotium non reddunt, nec alia via, quod bibunt, emittunt, quare insatiabili bibendi aviditate humore inundante, ventreque distendente, repente, & penitus disrumpuntur. Ab hoc autore *Listerum* hausisse diabetis descriptionem ex sequentibus notum est.

### *Listeri sententia.*

*Diabetis historia.* *Art. 1543.* Diuturna est hujus morbi creatio, & longo tempore parturitur. In principio os humore privatur, saliva albida est ac spumans, paulo plus lotii, quam moris erat, effun-



effunditur; sitis adest, sed nondum vehemens, calefactio parva quidem, sed mordax, visceribus inhærens, exoritur; habitus corporis gracilis evadit, & homo anxius & animi dubius existit; progressu temporis sitis insigniter augetur, & velox est carniū & membrorum in urinam colliquatio; neque enim cum intermissione lotium reddit, sed, perinde atque canales laxati sint, indefinens est profusio; sitis intolerabilis est, potus copiosus, multitudini tamen lotii non respondens; si parvum tempus a meiando abstinuerit, intumescunt lumbi, testes, & ilia; postremo cum dolore meit, & festina mors adventura est. Urinæ quidem gustus lenis, & minime, quantum memini, dulcis, paulatim tamen dulcescere in confesso est, quod primum aquosior feri pars effunditur, & postea ipsa feri pars chylosior: huic autem rei fidem facit, nempe, *phthisicorum* plurimorum ultimis mensibus insignis sputi dulcedo, ad nauseam usque molesta (lac etiam muliebre, a chylo parvulum discrepans, dulcescit.)

*Art. 1544. Conveniunt amygdalata & lactici-  
nia. ,, Affert exemplum cujusdam ex hoc affe-  
,, ctu suo consilio curati, bibendo vinum cum  
,, zinzibere coctum quantum & quoties pro vi-  
,, ribus potuit, concesso interim haustulo ex aq.  
,, lactis ad sitim leniter temperandam.*

### *Ettmulleri sententia.*

*Art. 1545. In Diabete urina quantitate nimis Morbi  
copiosa excernitur, cum siti intensa, debilitate descri-  
virium; macie; febre continua lenta; ardore ptis.  
circa regionem lumbarem; verbo; symptoma-  
tis hectica confirmata; interdum cum urina pin-  
gue aliquid excernitur; & tandem ut plurimum*

mors subsequi solet. Sed hæc est *Diabetes notha*.

*Diabetes vera.* Art. 1546. *Diabetes vera* est immutata ingesta-  
rum potulentorum per urinam excretio, *cæliaca* & *lienteria* similis: In hac specie potulenta redduntur parum mutata quoad colorem, odorem, saporem, &c. sic vinum rubrum mingitur, &c. Exempla hujus sunt rariora.

*Alia species.* Art. 1547. Est & *alia species* Diabetis, quæ *cæliaca urinæ* appellari potest, nempe quando *chylus* cum urina aut loco urinæ prodit.

*Prognosis.* Art. 1548. Urina vulgo Diabete laborantium admodum dulcescit; est periculosum malum, & sæpe lethale; post immodicum laborem, nimiam venerem, chronicas febres, plerumque incurabile; „ ut etiam quando a prava & diuturna „ consuetudine liquorum spirituosorum ingurgitationis originem duxerit.

*Curatio.* Art. 1549. Quoad curam temperanda est sanguinis acrimonia: in plurimis convenit cum cura *febris hæctica*; inchoanda est cura cum vomitorio, deinde exhiberi potest *antihectic. Poterii, lapis hamatit. sacchar. saturn. croc. mart. aluminata, trochisc. de carabe, terr. sigillat. opiatum* horum somni; præ reliquis *aq. calc. lac chalybeatum, emulsiones, &c.* Ad Diabetem veram astringentia, *martialia*, privatim decoctum *cort. aurant.*

### Vuillisi sententia.

*Morbus apud antiquos rarissimus.* Art. 1550. Diabetes apud antiquos fuit morbus rarissimus; at nunc dierum magis familiaris; habet sitim continuam, atque febrem lentam & quasi hæcticam semper conjunctam. Novi quemdam vino Rhenano pro potu ordinario per viginti dies usum, Diabetem incurabilem contraxisse.

Art.



*Art. 1551.* Pauci aut nulli ab *astrigentibus* *Curatio.*  
curantur. Sæpius in hoc morbo *tincturam anti-*  
*monii* cum bono successu præscripsi, atque *aq-*  
*solutionis calcis viv. cum sassafr. sem. anisi, passu-*  
*lis, liquirit. &c.* Ego, & D. Michelthovait & *Vvi-*  
*therly* pro quodam comite sic præscripsimus;  
*℥. Summit. arboris cupress. M. viij. alb. ovar. ℞ij.*  
*cinnam. ℥ss. lact. ℞viij.* distillantur, &c. bibat æger  
*℥vj. ter. in die. ℥. Gum. Arab. tragacanth. ana*  
*℥vj. sacchar. penid. ℥j. f. pulv. dos. ℥j. vel ℥ss.* bis  
in die cum *aqua distillat.* haustum *paregoricum*  
omni nocte; diætam fere tantum ex lacte. Ho-  
rum usu indies melius habuit, & intra mensem  
sanatus est.

*Art. 1552.* „ Fœmina quinquagenaria plenio- *Diabetes*  
*& salivatio.*  
„ ris temperamenti *Diabete & salivatione*, nunc  
„ hac, nunc illa, utroque morbo alternatim in-  
„ vadente, tamdiu laborabat, donec vires fere  
„ exhaustæ fuerunt. Infusum rhabarbari in vino  
„ Canariensi quotidie capiendum iussi, & post  
„ paucos dies dosis decoct. catechu composuit.  
„ *Fulleri*, omni nocte propinata fuit, & pro  
„ potu ordinario *vinum Florentinum cum aqua*  
„ *Bristolensi dilutum* potavit, atque ita duobus  
„ vel tribus septimanis ab utroque malo penitus  
„ liberata est, & plures annos incolumis vixit.

### *Sydenhami sententia.*

*Art. 1553.* Succi sanguini illati per vias uri- *Morbu-*  
*adum-*  
*bratus.*  
narias crudi & incocti exitum sibi quærunt; un-  
de sensim labefactantur vires, colliquescit cor-  
pus & quasi substantia ejus per hanc cloacam  
exinanitur, cum siti, ardore viscerum, lumbo-  
rum coxarumque intumescencia, & salivæ spu-  
mosæ exspuitione crebra.

*Art. 1554.* Eadem præscribenda sunt, quæ in *Curatio*

*fluore albo*, omiffis solummodo *venæfectione* & *catharfi*: nam utrobique *indicationes curativæ* sunt eadem, quantumcunque inter se hi duo morbi diffidere videantur.

*Harrisii Sententia.*

*Curatio singularis.* **Art. 1555.** Cogitationi clarissimi authoris subiit *diarrhœam* esse quasi *diabeten alvi*, & *diabeten renum diarrhœam*; ideoque scælici cum successu pro diabete laboranti hunc in modum præscripsit. *℞. Rhei elect. ʒß. Santal. alb. citr. ana ʒj. cardamom. minor. ʒß.* infunde lento igne vase clauso in *vin. Canarin.* ℞j. sumpsit æger hujus vini colati coch. vj. hora 6<sup>ta</sup> matutin. atque tantumdem repetebat hora 10<sup>ta</sup> ante merid. ab illo meridie usque ad 10<sup>am</sup> vespertinam. Diabetes penitus sistebatur, sitis desiit, &c. (sed hujus rei hoc unicum habet exemplum.)

*Meadii Sententia.*

*Singulare ad diabetem remediū.* **Art. 1556.** Nimiam urinæ saporis, odoris, & coloris mellei profusionem *diabeten* dictam, non renum esse, ut vulgus medicorum existimat, sed jecinoris morbum indicibus certissimis jamdudum demonstravi *Mechanical account of poisons. Essay 1. edit. 4.* Nolo cramben bis coctam apponere; & ea, quæ satis, ut opinor, prolixè proposui, repetere. Unicum tantum illis, quæ de cura ibi dicta sunt, remedium adjungam, h. e. serum aluminatum, quod ex lactis paululum cocti libris quatuor, & aluminis drachmis tribus conficitur. Si hujus enim quarta libræ pars ter minimum die bibatur, ad profluvium illud sistendum plurimum valet.

*Diabetis causa.* **Art. 1557.** Si quis autem quærat, unde tanta hu-



ta humoris copia in hoc morbo laborantibus suppeditari possit: Facili sane experimento comperimus, corpora quædam interdum imbibere, & ad se trahere ex aere humidum, quo cum moles, tum pondus eorum augeatur. Ita sal tartari udo aeri expositus in tantum crescit, ut libra una rite calcinata ad libras decem exurgat. Quidni igitur dicamus, ex sphaera vaporum nos ambiente nonnullos eorum corpus ad illos recipiendos aptum intrare, qui humori aqueo in renes derivando conjuncti copiam ejus accumulent? Quapropter cum frigidus, ac humidus aer hoc malo affectis minime conveniat; calidum certe, & siccum si liceat, eos petere oportet.

*Art. 1558.* Rationem autem hinc reddere lubet, qui factum fuerit, ut apud antiquos tam raro occurreret hic morbus, ut illum bis tantum se vidisse referat Galenus. Id igitur ex more vivendi; quo utebantur, nostro multum dissimili, provenisse autumo. Illos enim hoc malum maxime corripere dixi, qui inertes ac desidiosi vitam agunt; & luxuria assidue diffuentes, postquam vino meraciori sanguinem & humores accenderint, frigidis potionibus intempestive sitim restringere solent. Veteres autem, licet plus satis vinosi, prudentiores tamen hac in re sibi cavebant; & inflati venas mero paulatim ad temperantiam redibant, sensim corpus refrigerantes, calidisque, aut saltem egelidis liquoribus sitim compescentes.

*Quos  
morbus  
corripit.*

### *Farrago sententiarum:*

*Art. 1559.* Cum recens est, curari interdum potest Diabetes, cum in vetustatem incidit nunquam potest. Semper est Diabete laborantium *Vulgaris diabetis species.*  
uri-

urina aquea , & subpallida , nec omnino coloratior , quamvis vinum rubrum potarint .

*Species  
altera  
rarior.*

*Art. 1560. Riverius* diabeten, quod sit immutata ingestorum potulentorum per urinam excretio Coeliacæ, & Lienteriæ similis. In hac specie potulenta redduntur parum mutata, quoad colorem, odorem, saporem, &c. Sic vinum rubrum mingitur; sed exempla hujusmodi ratiore sunt.

Admirabile sane, aliquid habet hic morbus; nam eo laborantes multo plus mingunt, quam bibunt, aut alimenti liquidi assumunt; quod autem Authores potum, aut parum, aut nihil immutatum reddi afferunt, a vero longissime distat.

*Diabetis  
tertia  
species.*

*Art. 1561.* Est & alia species Diabetis, quæ coeliaca urinalis appellari potest, nempe quando chylus cum urina, aut loco urinæ prodit.

*Remedia  
nonnulla.*

*Art. 1562. Zacutus Lusitanus* refert aliquem liberatum esse a Diabete balneo frigido. Quicumque ad diabetem sive spuriam sive veram inclinant, caveant sibi ab acidulis. Inter adstringentia in hoc affectu exulent cydoniata; quamvis enim stomachi tonum (qui sæpissime simul luditur) confortent, cum ruinam tamen simul simulent, neutiquam conveniunt.

In iis, qui potu quocunque annis præcedentibus se nimium, & sæpius repleverunt, roborantia, blande adstringentia, in primis species de hyacintho cum croco martis, & anodynis maritata, vel terra japonica, aut ejus essentia, tinctura martis cydoniata, vel tinct. vitriol. martis, & vinum rubrum aqua temperatum, modica quantitate profunt. Exercitatio quoque & fricatio corporis frequens egregie hic conducunt: quia partes roborant, & transpirationem augendo serum a renibus divertunt. *Heisterus.*

*Art.*



*Art. 1563.* Rara est mentio hujus morbi apud <sup>Græci</sup> veteres scriptores; *Græcis* fere incognitus fuit; <sup>incognitus</sup> *Galenus* profitetur se bis tantummodo ipsum vi-<sup>ra fuit</sup> disse; *de locis affectis* lib. vj. cap. 3.

*Art. 1564.* Præter jam dicta interdum ad cu-  
ram aliquod faciunt remedia sequentia, *decoct.* <sup>Remedia</sup>  
*catechu comp. decoct. incrassans, ichthyocola, ge-* <sup>varia.</sup>  
*latina C. C. oryza, tinct. coralli, trochisci Gordo-*  
*nii, & præ omnibus juxta praxin modernam*  
*aque calide Bristolienfes.* Sequens decoctum cum  
maximo fructu propinari potest; *℥. Cort. Peruv.*  
*℥j. tinctur. rosar. ℥ss. coq. ad ℥j. lento igne, cola-*  
*tur. add. vin. rub. auster. ℥ss. syr. Cydon. ℥ij. misce:*  
*dof. ℥iij. bis vel ter in die.*

## N E P H R I T I S.

*Cælii Aureliani sententia.*

*Art. 1565.* Renalis passio, quam Græci *Nephri-*  
*tin* appellant, tarda quidem affectio renum est <sup>Juxta</sup>  
quæ a perfrictione oritur, indigestione, percus- <sup>veteres</sup>  
su, casu vehementi super clunes, ciborum præ- <sup>ex tar-</sup>  
ter consuetudinem acedine, vehementi venerea <sup>dis pas-</sup>  
libidine, vel etiam a frequentia diureticorum, <sup>sonibus</sup>  
aut a veneno, quod specialiter renes afficiat: ut <sup>habita.</sup>  
sunt ex cantharidis confecta.

*Art. 1566.* Cum adhuc lævis fuerit tumor, <sup>Morbi</sup>  
( seu inflammatio ) dolor lævis adest secundum <sup>ingres-</sup>  
lumbos, & circa Ilia, magis cum proni fuerint <sup>sus.</sup>  
ægri. Augescente vero tumore, dolor etiam plu-  
rimus fit cum gravedine, & fervore lumborum,  
atque iliorum, & pubetenus, vel umbilico, &  
con-

consensu usque ad vesicam tendente, ob tumorem urinalium viarum, seu ureterum.

*Progres-* *Art. 1567.* Dehinc per incrementa passionis  
*sus.* etiam febres accedunt cum consensu jecoris, ut quidam etiam ictericum colorem sumant, & inappetentiam, ventris tormina, inflationes, & ructationes patiantur.

Urinæ tenues sunt, aquosæ, & ita subalbidae, ut quasi catuleæ videantur: & primo paucae, deinde plurimæ, & coacervatim effusæ ullo absque levamine. Eadem pejorante tumore infœculentum colorem veniunt, nam ex nimia tensione exilissimis ruptis venis, vinosæ propemodum prodeunt, & cum renum fluorem pinguem acceperint, etiam oleaginosæ veluti adipis qualitatem simulantes.

Tum hebetudo sequitur, & articulorum frigus, & vomitus; & passione in diuturnitatem abeunte corpus gracilescit, adeo ut quidam curvi permaneant, & semper proni ambulare cogantur, nec unquam se erigere possint.

*Decli-* *Art. 1568.* Est præterea signum declinationis  
*natio.* morbi supradictorum in contraria mutatio, ut urina aquea in crassitudinem veniens: crassior vero vel viscosa in tenuitatem; item quæ paulatim atque cum mordicatione ferri solebat, sine dolore adveniens, & si plurima, mediocriter inde effluens; & ad summum omnia cum naturæ solita, vel similia fuerint visa.

*Nephri-* *Art. 1569.* Nephritis & colica similes quidem  
*tidis &* *colica* *passiones* sunt: discriminantur autem ab invicem, quia renali vitio extemplo difficultas urinae conjuncta est, tum etiam in colica dolor magis interior est, & ventri vicinas partes tenet, a quibus sumit exordium; in nephritide autem ejus sensus est inter renes, & intestina, & vesicæ fundum.

*Art.*



*Art. 1570.* Generaliter curatio hujus morbi *Curatio* difficilis est, ob angustiam locorum, quæ passione vexantur, & ob acrimoniam urinæ, quæ insuete aliquandiu renibus immoratur.

*Mercurialis sententia.*

*Art. 1571.* Nephritis cognoscitur ex gravita-<sup>Signa in-</sup> tis sensu circa lumbos, lassitudine circa dorsum, <sup>flamma-</sup> stupore qui ad alterutrum, vel utrumque crus <sup>tionis</sup> pertingit, mentis alienatione propter septi transversi vicinitatem, impotentia ambulandi, dolore magno circa lumbos, qui tunc præsertim urgere solet, quando corpus vario modo quassatur, urinæ difficultate, & ardore, quæ etiam guttatim stillat: primum tenuis, deinde mucosa; febris adest insignis, nausea, vomitus biliosus, ventriculi morsus, alvus adstricta.

*Art. 1572.* Si inflammatio ad suppurationem vergat, febres sunt majores, apparet aliquis tumor, & aliqua elevatio extrinsecus circa lumbos, major est calor, & dolor circa renes, urinæ ruffæ, & adhæc ubi supra partem sanam decumbunt, videtur, pars adversa veluti pondus habere appensum, quæ omnia signa meliora fieri solent, ubi jam factum est pus. <sup>Suppurationis ejus.</sup>

*Art. 1573.* Inter morbos renales inflammatio <sup>Prognosis.</sup> maxime omnium lethalis est. Verum ex *Hipp. sis.*

*VI. Aph. 11.* laboranti Nephritide si superveniant hæmorrhoides bonum est, contra ex *Rhase*, & *Avicenna* si delirium superveniat lethale.

*Art. 1574.* Quoad curationem diligens victus *Curatio* ratio præ ceteris necessaria est, tum aer eligatur frigidus, & humidus, & serenus. Somnus sit moderatus, cavendo, ne ægri supra dorsum dormiant, quod si stratis subjiciantur herbæ refrigerantes, ut nymphœa, fol. salicis, vitis, rofar.

far. plantag. optimum remedium est. Si alvus non fluat emollienda est clysteribus. Erit autem talis clyster optimus. ℞. Hord. pug. j. fol. lact. malv. ana man. j. sem. fiat decoct. f. a. & colat. lib. j. sem. add. ol. ros. compl. lib. sem. sacch. rubr. unc. ij. sem. salis ℥j. misce. A vino abstinendum; pro quo aq. hord. in qua nymphææ, & lact. femina sint incocta usurpetur.

Instante plethoria mittatur sanguis e brachio; & ubi nulli humores ad renes influunt tundatur vena pedis. A scammonia; & cassia caveto, quia ad renes movent; alvum vero vel marina vel syrúp. ros. solut. vel quovis alio medicamento quod omnino urinam non provocet; purgato.

Remedia  
externa.

Art. 1575. Extrinsecus initio statim oleum rosat. cum albumine ovi, vel Infrigidans Galeni admoveatur. ℞. Ol. ros. unc. j. album ovi num. j. acet. ℥ij. conquassentur omnia diligenter; & regioni renum applicentur. Ubi autem inflammatio facta jam fuerit in augmento ol. chamæmel. sem. lin. decoct. fœnugræc. & ping. anatis conveniunt. ℞. Ol. ros. omphac. unc. j. ol. sem. lin. chamem. ana ℥ij. ping. anatis ℥j. sem. acet. ℥ij. misce fiat linimentum. In declinatione morbi fomenta juvant facta spongiis, & decocto simili. ℞. Fl. chamem. alth. clam. ana pug. sem. sem. lin. ℥ij. fœnugr. pug. j. fiat decoct. f. a. & cum spongiis foveantur renes.

Ad in-  
ceptam  
suppura-  
tionem  
promo-  
vandam.

Art. 1576. Si omnibus his auxiliis efficere non poterimus, quin inflammatio ad supputationem perveniat, eadem omni studio accelerabitur. Ego tali emplasti utor. ℞. Rad. alth. lib. j. decoq. diligenter; dein pistent. & per cribrum transmiss. adde butyr. recent. unc. ij. terebinth. unc. j. passul. cribr. unc. j. sem. misc. omnia ad formam emplasti. & apponatur renibus. Ubi extrinsecus aliquid extuberet, locus ex documento Hippocratis incidenda



pus est, & pus extrahendum; & profunda sectione hoc faciendum est, quia pus solet residere in profundis partibus.

*Art. 1577.* Cæterum ubi suppurantur renes, fiunt ulcera; & ea quidem in curabilia, quia cum per ipsos renes continuo excurrant humores excrementitii, vix fieri potest, ut illæ partes ulceratae consolidescant. *Renum  
ulceris  
prognosis.*

### *Boerhaavii sententia.*

*Art. 1578.* Certum est renes vera inflammatione tentari ex dolore ardente, pungente, magno; ex febre acuta continua comitante; ex urina pauca, admodum rubra, & flammea, vel in summo malo aquosa; stupore cruris vicini; dolore inguinis, testisque vicini: dolore iliaco: vomitu bilis: ructu assiduo. *Inflam-  
matio  
renum.*

*Art. 1579.* Hanc inflammationem producere possunt omnes causæ generales inflammationem parientes; privatim quicquid urinæ transcolationem & transitum in meatibus urinariis impedit. Si summa inflammatio hac vascula occupat, ita sæpe stringuntur, ut nihil reddatur lotii; aliquando ut valde parvum, tenue, aquosum, quod pessimum. Infinitæ sunt Nephritidis species, causæque; & inter eas una a calculo; omnium tamen est ferme eadem curatio. *Causa.*

*Art. 1580.* Sanatur per remedia generalia omnium inflammationi sanandæ propria, viz. *venesectionem*; *avulsionem*; *dilutionem*; per *decoctaelenia*; *emollientia*; *antiphlogistica*; magna copia ingesta; *perclysmata*; *fomenta*, *balnea* ex iisdem constantia: *victu humido*; *leni*; *quiete*, *vitiatione lecti calidi*, & *decubitus* in dorso. Si nimia symptomata doloris, vel convulsionis urgent, *opiora* profunt; vomitum autem nimium sæpe ingesta *Curatio.*

tu tepidæ mellitæ juvare prodest . Atque hac sola methodo tuto curatur ipsa *Nephritis* a calculo renibus, ureteribusve impacto orta.

*Abscessus.*

*Art. 1581.* Si causæ Nephritidis magnæ, nec malum resolvitur, nec sanatur, sed excurrit ultra septimum diem, *abscessus* metuendus; quem fieri docet, remissio doloris, ejus in pulsationem mutatio, horror sæpe recurrens, gravitas stuporque partis; jam factum esse docet: prægressus priorum, tum pulsus, ardor, tensio in loco, urina purulenta, foetida, instar urinæ falsæ putrefactæ: simulac abscessus ille factus scitur, utendum valde *maturantibus* primo & *emollientibus*, dein purulenta apparente urina, *diureticis puris: ex aquis medicatis, sero lactis, similibusque, usurpatis simul balsamicis.*

*Effectus suppurationis & prognosis.*

*Art. 1582.* Si vero suppuratio dicta diu durat, totus ren exesus saccum format nulli usui fervientem: tumque frequentes *tabes renalis* insequitur. Si scirrhum hic format, paralyxis vel *claudicatio* cruris suppositi oritur, immedicabile malum: unde sæpe lenta tabes, hydrops, &c. Si autem parva copia materiæ inflammata coagulata in folliculo urinæ minimo hæserit, basin format, cui apposita sabuli in urina materies crustatim accrescens calculum renalem creat, sicque eundem auget, de quo alibi. Quinetiam aliquando in gangrænam transit, quod docet vehementia causæ & symptomatum, & subita doloris remissio sine causa manifesta, cum sudore frigido, pulsu debili intermittente, singultu, urina vel nulla, vel livida, nigra capillosa, foetente, carunculis fuscis, nigrisve foeda, defectu virium subito, ubi nihil juvat, imo nec ipsa medicina.



*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1583.* Renum inflammatio & exulcera- <sup>Signa in-</sup>  
 tio *nephritis* quandoque dicitur. Signa sunt ar- <sup>flamma-</sup>  
 dor urinæ, stranguria, urinæ interdum suppres- <sup>ionis re-</sup>  
 sio, corporis inflexibilitas, febris, stupor cruris, <sup>num, &</sup>  
 vomitus biliosus, alvi suppressio, &c. Ut rite <sup>quomo-</sup>  
 distinguatur a *calculo*, observandum est: quod hic <sup>do dif-</sup>  
 semper adest febris continua, in calculo non <sup>fert a</sup>  
 ita; dolor etiam est magis continuus & pulsati- <sup>calculo.</sup>  
 lis, in calculo interpolatus & periodicus; ischu-  
 ria in hac, raro in calculo. In inflammatio-  
 22, tione renum urina in principio valde rube-  
 22, scit, morbo autem ad summum provento a-  
 22, quosa & limpida evadit; in affectu calculoso  
 22, *contrarium prorsus accidit.*

*Art. 1584.* Quoad curam cum reliquis inflam- <sup>Curatio.</sup>  
 mationibus convenit, cum externis secundum  
 curam *anginae* procedendum est, cum internis  
 secundum *pleuritis*; *hirudines* venis hæmorrhoi-  
 dalibus applicatæ prosunt. *Diuretica* in princi-  
 pio sunt nociva; conducunt *nitrata*, *saturnina*,  
*papaverina*, *succus cancrorum fluviatilium*, & ex-  
 terne *camphora*.

*Art. 1585.* Suppuratio aliquando expectanda <sup>Suppu-</sup>  
 est; rupto abscessu miſtus fit purulentus, hinc <sup>ratio,</sup>  
*ulcus renum*; dolor morficans & rodens in lum- <sup>inde ul-</sup>  
 bis sentitur a fero acri, quod in transitu irri- <sup>cus re-</sup>  
 tat, & rodit cum caloris sensu, periculosum est <sup>num.</sup>  
 malum, & sæpius lethale.

*Art. 1586.* Quoad curam, *mundificantia* & *Ejusdem*  
 hinc *consolidantia* utramque faciunt paginam; <sup>curatio.</sup>  
*vomitum* a pluribus laudatur; *mercurius dulcis*  
 cum *terebinthina* & *balsamicis*; præmissis *mun-*  
*dificantibus*, decoctum *hederae terrestris*, & e li-  
*gnis*, *succus cancrorum fluviatilium*, *trochisciat-*

*Farrago sententiarum.*

*Prognosis.* *Art. 1587.* Nephritidem concoctione proba-  
maturuisse, jamque penitus sanatam esse finitis  
doloribus cognoscitur, & urina multa, crassa-  
que, in qua quid subsidet bonum est, vimque  
finiendi morbi habet. At vero periculum nun-  
ciatur, si frequens bilis vomitus est, longeque  
magis delirium terret, & simul etiam si extrema  
inalgescent. Certa mors est cum ren præ ni-  
mio humore disrumpitur. *Lommius.*

*Ad renes inflam-  
matos  
remediū.* *Art. 1588.* Ad renum inflammationem arca-  
num esse inquit Hartmannus succum Aflaco-  
rum, aut Cancrorum fluviatilium crudum, sci-  
licet ex ipsis contusis expressum, & aliquo jus-  
culo, vel decocto prunorum assumptum semel  
vel bis ad cochleare unum.

*Potus an  
calidus  
vel fri-  
gidus.* *Art. 1589.* Aretæus fuit hujus sententiæ, ut  
in Nephritide aqua calida daretur ægri biben-  
da; Avicennas autem damnat usum aquæ cali-  
dæ, potiusque si bibenda est aqua, quod tamen  
videtur negare, vult bibendam esse frigidam.  
Nos vero hæc omnia irrita habemus, nisi quod  
vini potum ex inflammatione febricitantibus;  
summe noxium constantissime affirmamus.

*Aliare-  
media  
ad re-  
num ab-  
cessum  
remedia.* *Art. 1590.* Suppurata renum inflammatione,  
& pure per urinam prodeunte decocta vulnera-  
ria cum bals. sulph. terebinth. vel succin. con-  
veniunt, aqua hederæ terrestris cum syrupo de  
symphyto *Fernelii* item juvant. Sed *Hoffmanno*  
placet usus terebinthinæ cum vitello ovi solutæ,  
& cum ocul. cancrorum floribusque hyperici  
commixtæ. Mercurium dulcem bis vel ter in  
hebdomada exhibitum magnificat *Hoffmannus*.

*An-*



*Angelus Sala*, Mercurio vitæ ad grana aliquot nephriticos dolores cito debelasse confitetur, & *Lucas Tozzi* affirmat usu medicamentorum mercurialium nonnumquam curatum quemdam vidisse, diu renis ulcere conflictatum.

## INFLAMMATIO ET EXULCERATIO Vesicæ.

### *Etmulleri sententia.*

*Art. 1591.* In inflammatione & exulceratione *Vesicæ* pathemata sunt: tensio, durities, ardor, tumor, ac dolor in regione pubis; febris plus minus acuta; ægri ut plurimum moriuntur quarto vel septimo die, vel sequitur *ulcus* curatum difficillimum; interne quoad curam cum aliis inflammationibus convenit; externe danda est opera ut inflammatio *discutiat*, aliter expectanda est *exulceratio*.

### *Æginetæ sententia.*

*Art. 1592.* Vesica phlegmone oppressa fervor cum gravitate adest ad pubem, & Ilia; *inflammationis* mejendique impotentia cum febricula accedit; quare sanguinis detractio, quam primum occurrendum est, tum clysteriis mollibus, & enematis, quæ ex oleo, & papavere, & adipe anserina constituuntur, opii quoque obulus semis cum myrrha, crocoque, ac oleo sedi immittendus. Malsa propinanda, abstinendum a valde lotium cientibus, multaue potione: nisi acris, & biliosus humor naturæ modum excedat, tum quippe copiosi potui indulgendum: Sumatur cucumeris, & peponis semen.

*Art. 1593.* Vesica ulcusculis intentata vehe-

*Prodi* mens cruciatus pectinem, inumque ventrem im-  
*vesica* perit: urina magna cum anxietate redditur, &  
*diagnos* post mictionem pus in fundo matulae subsidet,  
*sis* squamulaeque in ipsa tetri odoris, aut laminae  
circumferuntur. Furfureae vero hypostases vesi-  
cam scabie laborare significant. Aqua mulsa  
vel foenugraeci decoctum una cum melle, aut  
*Curatio* cucumeris semen cum passo propinetur. Lacle-  
tiam in potu magnifice sic affectis opitulatur.  
℥ss. Sem. lin. cucumer. tragacanth. a. denarios ij. mi-  
sce f. pastilli. Aliud ℥ss. Nucl. pineae nucis num.  
xx. semin. cucumer. sativi cochlearia xl. amyli ℥j.  
Juris in quo nardi sem. apii ana denarii v. elix.  
sint heminas ij. f. emulsio. In vesicam vero cly-  
steridio instrumento mullam aquosissimam in-  
funde, seu lac cum momento mellis, aut cu-  
cumeris semine, aut albumen cvi cum pompho-  
lyge convenit. Cataplasma etiam e palinula da-  
ctylis, & uvis passis cum galla, acacia, hypo-  
cystide, & alumine superimponitur.

### *Jonstoni sententia.*

*Signa in* **Art. 1594.** Vesicae inflammatio non tam ip-  
*flamma-* sus substantiae, quae tenuis, & exanguis est,  
*plevis* quam sphincteri cervicis ipsius musculo insidet.  
*vesica.* Signa ejus sunt: dolor in perinaeo cum rubore,  
& ardore acerbis, urinae cum summo meijendi  
conatu suppressio, alvi adstrictio, quia rectum  
intestinum inflammationis magnitudine coar-  
ctatur, pubis atque pectinis ad umbilicum pro-  
pter urinae copiam dissentio.

*Curatio.* **Art. 1595.** Curatio difficilis est, qui affectus  
plerumque circa septimum imprimis diem, ac-  
cedente febris, & urinae atque alvi retentione,  
lethalis evadit. Si tamen sit levior, & inflam-  
matione in pus mutata abscessus introrumpatur,



tur, & per urinam evacuetur, melior spes est. Erysipelate item juxta cutis superficiem oborto, ac urina copiosa emissa, repente interdum solvitur. Instituitur, inquam, curatio ad modum aliarum inflammationum. Repellentia non diu applicanda sunt, quia vesica membranosa est, & facile confringitur, urina supprimitur, & nervi læduntur.

*Art. 1596.* Scabies vesicæ cognoscitur: ex *Scabies*  
pruritu in pectine, urinæ gravi odore, fursura- *vesicæ*  
ceo sedimento in fundo residente. Oritur ab *diagno-*  
humoribus acribus, & salsis superficiem illius *sis.*  
internam erodentibus.

*Art. 1597.* Curatur in senibus ægre. Humo- *Curatio*  
res sunt partim evacuandi, partim demulcendi  
per semina quatuor frigida, flor. viol. fragar.  
vel intus assumpta, vel extus per urethram in-  
jecta.

### Farrago sententiarum.

*Art. 1598.* Vesicæ tunicæ interdum inflam- *Causæ*  
matione tentantur, maxime tamen ejus cervix *inflam-*  
a sanguine venis effuso; non raro catheter vi *marionis*  
in vesicam impulsus hunc morbum contrahit, *vesicæ.*  
aut dolor vehemens ab ulcere, & lapide.

*Art. 1599.* Rarus certe sed valde periculosus *Prognosis.*  
morbus ubi suppurat; nam nisi rupto abscessu  
urina exeat, intra septimum diem mors immi-  
net, sæpe convulsione manifesta; sæpe etiam  
partis gangræna jugulat.

*Art. 1600.* Vena repetito secetur, clyster e- *Remedia*  
molliens, parva tamen copia, injiciatur, ne tu- *externa.*  
morem comprimat. Purgetur alvus blande cass.  
cathol. syrup. de cichor. cum rhab. linus fiat pu-  
bi, & perinæo ex ol. rosat. cum pauco aceto,  
vel ex ovi albo cum succo solani, & plantagi-

214 *Inflammatio & exulceratio, &c. CAP. VII.*  
nis, vitatis iis, quæ valde adstringunt, & refrigerant. Fodus sit emolliens, & relaxans. Cataplasma simile interdum corroborans ex farina fab. orob. lupin. in vino coctis, si metus sit gangrænæ.

*Art. 1601. Ab internis remediis abstinendum*  
*Interna.* in vesicæ inflammatione quousque urina profluxerit, sicut pariter a diureticis ne magis urina accumulata laborem faciat. Postquam vero æger minxerit lenientes expressiones locum habebunt ex condituris violarum, flor. nymphæ, lactucæ, seminibus hordei, melonum, halicacabi; quibus & sanguis hircinus, & sal prunellæ, & saccharum saturni, atque alia ad inflammationem sedandam peculiarius conducentia adjici poterunt. *Lucas Tozzi.*

*Art. 1602. Laudantur alias. hisce in casibus*  
*Remedia* ubi vesica inflammatur, clysmata ex emollientibus plantis lactis fero incoctis, quibus terebinthina ovor. vitello soluta adjicitur; multum tamen roborabitur illarum virtus, si capita præterea papaveris incoquantur, aut nitrum in decocto solvatur. Interim externe vesicæ regioni potest, pro scopo refrigerandi, & anodyno, lamina plumbea applicari, aut alia unguenta vel linimenta, v. g. ol. viol. cum sacchar. saturni butyraceo linimenti in formam redactum ex præscripto. *Fabriz,* succi nymph. sempervivi, cancr. fluviatil. alumen crudum pulverisatum, cum album. ovor. ol. amygdal. dulc. vel lilior. alb. cum camphora in mortario plumbeo subactum. *Langius.*

*Art. 1603. Vesicæ scabies curari debet pur-*  
*Scabies* *vesicæ* *prognosis.* *giantibus, & postremo siccantibus, ulcusque ad cicatricem perducentibus. Est igitur affectus difficilis, & prope insanabilis, ut nullum adversus ipsum valeat medicamentum. Trallianus.*  
U L-



## ULCUS RENUM &amp; VESICÆ.

*Art. 1604.* In ulcere *vesicæ* adest dolor gravis *Ulcus*  
 in pectine & pube, quoties ægri mingunt, uri- *vesicæ*  
 næ difficultas accidit: sæpius & tenesmus, & *signa.*  
 membri virilis erectio. Si in pene vitium sit,  
 inter mejendum dolor percipitur, quod in *vesi-*  
*cæ ulceribus* non accidit, nisi juxta ejus collum  
 ulcus consistat. Malum ut plurimum est incu-  
 rabile. Quomodo distinguantur ulcera renum &  
*vesicæ.* „ Inter renum & vesicæ ulcera sic di-  
 „ stinguatur (inquit *Lommius*) *renibus exulcera-*  
 „ *tis* non æque difficulter urina redditur, &  
 „ quod ex his deteritur, rubet, seu tenues tra-  
 „ huntur carunculæ, seu filamenta capillis simi-  
 „ lia; minor etiam incidit dolor, sæpiusque cruor  
 „ urinæ permixtus. At vero *exulcerata vesica*,  
 „ major est urinæ tum cupiditas tum difficultas;  
 „ quicquid decedit, album est; dolores magis  
 „ urgent, minus sanguinis excernitur; si mea-  
 „ tus urinarius sive *urethra exulceretur*, urina  
 „ subcrassa est, particeps modici cruoris, vel  
 „ certe puris. *Ulcerata renum* promptius quam  
 „ *vesicæ* sanescunt.

*Art. 1605.* Eædem sunt indicationes curativæ  
 ac in ulcere Renum; *trochisci Gordonii* specificè *Curatio.*  
 laudantur; *thermæ*. Pro injectione convenit *aq.*  
*calcis cum trochisc. alb. rhasis* (*sacchar. Saturni.*)

*Tralliani sententia.*

*Art. 1606.* Renum vel vesicæ inflammatio-  
 nem, quæ in pus convertetur, prius hinc inter- *Renum*  
 nosces, quod nulla occasione oborta febres aut *& vesicæ*  
 perfrictiones quædam citra rationem, & inordi- *absces-*  
 nate superveniant. Nam dum pus generatur, *gnosis.*

dolores febresque magis eveniunt, quam cum generatum est, deinde in renum abscessu æger, cum in sanam partem inclinat, ex affecta gravitate magnam magis sentire se dicit, ac antequam inflammatio in abscessum pervenisset. Dolor qui antecessit, & gravitatis sensus exquisitam internotionem, & indubitatam demonstrationem præstat, a quibusnam locis: a renibus ne, an a vesica pus excretum proficiscatur. Præterea si pus a superioribus partibus effertur, omnino cum urina ipsa accurate permixtum invenitur, si autem ab inferioribus sedimentum in fundo matulæ potius facit. Item si a vesica proveniat particulas laminis similes in urina ferri reperies, si a renibus carnosas.

*Curatio.* Art. 1607. Qui pus excernunt lenibus & abstergentibus curandi sunt, ex quorum numero est etiam mulsa aquosa, & cremor ptisanæ cum modico melle. Item adianthum, & semen cucumeris cum chrysattico. Lac asininum, præsertim in vesicæ ulcere; nec non bolus Arinenius potu proficiunt. Insuper equisetum, & gramen, & uvæ passæ, & amygdala, & nuces pineæ juvant. Pro potu idoneus est cremor ptisanæ, & avenæ, passum, aut hydromelum, aut cnidum, aut Sareptinum.

### *Farrago sententiarum.*

*Signa  
puris in  
urina.*

Art. 1608. Signa paucis tradidit *Augenius*, quibus discerni possit, quando pus cum urina miscetur monendo: semen innatare urinæ, pituitam subsidere, & purulentam materiam ita permisceri lotio, ut aut nunquam, aut saltem longe post fundum petat. Sed animadvertit *Christianus Langius*, huiusmodi indicia fallacia quidem esse; nam sedimentum quandoque pituitosum per-

tem-



temporis aliquod spatium fluctuare in urina, & purulentam materiam aliquando statim fundum petere observatur. Certiora itaque erunt signa puris, primo ex odore conjuncto fœtido; secundo ex colore ad viriditatem inclinante, vel cruore tincto; tertio ex consistencia sedimenti in semine fibroso quasi, in pituita admodum tenaci, in pure vero prorsus non cohærente, aut ex fœtore super carbonem candentem effuso.

*Riverii sententia.*

*Art. 1609.* Ulcus Renum vel Vesicæ a tribus *Causa*  
excitatur causis; abscessu rupto post inflamma- *& signa,*  
tionem, humorum acrimonia, (qualis est ea, *&c.*  
quæ mictum cruentum efficit), aut a calculo  
aspero dictas partes erodente; postrema hæc fre-  
quentior est, ac fere ordinaria. Mictio purulen-  
ta est signum diagnosticon. In ulcere vesicæ,  
aut illius cervicis perpetua adest dysuria & con-  
tinuus dolor partem istam infestans, in ulcere  
renum non ita; raro curantur in junioribus,  
in senibus numquam.

*Purgantia* debent esse *leniora*, ut *cassia, rha-* *Curatio.*  
*barbarum, &c. mercurius* eximiam habet vim o-  
mnia ulcera interna & externa *mundificandi &*  
*consolidandi*, ut etiam *terebinthina* cum pulv. *li-*  
*quiritiæ* exhibit. ad ʒβ. Post debitas *evacuationes*  
& *revulsiones* ad *detergentia* progrediendum est;  
inter illa *serum lactis, hydromel tenue, lac asi-*  
*ninum, &c.* post horum usum, ubi ulcus satis  
mundificatum fuerit (quod cognoscitur quando  
pus minore quantitate excernitur, idque album,  
æquale, ac minime fœtidum) *glutinantia & conso-*  
*lidantia* exhibenda sunt, inter quæ *trochisci Gor-*  
*denii* instar omnium habentur, qui dolorem le-  
niunt;

niunt & ardorem urinæ contemperant; dos. ℥ij. vel iij. in hydromellite, vel dec. hord. præ cæteris *lac vaccinum* cum *boll. armen.* ʒß. haustum singulis matutinis testatur *Forestus* maxime conferre ad ulcus expurgandum & consolidandum; *lactepens* recens multum, frequenter injectum, præstantissimum est *anodynum*, in quo si *trochisci Gordonii* dissolvantur omnes scopi tum doloris sedandi, tum ulceris curandi adimpleri possunt.

### Farrago sententiarum.

*Prognosis.* **Art. 1610.** Renum affectiones (inquit *Hippocrates*) non vidi sanatas supra quinquagesimum annum. Si quis sanguinem & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem significat. *Hippocr. aphorism.*

*Reme-* **Rhabarbarum** in parva dosi & diu exhibitum  
*diu sin-* est remedium singulare ad ulcera renum & vesi-  
*gulare.* cæ curanda. *Hamilton.*

**Art. 1611.** Nescio an virtutes *Pereira Brava*  
*Pereira* *i. e. radicis vitis sylvestris Brasiliensium* satis ten-  
*brava.* tata fuerunt, necne; de qua *M. Geoffroy* hæc habet; exhibui felici cum successu hanc radicem *Ulceribus Renum & Vesicae laborantibus*, quorum urinæ tanto pure refertæ erant, ut mejendi impedimento fuerit; ex usu hujus remedii statim urinam libere reddebant pure propemodum immunem, & progressu temporis adhibito paulo balsam. Copaib. ad ulcera detergenda, ab his deploratissimis affectibus omnino sani evaserunt. In dolore etiam *colico & nephritico* mira præstat. Dosis in substantia a gr. xij. ad xvij. in decoct. ad ℥ij. *Hist. de l'Acad. Vol. xiv. p. 75.* De virtutibus etiam hujus radicis vid. *Transact. Philos. N. 365.* Ex propria experientia *D. Cheyne* in tractatu suo de Arthritide p. 50. testatur *Æthio-*



in mineralem larga dosi bis in die sumptum, *Æthiop.* diuque continuatum *remedium esse certum* ad ul- *mineral.* *cus Vesicæ curandum.*

*Art. 1612.* *Ulcus Vesicæ*, quod a calculo fit, non curatur, nisi prius extrahatur calculus. *Prognosis.* *Ulcera Vesicæ* sunt fere semper incurabilia; *Ulcera Renum* non sunt adeo periculosa.

*Art. 1613.* Remedia sequentia quandoque suo loco utilia; *aqua calcis*, *decoctum balsamicum*, *decoct. incrassans*, *enema terebinth.* *mistura balsamica nephritica*, *tinctura antiphthisica*, *tinctura cantharidum.* *Remedia varia.*

## CALCULUS RENUM & VESICÆ.

*Art. 1614.* „ Calculus definiri potest corpus *Calculi* „ durum ex materia lenta terrestri, vel insita *definitio.* „ lapidescente concretionem generatum; loci, „ quo detinetur, dolorem, obstructionem, aliaque „ symptomata ut plurimum pariens.

### *Meadii sententia.*

*Art. 1615.* Observasse olim me memini ( *de Calculi* *Imper. Sol. & Lun. pag. 55.* ) in cadaveris sectione *genesis* pueri quinquenni, quem ad mortem cruciave- *observa-* rant graves nephritidis dolores, varios gradus, *tio.* quibus calculus in lapideam duritiem concreverat. Oppleti erant cum renes, tum ureteres materia calculosa, quam cernere erat, varias hic illic concretionis formas induisse. Primum mali fundamentum erat aquosus, & limpidus humor, qui paulatim lactescens in tenues, & ramosas crysallos abiit, quibus in unum coeuntibus, accessit tandem lapidis forma, & durities.

*Art. 1616.* Tartarum quoddam hostili coagulatione-

*Calcu-* latione in renibus genitum calculi esse mate-  
*lorum* riam, non sine ratione, ut opinor, dixit in ex-  
*substan-* perimentis chemicis versatissimus *Helmontius*.  
*tin qua-* Quam quidem opinionem confirmare videtur  
*lis.* analysi ejus facta per ignem, cum tartari ex  
 vino rhenano resolutione comparata. Hujus rei  
 experimentum fecit vir ingeniosissimus *Stepha-*  
*mus Hales*. Et in tartaro quidem rhenano com-  
 periit, tertiam totius massæ portionem esse ae-  
 rem elasticum, calculum vero partē plus quam  
 dimidia, ex aere hujusmodi constare; quam  
 aeris proportionem in nullis aliis corporibus  
 potuit deprehendere.

*Conclu-*  
*so.*

*Art. 1617.* Annon igitur conjicere licet cau-  
 sam hujus morbi proximam esse sales tartareos  
 ex sanguine in canaliculos renales delatos? Sa-  
 lium enim istorum ea est natura, ut subtilissi-  
 mæ illius materiæ, quam præter alias dotes co-  
 hæſionis corporum causam esse monstravit illu-  
 stris *Newtonus* magnam quantitatem inclusam  
 teneant. Est igitur calculus materia ex terra,  
 maximamque partem ex aere, in renum tubu-  
 lis concreta, quæ aut in iis hæret, aut in ve-  
 sicam delabitur. Hæc ideo paulo latius expo-  
 sui, ut, quibus modis medicinam hic facere  
 oporteat, ostenderem.

*Indica-*  
*tiones*  
*hinc eru-*  
*unt.*

*Art. 1618.* Et primum quidem, ut venienti  
 morbo occurratur, ne in cryſtallos abeant sa-  
 les isti, lixivialia dicta salia optime prohibitu-  
 ra videntur. Cryſtallorum autem in calculum  
 concretioni oleosa corpora maxime obſtabunt.  
 Et hoc sane præceptum tam in victu, quam  
 in medicamentis, locum semper habere debet.



*Greenfieldi Sententia.*

*Art. 1619.* Signa præcipua diagnostica *Calculi Renum* sunt, quæ sequuntur. 1. in regione lumborum dolor fixus, continuus, gravativus, insensibilis ponderis in renis substantia cum sensu obtuso; lapillo vero e pelvi in ureterem exeunte incipit dolor dilacerans, & omnium acerbissimus. 2. inflexibilitas spinæ dorsalis extensione & compressionem nervorum. 3. lumborum ardor. 4. stupor cruris ejusdem lateris ex pathemate nervorum. 5. retractio testiculi ex eadem causa. 6. urina vel cruenta, vel tenuis & limpida, & pauca quantitate; at vero post calculi in vesicam delapsam urina statim redditur admodum crassa, turbida, subnigra, & copiosa.

*Calculi Renum signa diagnostica.*

*Art. 1620.* Ut accurate distinguatur hic morbus a *colica* (vid. *Art. 1451.*)

*Differentia a colica.*

*Art. 1621.* Signa diagnostica *Calculi in Vesica* sunt sensus gravitatis in perinæo & regione inguinali, perpetuum mejendi desiderium insensibile dolore atroci, præcipue in penis summitate cum egerendi conatu molestissimo & frequentissimo, unde prolapsus ani: „ Pruritus „ molestissimus ad caput penis, ejusdem frequens „ ac involuntaria erectio, urina post motum vehementiorem cruenta, nullum levamen ex „ remediis ad stranguriam adhibitis, &c. sunt „ etiam signa *Calculi in Vesica*; „ sed signum omnium maxime indubitatum est, quod certissime tactu deprehendatur a digito in anum indito, vel cathetere, de quibus consulatur auctor.

*Calculi in Vesica signa diagnostica.*

*Excrecentia carnosæ Calculi mentientes.*

*Art. 1622.* Interdum in *Vesica* inveniuntur *excrecentie carnosæ, schirrosæ, vel fungosæ* calculi symptomata adamussim mentientes, exempla duo aut tria adducuntur. „ Ejusmodi scirrhum

bis

„ bis in cadaveribus vidimus, inquit *Baglivus*.  
 „ Ex testimonio *Lithotomorum* constat Calculum  
 „ in Vesica semper esse *liberum*, parietibus ejus-  
 „ dem nunquam adhærentem, neque membra-  
 „ na unquam involutum, prout a quibusdam  
 „ falso perhibetur. *Vid. Lithot. Douglas. p. 6.* Ut-  
 „ cunque tamen verissimum est Calculum quan-  
 „ doque inter descendendum a renibus, inter  
 „ tunicas ipsius Vesicæ in transitu hære, ibi-  
 „ que hospitari, & in molem grandiore ac-  
 „ crescere, capsæque inter ipsas tunicas forma-  
 „ ta, tandem aliquando ulcus deploratissimum  
 „ ibidem creare. „ *Vid. Hist. de l'Acad. des Sci.*  
*Vol. vj. p. 20. & Memoir. p. 34.*

*Calculus* *Art. 1623.* Calculus grandior in Rene una  
*grandis* cum ejusdem ulcere est casus desperatus; ali-  
*in rene.* quando vero natura, dictum mirabile, ultra spem  
 omnem abscessum efficiens per ipsos spinales mu-  
 sculos viam patefecit ad Calculum ejiciendum,  
 & tandem Ulcus consolidatum fuit. „ Atque  
 „ hinc quasi charta provocatoria, natura mon-  
 „ strante viam, ad aliquid tentandum ars no-  
 „ stra laceffitur. Audax omnia perpetit gens hu-  
 „ mana. Operationem *Lithotomiæ Vesicalis* omni  
 „ ævo chirurgi exercitarunt; sed de *Lithotomia*  
 „ *Renali*, quod scio, nusquam omnino audi-  
 „ mus ante *celebrem Dominicum Marchetti Pa-*  
 „ *tavinum*, qui e rene *Consulis Hobson* calcu-  
 „ lum sectione eduxit, ægrumque ad integram  
 „ senitatem restituit. *Transact. Philos. N°. 223.*  
 „ Unam adhuc aliam *nephrotomiæ* instantiam  
 „ pari successu ex historia Gallicana affert D.  
 „ *Freind.* Hist. med. Volum. 2. pag. 185. Sed, ut  
 „ cum sagaci D. *Rutty* loquamur (in eleganti suo  
 „ tractatu de *ductibus urinariis*) ex consideratio-  
 „ ne partium secundarum est saltem pura pu-  
 „ ta *possibilitas*, ut hæc operatio feliciter succe-  
 „ dat,



CAP. VII. *Calculus Renum & Vesicæ.* 223

, dat , probabilitas vero vix aut ne vix quid-  
dem.

Art. 1624. „ Quod ad *lithiasin* attinet, Ga- Nullum  
„ *lenus* scribit nullum remedium suo tempore *lithon-*  
„ fuisse inventum præsidii Calculum Vesicæ fran- *triplicū.*  
„ gentis, sed sola chirurgia seu incisione curari  
„ posse. Idem alii recentiores, & præstantissimi  
„ medici libere fatentur. De *lithotomia* opera-  
„ tiones, item de extractione Calculorum in  
„ sexu sequiori videatur auctor, qui egregie  
„ scripsit; item consulantur *Celsus*, *Hildanus*,  
„ *Deuglass*, *Cheselden*, &c.

Art. 1625. Sunt tamen remedia nonnulla plu- Plura  
rimum decantata, *lithontriptica* appellata (quam- tamen  
vis in rerum natura talia non dari admodum *vulgo*  
probabile sit) inter quæ nuper aliquando cele- *creata.*  
briora fuerunt *elixir Daffæanum*, nunc satis vul-  
gatum, *pulvis Rogeri*, nihil aliud, quam *testæ my-*  
*culorum calcinata*, *liquor Tipping*, (apud autho-  
rem, p. 134. descriptus;) cum his & aliis quam  
plurimis ejusdem commatis; *si mundus vult de-*  
*cipi decipiatur*: interim nulla est de specificis  
*lithontripticis* hætenus vera fides.

Art. 1626. Homo sexaginta annos natus solo  
usu *ol. amygdal. dulc.* cum gr. aliquot *balsam. Pe-* Curatio.  
*ruv.* intra dies decem 65. calculos excrevit; mi-  
hi in frequenti usu est *enema emolliens* seq. ℥.  
*Rad. alth. ℥j. herb. malv. parietar. mercurial. ana*  
*Mj. sem. lin. ℥ß. coq. in q. s. aq. font. ad ℥xij. cola-*  
*tur. add. tereb. vitel. ov. solut. ℥ß. ol. lin. ℥ij. elect.*  
*lenitiv. ℥j. m. f. enema, & fots sequens.*

℥. *Rad. alth. ℥iv. malv. parietar. chærefol. flor.*  
*cham. melilot. ana Miv. sem. lin. ℥j. malv. petrose-*  
*lin. ana ℥iij. coq. in q. s. aq. font. ad ℥iij. pro fots.*  
Quando diuretica indicantur, pulvis sequens  
diureticus cum apozemate subsequente vel cum  
sero

224 *Calculus Renum & Vesicæ. CAP. VII.*  
fero lactis vel vin. alb. vel Rhenan. exhibitus mul-  
tum valet;

*℞. Sal. prunel. ʒß. cochinel. ocul. cancror. test. o-  
vor. calcinat. sal. sambucin. vel sal. stipit. fabar. ana  
ʒj. croc. opt. gr. xv. ol. junip. gr. vj. m. f. pulv. pro  
chart. iij.*

*℞. Rad. ononid. fœnic. petroselin. liquirit. ana  
ʒß. sem. alth. malv. cicer. rub. ana ʒiß. sem. 4. fri-  
gid. maj. ʒj. ficuum ping. N. v. sebesten. N. iij. hord.  
mund. ʒj. gran. alkekeng. N. viij. coq. in aq. pluvial. q.  
s. ad ʒiij. Ex observatione liquet diuretica mul-  
to melius operari cum illis, qui seipsos aeri fri-  
gido exponunt & leviter se exercent.*

*Lithon-  
eriptica  
alia de-  
cantata.* *Art. 1627. Inter lithontriptica dicta virga au-  
rea multum laudatur a Matthiolo, Dodoneo, &c.  
item tinctura pil. Matth. pulv. milleped. lignum ne-  
phriticum, sanguis hirci, sp. niri, &c. Hæc sunt  
remedia in suo genere valde proficua, sed si quis  
existimet illa revera esse calculum frangentia,  
sciat illa esse mere nugamenta, & res nullius  
pretii. „ Desperandum non est (inquit Boerhaa-  
ve) de inveniando aliquo menstruo contra cal-  
culum vesicæ, quod tamen tam blandum &  
molle sit, ut non lædat, vesicam, & solvat  
tamen calculum in vesica. Habui menstruum,  
quod solvebat omnia saxa durissima in manu,  
manu interim illæsa; conficitur autem hoc ex  
pane Secalino. Sic illud menstruum quod di-  
stillatur ex ovo nullum in oculo dolorem fa-  
cit, & tamen dissolvit myrrham, quæ per ma-  
gnum & validum ignem dissolvi nequit; ideo  
procul dubio tale quid per industriam huma-  
nam inveniri potest contra calculum.*



*Listeri Sententia.*

*Art. 1628.* Calculi inveniuntur sub lingua *Calculi*  
 (2427.) in palpebris, (2027.) in ductibus pitui- *in omni-*  
 tariis, in cerebro, in hepate, in pulmone, in *bus fere*  
 Vesiculis feminalibus, in utero, in ventriculo *corporis*  
 in intestinis, in articulis tum manuum tum *partibus.*  
 pedum, at multo frequentius in Renibus & Ve- *Causa.*  
 fica. Calculus est quid vere lapideum a sale la-  
 pideque Calcario, & interdum a fero, metallo,  
 humoribusque quibuslibet corporis concretum,  
 calculi materiam ab esculentis & potulentis, quæ  
 hujusmodi salibus, lapideisque particulis abun-  
 dant, provenire constat: si corpus bene se ha-  
 beat, foras ejiciuntur, neque in Renibus aut  
 Vesica retinentur; si Renes imbecilli fuerint &  
 Vesica labefactata, in lapidem coire apta sunt.  
 Profecto robur inæquale partium est Calculorum  
 præcipua ratio; ita Renum alter Calculos parit,  
 altero sano. Nisi vitientur tonus & vigor Re-  
 nis expulsivus, Calculi vix nascuntur, nec su-  
 pra modum arenularum concrevit materia la-  
 pidea.

*Art. 1629.* Calculus *hereditarius* est incurabi- *Curatio*  
 lis; facilius est enim uterum a pariendo prohi- *difficilis.*  
 bere, quam Calculosos Renes Calculis vacare.  
*Trochisci alkekengi* somnum conciliant & Calculum  
 pellunt. Dos. ʒj. „ Fœminæ rarius quam  
 „ masculi Vesicæ Calculo laborant propter *viam*  
 „ *patentiam ac brevitatem.* Calculi Vesicæ dolo-  
 „ res licet intolerabiles, in longum tamen tra-  
 „ hunt, per multos scilicet annos: fractis de-  
 „ mum viribus, & vesica magnitudine & asperi-  
 „ tate lapidis attrita, mors sequitur, ni urinæ  
 „ facta suppressione maturius tollantur ægro-  
 „ tantes.

*Ettmulleri sententia.*

*Calculo- rum di- versitas.* *Art. 1630.* Calculus in se non est morbus ; sed productum morbosum ; morbus proprie dicitur *lithiasis*, quæ est dispositio Renum vel Vesicæ ad Calculum generandum. Triplex ut plurimum est diversitas Calculorum, alborum, rubrorum, vel flavorum, qui ultimi sunt frequentiores. Calculi insigniores interdum in Renibus latent quieti sine ullo præternaturali symptomate ; cum vero in motu sint, varia & gravia symptomata producunt, & paroxysmum *nephriticum* faciunt.

*Morbi historia.* *Art. 1631.* In principio ejus motus oritur dolor modo intensior, modo remissior in regione lumbari, minus tamen pungens, dolor est gravativus & obtusus ; ubi vero Calculus movetur ex pelvi in uteræ, tunc dolor lancinans, pungens, & tensivus excitatur, nec ante cessat, quam Calculus ad *Vesicam* descenderit, aut in *Renem* remeaverit. Paroxysmo ingruente urinae sunt paucæ, aquosæ, acres tamen & stimulantæ. In paroxysmo ægri non possunt se erigere, nec corpus incurvare ; stupor adest cruris frequenter in primo paroxysmo, sed non ita in assuetis & hoc morbo fractis ; testiculus etiam aliquando alter sursum doloroso spasmo retrahitur, interdum adest tenesmus, & præterea nausea & vomitus, & non raro difficilis respiratio, quasi cingulo constringuntur costæ inferiores, item tormina, colica acerbissima spasmodica ex consensu nervorum. Omnia hæc symptomata in omnibus promiscue haud reperiuntur.

*Curatio.* *Art. 1632.* Quoad curam *diuretica* imprimis fortiora in principio fugiantur, dum urgent dolores & spasmi, quoniam malum exasperant,



CAP. VII. *Calculus Renum & Vesicæ.* 227

*mitiora* sunt exhibenda cum *opiatis*, ut & *alvum laxantia*, & *emulsiones*, *clysteres emollientes*; aut cum *terebinthina*, minori quantitate injiciendi, & diu retinendi; *balnea* usurpari possunt & *inunctiones emollientes* ex *ol. cham. scorpion. junip. petrol. camphor. sem. hyoscyam. opio*, unguent. *dialth. nervin.* &c. Decoctum *florum cham.* singulariter excellit in paroxysmo *nephritico*; item *sal. volat. succin. persicaria* & *semen dauci lithonriptica* audiunt, item *millepedes*, & *simus columbinus* bene præparatus, & quod præstat *sal ejus volatile*.

*Art. 1633.* Inest plerumque *nucleus lapideus* in Calculo Vesicæ; qui in initio ex Renibus descendit, & exinde augmentum lamellatim accipiens. Sentiunt inprimis ægri obstaculum, quod se opponit meatui urinario inter mejendum ita ut interdum *urina* in medio sui cursus supprimatur; unde assiduum mejendi desiderium, summa difficultas, & *urinæ stillicidium*, anus quoque in consensum trahitur, & tenesmo affligitur, quod est unum ex potissimis signis; obtusus est dolor in Vesicæ collo, & si grandior sit Calculus, pondus in perinæo, dolor & pruritus in glande penis, & frequens erectio. Calculus aliquando *Vesicæ adnascitur*, & tanquam in capsula continetur, quo in casu difficillimus est cognitu. In malo diuturno materia mucilaginosa, necnon lutosa ac argillosa cum *urina* excernitur, quæ tanquam productum morbi agnoscenda est ex nutrimento læsæ Vesicæ.

*Art. 1364.* Cura eadem fere est, ac calculi re-  
num, prodest *aq. vel decoctum persicaria, betulae, dauci*, &c. *urina hirci & tauri, millepedes in vino cultas*.  
*Rhenan.* longo usu mirabilia præstant; pro usu externo *petroleum, ol. scorpion.* &c. ut & enema sequens, ʒ. *Ol. lin. amygd. dulc. ana* ʒiv. *scorpion.* ʒj. *tereb.* ʒ. *m. f. enema.* ( Si calculus sit præ-

*Baglivi sententia.*

*Signum  
patho-  
gnomo-  
nicum.  
Calculi  
in rene  
interdū  
diu sunt  
sine do-  
lore.*

*Art. 1635.* In calculo *vesicae* adest dolor in glande penis, pruritus, & irritatio continua, quod inter pathognomonica; ac certissima calculi *vesicae* signa est. „ Sectione defunctorum „ plane constat calculos interdum per longum „ tempus filere sine insigni dolore; immo quan- „ doque per annos aliquot non est dubitandum. „ Heurnius refert se reperiisse in uno rene de- „ functi calculos 80. & in altero 70. nihilominus „ homo dum vixit *dolores nephriticos neutiquam* „ *sentiebat.* Antonius Pozzis de calculis occul- „ tis in renibus, ait, se invenisse in hominis al- „ terutro rene calculum non minus quam sex „ uncias pendentem *sine ullo tamen calculoso af-* „ *fectu.* Et in quotidiana praxi observamus cal- „ culos ingenti mole excerni diutius in renibus „ prius commoratos, quam ad istud incremen- „ tum assurgere potuissent; excretos tamen *nul-* „ *lo praeunte dolore, excepto in exclusionis paro-* „ *xysmo,* vidimus.

*Curatio-  
nalis.*

*Art. 1636.* Existente calculo in renibus, mo- tu, quem facit descendendo per ureteres, irri- tatis, crispatisque vicinarum partium fibris, fœ- cum & urinæ secretiones sistuntur: tota igitur curatio dirigenda est ac impendenda in tollen- da morbosa irritatione & crispatura renum per *balnea, oleosa, anodyna, & laxantia remedia;* nam ea ablata impeditæ tolluntur liquidorum secretiones. Quin imo sæpe observavimus, quod si calculus post x. vel xv. dies non descenderit ad vesicam, imprudenti *diureticorum* usu & ni- mia remediorum præscriptione, ut vulgo faciunt  
me-



medici, aucta in dolente renum loco majori oscillatione, magis magisque figitur ibidem calculus, & multo difficilius educitur, quo in casu, crede mihi, lector, unicum remedium est *abstinere a remediis*, nam sola quiete calculus tandem profiliet.

*Deckersii sententia.*

*Art. 1637.* Nitrum pulverisatum & calculo affusum ignique moderato impositum ipsum consumit, primo quidem in viscidam mutat materiam, dein aquosam; ast proh dolor! ab externis ad interna non valet consequentia; saltem expectationi non satisfacit *verus nitri spiritus*. *Nitrum neque spiritus illius calculum frangit. Aliare-*  
 In omnimoda urinæ suppressione *testæ ovorum calcinata* ad ℥ij. vel ℥j. assumptæ omnia reliqua medicamenta præcedunt. *Cochinel* in *vino Rhenano* ad ℥j. assumpt. est mite & suave medicamentum, etiam magnæ efficaciz. Omnibus commendamus *spir. sal. armoniaci* tanquam specificum *cum vino Rhenan. spirituve diuretico* ad præsertionem, ut & curationem ipsam. „ Curationis *Nota*  
 „ scopus primarius est *dolorem lenire*, alter *vias bene.*  
 „ *reddere patulas* tum urinæ tum fœcum. Opta-  
 „ bilius est, ut *natura expellat calculum*, quam  
 „ *medicus.*

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1638.* Arenas multi mingunt, & tamen *Arenule* non sunt calculosi; quoniam illæ non coguntur *sine cal-*  
 in lapidem, nisi viscido aliquo & crudo humo- *culo.*  
 re superveniente, ad quod itidem tempore opus est. *Hollerius.* Symptoma illud scorbuticum mendaci specie calculum præ se ferens (de quo *Dravissius*) non solum scorbuticis, sed hy-

230 *Calculus Renum & Vesicae*. CAP. VII.  
 pochochondriacis familiare est. Tartarus sub specie  
 sabuli rutilantis ut plurimum in urinæ subsiden-  
 tia se prodit, quandoque in atomis adeo subti-  
 liter divisus, ut visum fere effugiat, lateribus  
 vero matulæ firmiter adhaerere solet; tormina  
*nephriticis* æmula concitat, & his comes se  
 adjungit stranguria fere continua. Parum leva-  
 minis a calidioribus diureticis expectandum est;  
 malum enim exasperant. *Spiritus salis commu-  
 nis* frenuum hic se præstat averruncum, ut &  
*Spiritus lumbricorum terrestrium*, *essentia item  
 nephritica e ligno nephritico cum spiritu salis ex-  
 tracta*.

*Observatio D. Cypriani lithotomi celeberrimi*  
*Art. 1639.* D. Cyprianus lithotomus celeberrimus inter 1400. quibus operationem celebravit,  
*Cyprianus* oinopotas quam plures, sed ne unum quidem zy-  
*thopotas* calculosum invenit. *Cerevisiam blan-  
 dam ac mitem*, & quo recentiore eo melio-  
 rem, omnibus calculosis in potum ordinarium  
 commendavit. *Catherwood*.

*Virtus ol. lini* *Art. 1640.* Oleum *seminum lini* intus sum-  
 ptum per aliquot septimanas calculos fere indo-  
*lenter* ejicit. *Hamilton*. (Multum etiam lauda-  
 tur infusum *seminum lini* more Thæ diutius epo-  
 tum.) *Oleum sem. sinap. per expressionem* (inquit  
*Boerhaave*) ut *maximum remedium commendatur  
 in nephritide, & calculo vesicae & renum*.

*Aqua persicaria* *Art. 1641.* Aq. *persicaria* valde commendatur  
 a D. Boyle. Julap. sequente quandoque in praxi  
 usus sum; ℥. Aq. *persicar. vin. Rhenan. ana* ℥vj.  
*Sp. carmin. sylv. ℥ij. test. ovor. preparat. ℥ij. Syr. de  
 alth. ℥iſs. m. f. f. otus sive balneum tepidum*, emol-  
 liens & laxans ad calculum ureteribus hærentem  
 movendum & expediendum maximum adjumen-  
 tum præstat; usum ejus pro calculo ipse *Hippo-  
 crates* comprobavit lib. de affect. intern. sect. 15.  
 Experientia enim evincitur a blando ac leni  
 medi-



medicamento in *semicupio* sedenti exhibito plus auxilii provenire quam ex mille lithontripticis vana ostentatione propinatis. Vires supereminentes *Aquarum Bristolensium* circa medium superioris seculi innotuisse ex memorabilibus D. *Aquæ bristolenses.* *Maplet M. D.* litteris *Decano Vvellenfi* anno 1665. datis satis liquet. „ Ad *Rupem Vincentianam* tibi confugiendum esse arbitror, e qua profiliunt aquæ renibus & vesicæ calculosis sive exulceratis succurrere, nec non sanguinis masculam contemperare, & ab illa segregandam urinam lenire & edulcorare aptæ natæ. „ *Aq. flor. spin. alb.* in frequenti usu fuit apud D. *Radcliff*, unde forsan aqua nephritica Pharm. Londinens. Vires hujusce remedii a multitudine insectorum verno tempore istos flores incolentium oriri videntur.

*Art. 1642.* Ad prophylaxin hujus affectus magna habenda est ratio ventriculi; quoniam ex illius cruditatibus materia generandis calculis suppeditatur; ideoque post debitas evacuationes remediis appropriatis roborandus est ventriculus; & frequenter potandæ sunt aquæ minerales acidulæ ac sulphuræ; potus ordinarius sit vinum tenue cum decocto *rad. eringii marini*, quod commendatur a *Cratone*. *Prophylaxis.*

*Art. 1643.* Præter jam dicta, sunt & alia nonnulla remedia, quæ pro symptomatum horum affectuum diversitate saltem opem aliqualem ægris afferre possunt. *Remedia varia.* *Aqua omnium florum, cerevisia de danco, decoctum nephriticum, emulsio cum infus. vel decoct. fol. theæ facta, enema e quatuor oleis, enema terebinth. mistura balsamica nephritica, nitrum saturnizatum, pil. Matth. pil. testac. sp. juniperi, sp. nitri dulcis, semicupium Hildani, &c.*

*Art. 1644.* Fridericus Hoffmannus asserit ab

*Specifi-* arenulis exercitos plurimum levare si tria, vel  
*cū quod-* quatuor alii capita cum vini spiritu semel in  
*dam.* hebdomada assumant, ea nempe die, quæ Lunæ  
 quadraturam, vel Syzygiam præcedit.

*Aliud.* Art. 1645. Remedium publici Juris fecit, *D.*  
*de la Moignon de Basville* Ocitanæ Præfectus  
 quo a gravi colica nephritica se liberatum fate-  
 tur. Remedium hoc ejus jussu Monspellii typis  
 evulgatum hujusmodi est.

Die octava Lunæ, quolibet mense albi vini  
 cyathus propinandus est, in quo drachma infu-  
 sa sit prioris corticis radicis *Acanthii* seu *Car-*  
*dui* viarum versus finem mensis Septembris col-  
 lecti. Hic cortex membranulam exilissimam re-  
 fert extus fuscam, intus albam, quæ ad umbram  
 exsiccata in subtilissimum pollinem redigitur.  
 Ea die qua hoc remedium sumitur versus ves-  
 peras. ℞. *Pariet. man.* j. *lign. Sassafr.* ʒj. *anis.* ʒj.  
*cinnamon. opt.* ʒj. *aq. commun. unc.* x. *coq. per horæ*  
*quadrantem, tota nocte permittatur infusio; mane*  
*sequenti iterum ad hor. quasd. ebull. dein colet. &*  
*exprimat. additis sacchar. candi unc.* ij. Colaturam  
 hanc ita edulcoratam calidius quo fieri potest  
 æger hauriat, nec per trihorium quidquam a-  
 liud assumat, quod observabit etiam, ubi prius  
 remedium ingesserit. Sub horum usum neces-  
 sarium minime est, quod peculiare aliquod re-  
 gimen prosequatur.

*Præstan-* Art. 1646. Verumtamen cum in re tanti mo-  
*tius al-* menti nihil dissimulare, nihilque celare oporteat;  
*rerum.* utilitatis publicæ causa, quædam a doctissimo  
 Roberto VVhytt Medico Edimburgensi experi-  
 mentis comperta memorare juvat. Ille enim,  
 cum incommodis, tum interdum etiam noxiis  
 celebris antidoti (*Joanna Stephens* infra descri-  
 ptum) perpenfis, omisso sapone, vires quasha-  
 bet aqua calcis non calce viva, sed rite calci-  
 natis



natis ostreorum aliarumque concharum testis parata, ita ut libræ septem, vel octo aquæ testarum calcinatarum libræ uni affunderentur experiri voluit. Res ipsi ex voto cecidit; & multo quidem potentius calculum solvere hunc liquorem, quam vulgarem aquam calcis, fragmentorum immersionibus in utraque factis, facile didiscit. Modum deinde illam exhibendi ostendit; quatuorque libras adultos, pueros pro ratione ætatis minus, quotidie bibere jubet. Non uno autem exemplo felicem medicinæ hujus effectum comprobavit. Opere pretium erit ipsam ejus dissertationem perlegere. Ego interim eo libentius hæc adduxi, quod nuper, ut ex ipsius ore accepi, medicus quidam Londinensis, mihi amicissimus hac ipsa medendi via mercatorem graviter laborantem morbo eripuit; plurima enim frustula, nunc crustularum, nunc exiguorum nucleorum instar, simul cum urina foras ejiciebantur. Minime autem sperandum sicut antea dixi, ut lapides ad filicem fere duritie accedentes quovis medicamento comminuantur.

*Meadius.*

Celebre Remedium Johannæ Stephens  
Virginis Anglicanæ contra  
arenulas & calculum.

*Art. 1647.* Hoc quidem remedium ingenti rumore a tota Europa primum acceptum est, cum ratum haberetur, jussu supremi congressus Angliæ, vulgo parlamento, pretio quinque millium librarum ejus Regni, quæ *sterlings* dicuntur, ab eadem Virgine redemptum ad reipublicæ commodum evulgatum fuisse Londini die 27. Junii anni 1739.

*Remedium celebre.*

*Art. 1648.* Hoc item remedium ex triplici par-

parte conſtat, ex pulvere nempe, decoctione quadam, & pillulis. Pulvis ex cochlearum teſtibus, ovorumque putaminibus calcinatis componitur; decoctio fit, nonnullas herbas in aqua communi coquendo, addito ſaponis globulo ex *Naſtrutio ſylveſtri capſulis criſtatis* ad nigritiem combuſto, & mele compoſiti; pilulæ demum componuntur ex cochleis calcinatis, *Danci vulgariſ* ſemine *Bardana* ſemine, *Fraxini* fructibus, *Rosa ſylveſtri inodora ſeu canina* (*Parit. Theatr. Hiſp.*) *Mespili apii folio ſylveſtris ſpinoſæ ſeu oxyacanthæ* (C. B. P. Havves) fructibus ſeu bac- cis; quæ omnia ad nigredinem comburuntur ad- ditis ſapone, & mele.

*Art. 1649. Pulveris preparatio.* Recip. putami- num ovorum mundat; & probe exſiccator, q. v. quæ manibus contrita indantur in crucibulum duodecimæ magnitudinis, h. e. quod volumen trium aquæ librarum contineat. Igni impoſito hoc crucibulo latere obtecto, & carbonibus ſuf- que deque onerato, putamina contenta tamdiu calcinentur donec colorem ſubfulcum, ſaporem- que falſo-acrem induant. Huiusmodi operatio tempus octo horarum ſaltem exigit. Finita ope- ratione calcinata putamina in vaſe figulino mun- doque locantur, ut vaſ ad tres quartas partes repleant, unde humectata ſat ſpatii ſe ſe dila- tandi nanciſcantur; tum in loco ſicco reponi- tur vaſ, ibique apertum per duos meſes nec diutius relinquitur. Hoc enim temporis inter- vallo putamina amabiliorem ſaporem acquirunt, atque aptiora evadunt, ut pulverata per tenuiſ- ſimum ſetaceum cribrando trajicere poſſint.

Similiter cochleæ hortenſes cum ſuis teſtis probe purgata in crucibulum ejusdem capacita- tis indita, ad ignem, ut in præcedenti opera- tione comburuntur, quouſque effumare deſinant  
vide-



videlicet integræ horæ spatio, nec quidquam diutius. Tum iisdem eductis in mortario conterantur, donec in subtilissimum pulverem facescant, qui valde obscurum colorem reddere debet.

Si mineralis carbo adhibetur, necesse est, ut ignis cito superiores crucibuli partes occupet, lateribus crucibulum obtegentibus majores carbonis frustulos jam antea inflammatos imponere non autem recentes, & nondum ignem passos.

Diligenter hisce præparatis pulveribus simul miscendæ sunt, de pulvere putaminum partes vj. & pulv. cochlear. par. j., easdem in mortario diu agitando, tum per tenue setaceum trajiciendo, atque pulvis in vitreis phyalis conclusus in loco sicco pro usu asservatur. Additum vero semper fuit huic pulveri tantillum nasturtii sylvestris ad nigredinem combusti indeque pulverati, sed hoc quidem nullo alio intuitu susceptum est, nisi quod magis remedii ingredientia laterent.

Præparari quidem putamina quolibet anni tempore possunt, tempus vero magis opportunum æstivum est. Cochleæ tamen nisi mensibus Maji præparandæ sunt, vel Junii, vel Julii, vel Augusti, sed omnibus hisce mensibus Majus præferendus est.

*Art. 1650. Decoctionis præparatio.* Recip. Saponis Alone optimi unc. iv. contundantur in mortario, cum pleno cochleare nasturtii sylvestris ad nigredinem combusti atque tantundem mellis, donec pastæ consistentiam acquirant, tum fiat globulus. ℞. Hunc globulum taleolatim incisum fol. vel flor. chamæmel. fol. fœnicul. pterfil. bardanæ ana unc. j. vel loco harum, si recentes haberi nequeant, aripiatur de earum radici-

236 *Calculus Renum & Vesicae. CAP. VII.*  
dicibus ana unc. j. quibus incisus coquantur per  
horam dimidiam in aquæ communis lib. v. &  
colatura melle edulcoretur.

*Art. 1651. Pillularum preparatio.* ℥. Cochlear.  
calcinat. semin. dauci vulgaris, bardanæ, fructus  
Fraxini, Rosæ sylvest. baccar. oxyacanth. ana part.  
æqual. ad nigredinem comburantur, seu quod  
perinde est, usque dum nullum fumum amplius  
reddunt, & simul misceantur, inde in morta-  
rio pulveratis, per tenue setaceum trajiciantur.  
℥. Hujus pulv. cochleare j. sapon. alone optim.  
unc. iv. mellis q. s. m. f. pillularis massa de cujus  
singulis uncis reformentur pillul. lx.

*Art. 1652. Ratio hujusmodi preparationes usur-*  
*pandi.* Quando calculus in renibus, vel vesica  
adeft ter in die pulvis sumi debet, mane nem-  
pe post jentaculum, quinta vel sexta hora a  
prandio, & noctu ante decubitum, ad drachmæ  
dosin, vel ad gr. lvj. in vini albi cyatho, aut  
cum liquoribus in anglia usitatis qui *Cidre*, &  
*Punch* dicuntur. Post singulam dosin decoctio-  
nis frigida, vel tepida unc. viij. propinantur.

Principio subinde talia remedia plurimum fa-  
stidiuntur, quo casu exhibendum est ægro opia-  
tum, etiam, ubi opus, reiterandum.

*Cautela* *Art. 1653.* Si vero ægri alvus segnis fiat, ele-  
*& mo-* *stuarium lenitivum, vel quodvis aliud laxati-*  
*nitus.* *vum præscribi debet, toties quoties solummodo*  
venter non deponit; quia maxima attentione  
incumbendum, ne diarrhœa superveniat, quæ  
nimis prærupte remedium nullo edito effectu  
educeret; quare si forte eadem accesserit tunc  
pulveris, qui adstringente virtute gaudet, dosis  
augebitur, vel eadecoctionis imminuetur, utpote  
laxativæ, vel etiam ad aliud auxilium ex Me-  
dici consilio confugiendum erit.

Sub horum remediorum usum nec falsis edu-



liis vescantur ægri, nec lac vel vinum rubrum hauriant, sed paucis liquidis contenti esse debent, modicaque corporis exercitatione vacare, ut urina magis remedio saturetur, diutiusque a vesica retineatur.

Si stomachus ægre decoctionem perferat, post singulam pulveris dosin, sexta pars globuli pro pillulis præparati devorabitur.

Si ætas invalescat, & ægri constitutio debilis, aut plurimum doloribus, & appetitus jactura confecta, in pulveris compositione major quantitas cochlearum calcinatarum admitti debet, & prout occasio exiguerit, etiam augere eo usque dosin cochlearum licebit, donec æqua portio putaminum, & cochlearum pulveris interveniat. Ob eandem rationem utriusque pulveris quantitas non minus ac ea decoctionis imminui poterit, semper tamen laudabilius utiliusque erit, si æger consuetam dosin perferre potuerit.

Præmemoratis herbis ac radicibus D. *Stephens* aliquando alias substituisse perspectum est, [ut malvam vulgarem alth. millefol. rub. & alb. taraxacum, nasturc. aq. & radic. cochlear. folio cubitali; quibus in plantis nullam profecto essentialem differentiam comperimus.

Præcipuus usus pillularum est, in arenularum accessu, doloribus renum vomitibusque conjuncto, tum etiam in suppressione urinæ ab ureterum obstructione producta. Hæc ubi adfuerint necesse est, ægro qualibet hora diu noctuque maxime si insomnis sit, quinque pillulas devorandas exhibere, quousque dolores leniantur. Qui arenulis subjiciuntur, iisdem uti possunt, quotidie ad numerum x. vel xv. spe fore ut earum efformationem prohibeant.

*Art. 1654.* Judicium quod Cl. *Meadium* adtulisse de hoc remedio mihi visum est, ex se-  
Hujus  
remedii  
judiciū.  
 quen-

quentibus patet: Magnopere autem, inquit, cavendum est, ab assiduo illorum medicaminum usu, quæ magna vi urinam cient; præsertim ubi id agitur, ut nullæ fiant in renibus arenularum concretionēs: illa enim, quantumvis de iis magna promittant rerum ignari, acrimonia sua, & calore partes labefactant, & lædunt. Neque temperare mihi possum, quin dicam in opprobrium nuper medicis nonnullis cessisse, quod insano pretio redimendi anile remedium magnatibus auctores fuerunt; quo ipsos etiam in vesica calculos in ramenta comminui, & hinc foras per urinam pelli posse, vana spe delusi spondebant. Erat medicamentum hoc ex sapone, calcibusque testaceorum non unius generis confectum; quod nemo non videt, virtute summæ caustica pollere. Monstrabatur interea coram populo in rei testimonium calculosa massa una, & altera, ex vesica illorum, qui illud assumpserant exacta, inæquali superficie, & foraminibus hic illic quasi erosa; quas caver-nulis notas esse, & indicia medicaminis, vim suam exerere jam incipientis, credi voluerunt. At scivisse debuerant, non raro calculos in vesica nasci ita conformatos, ut speciem lapidis hic illic exesi præ se ferant; id quod ipse non semel vidi.

Hoc ipsum remedium plurimi ex Academia Regia Scientiarum Parisiensi experti itidem sunt, indeque cognitum effectus promissis omnino non fletisse; quare ubi de renum, aut vesicæ calculo agitur qui præ magnitudine nec a renibus, per ureteres in vesicam, nec a vesica per urethram ad matulam egredi potest, ad cultrum seu scalpellum chirurgicum confugiendum est, iis in locis secando, per quæ corpus durum naturalium amplitudinem longe excedens denique auferatur.



## NEPHROTOMIA.

*Heisteri sententia.*

*Art. 1655.* Haud alienum ab instituto nostro esse existimo si, an in calculo renum sectio locum quoque habeat, hic paucis disceptaverim. Plerique, qui hac de re aliquam in scriptis suis mentionem injiciunt, negotium hoc nimis periculosum judicant, adeoque & illud prorsus rejiciunt. Sed præsto sunt observationes ægrorum a vulneribus renum, quæ a tergo acceperant sanatorum; & quidem interdum sine adeo gravibus symptomatibus. Ut enim alia mihi nota exempla nunc taceam, anno 1735. vir quidam in vicino oppido ab alio in dorso, & quidem renis dextri regione satis amplo vulnere, ictu cultri vulnerabatur, ita ut per plures dies sanguis, aut urina sanguinea per vulnus, & urethram redderetur copiosa, attamen postquam huc Helmstadium translatus, meæque curæ subiectus est, intra quatuor fere hebdomadas foelicitè sanatus est. Adeoque certissimum est, vulnera omnia renum, præsertim si a tergo infliguntur, & in cavum ventris non penetrant, non esse mortifera, ut nonnulli putant, sed sæpius sanari.

*An nephrotomiam instituere liceat*

*Art. 1656.* Hippocrates licet a sectione calculi vesicæ suos discipulos dehortetur, tamen ubi de renum morbis agit, docet: cum intumuerit, & elevatus fuerit, sub idem tempus juxta renem secato, & extracto pure arenam diureticis sanato. Si enim sectus fuerit, evasione spes est; sin minus, homini commoritur. Alibi item ait: cum suppuratus fuerit ren, circa spinam intumescit; hunc, ubi sic habuerit, circa tumentem partem

*Auctoritate Hippocratis confirmatur.*

*rem secato*, profunda maxime sectione juxta renem, immo in simili casu præcipit ut in ipsum renem secemus. Unde apparet ipsius renis incisionem, ubi ea opus judicavit, non reformidasse.

Ita & *Rossetus*, & *Jo. Riolanus* alique judicant nephrotomiam non sine fructu sæpius institui posse, si modo ille locus incidatur, ubi calculus percipitur, cavendo ne arteria aut vena emulgens, aut ureter incidatur, & ne vulnus in abdominiscavum penetret. Id enim eximius Medicus, & Chirurgus *Lavaterus* in hujusmodi casu foeliciter perfecit, & nephrotomiam renis alterius, natura per abscessum viam demonstrante, celebrare profitebatur.

Adeoque non perspicio rationem quare a quamplurimis prorsus damnetur, sed potius chirurgos exhortor, ut eam natura viam demonstrante, non intermittant, quemadmodum nec ego eam intermitterem: quia hac ipsa non solum vita ægri servari, verum etiam ii a sævissimis cruciatibus, calculo per uncum, vel digitos, vel forcipem educto, liberari poterunt.

## L I T H O T O M I A.

*Varia lithotomia methodi.*

*Art. 1657.* Lithotomia est, operatio chirurgica, qua calculus per aperturam incisione factam extrahitur. De lithotomia renali seu nephrotomia jam modo meminibus, & satis dictum est; remanet autem lithotomia vesicalis, quæ ad calculum in vesica urinaria existentem extrahendum peragitur. Hæc quatuor modis fieri potest. Prima methodus vocatur sectio Celsi, vel antiqua, vel cum parvo apparatu; Altera respectu prioris methodus nova, seu cum magno apparatu, & anno 1520. Romæ a *Johanne de*



*de Romanis*, primum adhibita: tertia dicitur methodus alta seu major seu cum alto apparatu, quæ multam similitudinem habet, cum operatione Cæsareana anno 1560. primum Lausannæ a Petro Franck usurpata: quarta demum methodus Fratris Jacobi dicitur circa annum 1720. primum administrata. Ex hisce methodis, cum quæ ex majore apparatu fit ceteris præstet, de ea tantum verba faciemus.

*Junckeri sententia.*

*Art. 1658.* Æger mensæ stabili imponitur substratis ad excipiendum sanguinem linteis duplicatis, & suppositis dorso, ac lumbis pulvinaribus compactis. Genua diducta sic complicantur, ut calcanei natibus proxime admoveantur. Duplici habena e cervice propendente, & circum axillas hinc, & inde voluta, fœmora cum tibiis, & pedes cum manibus, sub varia laqueorum circumductione firmiter ligantur, insuper æger a tribus robustis ministris immobilis tenetur.

*Lithotomia descriptio.*

Tum Chirurgus catheterem fulcatum oleo madidum vesicæ immittit, exploratoque calculo catheteris curvaturam versus perinæi sinistrum latus adigit. Quartus minister scrotum tollit, ejusque futuram, dum in dextrum latus illam retrahit, ab incisionis loco removet, qui simul catheterem in vesicam immissum tenet, & ita apprimit, ut curvatura illius fulcata urethram versus perinæum appellat. Nonnulli autem Chirurgi, & catheterem tenent, & incisionem faciunt.

Deinde Chirurgus perinæum dextrorsum paululum trahit, & scalpello fasciola circumvoluta, in sinistra regione, supra catheteris promi-

mentis sulcum facit incisionem, quæ in medio circiter perinæi loco facta, & deorsum ducta in pueris referre debet longitudinem duorum, in viris autem trium digitorum transversorum; cavendo ne intestinum rectum lædatur.

Facta incisione, & retracto scalpello *conductor mas* vulneri immittitur postea catetere ablato, *conductor femina*, cui mas viam monstrat etiam immittitur. Alii *conductorem Hildani*, quem Galli *gorgeret* appellant, loco horum adhibent. Dum manus sinistra hæc instrumenta tenet, dextra forcipem dentariam, ætati & vulneri convenientem ita applicet, ut vulnus non ad latera, sed perpendiculariter dilatetur, alterque conductorum deorsum, alterque sursum a forcipe adigatur.

Retractis conductoribus operator ad dilatandam vesicæ cervicem, forcipem utraque manu apperit, postea illam quodammodo iterum contrahit, omnino autem non comprimit, ne vesicam divellat. Hac ratione huc illuc forcipem movendo calculum quærît, & repertum sic apprehendit, ut intra forcipis alas situm extractioni idoneum ipsi conciliet. Tunc eodem pene momento triplici motu, nempe extrorsum, & in utrumque latus, seu spiraliter facto, calculus extrahitur.

Quando autem calculus juxta pubem, vel ad latera hæret, & ita forcipe recta non potest prehendi, curva adhibenda est. Quod si vero ratione molis per vulnus extrahi non possit calculus, situs illius inverti, & ita extractio tentari debet. His initis vulnus scalpello ampliandum, donec satis patens sit. Nonnulli forcicem adhibent, quæ non æque commoda est; alii instrumentum dilatatorium peculiare applicant, quod tamen nullius usus est. Habent etiam peculiar-

rem



rem forcipem, qua calculum nimis magnum in vesica diffringunt. Quando autem neque diffringi, neque post vulneris ampliationem extrahi potest, ab operatione desistendum.

Extractus calculus si valde politus appareat, aliorum in vesica latentium suspicionem præbet, qui proinde etiam quærendi, & extrahendi sunt. Mollis & arenosus calculus vix extrahi poterit, quin comprehensione sui frangatur, & intra vesicam fragmenta quædam relinquat. Hinc ne novus facile oriatur, specillo recurvo crassiore, & obtuso, gallice *un bouton*, vesicæ cavitas exploratur, & si quid lapidei reperiatur, forceps iterum atque iterum inseritur. Tandem *specillum auricularium* applicatur, & per hoc interiora vesicæ ab arenulis, lapillis, aut sanguinis grumis repurgatur.

Quando calculus vesicæ parietibus sic adhæret, ut citra ingentem fibrarum dilacerationem removeri non possit, is tamdiu finendus est, donec superveniente suppuratione sponte excidat, aut facilius eximi possit.

Si caro fungosa intra vesicam, aut ejus cervicem alicubi succreverit, illa forcipe nunquam avellatur, sed vel suppurationi committatur, vel si fieri potest, scalpello dextre præscindatur.

Quodsi nimium laboriosa etiam operatione, æger de vita periclitetur, calculi evulsio in alium diem differenda est, donec vires restauratæ sint.

Lithotomia peracta, & vinculis solutis, æger in lectum ponitur, ubi vulnus linimentis, emplastris, & spleniis obductum, probe deligatur, & quidem fascia illa, quæ formam II refert.

Deligatio hæc quotidie repetitur, & quidem primis diebus unguentum digestivum linteo car-

pto applicatur, & fascia lenissime stringitur; quarto, autem circiter die major fasciæ strictura, vel pro re nata emplastrum glutinans adhibetur, donec tandem sub usu selectissimorum balsamicorum consolidatio obtineatur. Interea non opus est, ut æger cubando totam curationem absolvat.

*In foeminis* parvo existente calculo non opus est sectione, quia iste ab urina in vesicæ cervicem facile propellitur. Unde dum amplior, & brevior urethra est, quam in viris, non raro sine auxilio externo eliminatur. Quando autem calculus in urethra impactus hæret eadem prorsus methodo educitur, quam *Celsus* docet. Ceterum calculum in vesica latentem ordinarie ita extrahunt ut conductores, & deinde forceps urethræ immittantur, atque per hanc viam calculus eliminetur. Nonnulli autem recentiorum calculum foeminarum prægrandem æque ac in viris, per sectionem in perinæo extrahendum commendant, ut incontinentia urinæ, quam alias foeminæ plerumque incurrunt hac ratione avertatur.

*Ab operatione  
ratione  
pregnatio-  
nis.*

*Art. 1659.* Quando post operationem respiratio facilis, sitis modica, abdomen non adeo tensum, lingua madida, febris levior, & dolor mediocris reperitur, de bono operationis successu spem concipere possumus. Quando autem contrarium apparet, præterea vulnus hiat, urina per illud effluit, alvus non respondet, vehementes dolores adsunt, fastidium a cibis permanet, post quintum diem febris exquisita urget, & denique æger in ventrem cubare amat, nihil boni sperandum est. Hæmorrhagiæ insignes; inflammatio vesicæ, quam abdominis tentio manifestat, conatus vomendi, aut ipse vomitus, deliria, convulsionisque signa plerumque sunt funesta.

*Alia*



Alia etiam symptomata facile accidunt, quæ in futurum partim incommoda, partim pericula minantur, ex. gr. fistula in loco incisionis, quæ quia urina continuo per illam effluit, & ordinarie callositates habet, non facile consolidatur. Excretio urinæ involuntaria a diffecto, vel lacerato vesicæ sphinctere. Generandi impotentia ob vesicularum seminalium læsionem. Abscessus in partibus vicinis, præcipue in scroto.

Monendum denique in viris calculo laborantibus incidi perinæum, vel ipsius vicinia, in foeminis urethram; in infantibus autem, & pueris operationem minori apparatu institui debere de quo vide *Celsum*, *Heisterum* aliosque nec non ipsum *Junckerum*.

## M I C T U S . I M P E D I T U S .

*Cœli Aureliani sententia.*

*Art. 1660.* Est præterea urinæ reddendæ impedimentum, quod Græci *Stranguriam* vocant, mictus officium retardatum. Difficultas autem, quam iidem *dysuriam* appellant, quæ id adjuncto dolore ingerit. Impossibilitas autem quam *ischuriam* vocant, perfecta ejus officii negatio.

*Mictus  
difficilis  
species  
sen gra-  
dus.*

Sed hæc tria accidentia, quæ Græci symptomata vocaverunt, nunc stricturæ sunt appendicia, cum tumor vesicam tenuerit, sive durities, sive paralyxis, vel tensio, ut quidam volentes urinam usu solito ac naturali deponere, obstantibus causis, longo tempore continentes officii dilatione vexentur; aliquando demum rerum alienarum obstructione vesicæ impedito meatu: aut lapidis, aut arenæ, aut capillorum, aut squa-

mullarum furfuris similiū, vel quocumque sedimine crassiore.

*Prognosis.*

*Art. 1661.* Quoad prognosin observat *Hippocrates*, urinæ stillicidia in hydropicis siccis mala esse, ejusque interceptionem in biliosis cito occidere. Addit insuper ajendo: Urinæ cum rigore suppressæ malæ, & convulsoriæ, tum alias, tum si quis antea gravi sopore pressus sit. Quibuscumque ex urinæ stillicidio volvulus accedit, ii in septem diebus pereunt, si non febre accedente urinæ satis fluxerit.

*Causa. & signa.*

*Art. 1662.* Præterea ex eodem *Hippocrate* plurima causarum signa indicantur. Inquit enim stillicidia, & difficultates urinæ senibus accidunt præsertim tempore autumnali. Urinæ stillicidium habenti partes circa vesicam sunt affectæ lib. IV. aph. 8. quod confirmat lib. V. aph. 58. ubi ait: urinæ stillicidium intestino recto, & utero inflammato accedit.

*Prognosis.*

*Art. 1663.* Sunt autem addit *Aurelianus* vesicæ vitia, vel passionēs generaliter curatione difficiles. Est enim natura nervosa, & altioribus insita locis, atque celata, & quæ corporis superflua sustineat acriora.

Sed mictus impediti singulas species seu potius singulos gradus seorsim describere expedit, ut in sequentibus habemus.

### *Placentini sententia.*

*In viarum urinae morbis quanam vesicae se-  
canda.*

*Art. 1664.* Ut in morbis uteri, ita in iis quoque renum, intestinorum, testium, & vesicæ raro inferiores venæ incidendæ sunt, sæpe superiores, quod apparet ex vasis, quæ in has partes sanguinem infundunt.

Cum vesica, intestinum rectum, & hæmorrhoi-



rhoides sanguinem recipiant, tum ab hæmorrhoidali ramo iliaca internæ, quæcum externa acutum angulum efficit, tum, ut verifimile est, ab arteria sacra, quæ inter utramque Iliacam in ipso divisionis angulo recta fere deorsum procedit; illud plane consequitur, ut, sectis venis inferioribus, sanguis celerius influat in easdem arterias, tum aperto illarum foramine, tum aliquanto postquam clausum est, ac morbi ejusdem vesicæ, intestini recti, & hæmorrhoidum exasperentur. Quare in morbis harum quoque partium superiores venæ plerumque incidendæ sunt, raro inferiores; ut, revulso ab iisdem partibus sanguine illis succurratur.

*Art. 1665.* Hinc licet intelligere, Hippocratem, & Galenum cum Græcorum plerisque superiores venas recte quidem incidisse in morbis partium supremi, medii, & infimi ventris usque ad hepar, parum tamen recte (sit venia dicto) fere semper incidisse venas inferiores in morbis partium infimi ventris, quæ sunt post hepar, ) & singulariter in morbis vesicæ. Hippocratis enim præceptum est, in urinæ difficultatibus interiores pedum venas secandi.

*Art. 1666.* Sectionem venarum superiorum in iisdem morbis partium infimi ventris, quæ sunt post hepar, perexiguam ab illis revulsionem facere abnuere debemus, atque inde perexiguum, ut revulsiva est, iisdem partibus emolumentum afferre, negandum tamen non est sectis in iisdem morbis venis inferioribus, magnam fieri ad easdem partes derivationem, atque inde magnum plerumque in earum morbis detrimentum importari. Prudens autem Medicus prodesse quidem semper, etsi parum possit, debet, numquam tamen nocere.

Inferiorum venarum sectio magnum plerum-

*Veterum  
græcorum  
sententia.*

*Quæ non  
semper  
prose-  
quenda.*

que in dictarum partium morbis detrimentum importat non autem semper. Oñsum enim nobis est, cum obstructio recens est, & lævis, atque in homine, qui neque pravis humoribus abundat, neque plethora laborat, sanguinem, aucto per sectionem earundem venarum motu abripere illam posse, & earundem partium morbos remove.

Ex his satis apparet in morbis partium, quæ sunt post hepar raro quidem contra consuetudinem Hippocratis, & Galeni inferiores venas esse incidendas, interdum tamen utiliter incidendas esse, ut ratione, & auctoritate præclariss. Medicorum, qui ex professo de iisdem morbis tractaverunt, demonstrare conatus sum.

## ISCHURIA RENALIS, & Vesicalis.

### *Etmulleri sententia.*

*Ischuria* *Art. 1667.* Ischuria & urinæ suppressio totalis *quid.* differunt saltem gradu; quandoque in ipso sanguine hæret causa, sed frequentius accidit ob renum vel vesicæ vitium; ob prius: quando nulla urina sit in vesica, nullus tumor circa regionem pubis, nulla gravitas perinæi, ubi immisso cathetere urina nulla extrahi possit. *Causæ & symptomata.* Causæ sunt vel calculi vel renum ἀνωρία. Symptomata sunt angustia præcordiorum & anxietates, aliquando sudor foetidus & urinosus, torpor sensuum, vomitus, &c. Fere ad 10<sup>am</sup> vel 11<sup>am</sup> diem supprimi potest ante mortem, aliquando die 14. moriuntur, raro ad 20<sup>am</sup> vivunt; si tamen adsit sudor copiosus, interdum diutius supervivunt: quæ ab ἀνωρία, vel resolutione renum fit, fere semper lethalis evadit.

*Art.*



CAP. VII. *Ischuria Renalis & Vesicalis.* 249

*Art. 1668.* In hoc affectu laudantur succus *Curatio.*  
*rad. raphan.* & succus *limonum* (*sp. cochlear.* vel  
*succ. ejusdem*) item succus *parietariæ* in antiquis  
parietibus nascentis, præ omnibus *sal succini*; si  
malum sit spasmodicum *cinnab. antimon. mille-*  
*pedes, cantharides* in substantia & tinctura, infu-  
sum *fimi equini* in vin. *Rhenan.* egregium reme-  
dium, ut etiam *stercoris columbini*. Pro usu ex-  
terno linimentum sequens, *℥. Unguent. dialth.*  
*ol. scorpion. ana ℥℥. petral. ℥ij. tereb. (junip. ana) gr.*  
*xxx. m. f. liniment. pro regione lumborum.*

*Art. 1669.* *Ischuria vesicalis* a vitio vesicæ pro- *Ischuria*  
venit, & a variis causis pendet; ut plurimum *vesica-*  
die *ii.* necat; pessimum est signum, quando *lis.*  
nullum sentiant dolorem.

*Art. 1670.* Si adsint causæ impediētes tran- *Curatio.*  
situm urinæ, hæ sunt imprimis removendæ; si  
casus sit paralyticus, usurpanda sunt nervina in-  
terne, & externe, laudatur *oleum succini*, *cly-*  
*steres terebinth.* cataplasma ex *parietaria cepis sub*  
*cineribus coct.* & *ol. scorpion.* convenit etiam *semi-*  
*cupium ex emollientibus & nervinis* exhibendo  
paulo ante incesum *blanda diuretica*. Immer-  
sio subitanea pedum ægri in *aqua frigida* uri-  
nam provocat.

*Fulleri sententia.*

*Art. 1671.* Suppressio urinæ totalis, quæ fit, *Ischuria*  
non a renibus, ductibusque urinariis lapide, fa- *ex san-*  
bulo, mucove obstructis; sed a sanguine ipso *guinis*  
confuso, nimis stricto, & adeo obferato, ut la- *discre-*  
ticem aquosum intimius permixtum e sinu suo *sia.*  
ægre dimittat: cujusmodi casus retulerunt *Ri-*  
*verius, Voillisius, Sylvius*, atque inter medici-  
nam faciendam ipsemet etiam aliquoties obser- *Ejusdem*  
vavi; exindeque eum agnovi, quod nullus do- *curatio*  
lor

lor vel lumborum vel pubis præcesserat; & vesica (teste cathetere) urinæ omnino vacua fuisset: hæcce inquam notabilis & (nisi tempestive & rite tractetur) lethalis urinæ suppressio curatur (D. Baynard. monstrante viam) per *spiritum vitrioli nitriæ* in vehiculo idoneo liberaliter propinatum, atque eo certius, ut opinor, si *venæsectio* præmittatur. Hujusce instantias apud *Philos. Transact.* N. 215. lectu & observatu dignissimas videre licet. „Sæpius in praxi experimur (inquit *Waldschmidtus*) , quod senes „ *urinæ suppressione* corripiantur, quandoque cum „ alio graviori morbo, quandoque sine eo, & „ talis urinæ suppressio plerumque solet esse lethalis; oritur enim a deficiente secretionem spirituum in cerebro, tum fermentorum in visceribus, ut & feri in renibus, ut recte „ totalem viscerum obstructionem & lymphæ „ coagulationem hic accusamus: si enim esset „ a calculo, tum dolor lumborum adesset, & „ reliqua calculi symptomata.

Senes  
huic  
morbo  
sunt pro-  
clives.

*Pujati sententia.*

*Ischuria convulsiva species.* Art. 1672. In acutis, urinas convulsorio modo intercipi haud infrequens est in *Hippocrate* legere, Ischuriam vero a nervorum distentione fieri, rarum admodum legitur apud Practicos, & Observatores. Neque enim memini nisi apud *Ettmullerum* me legisse hujusce mali causam quandoque esse pertinacem sphincteris spasmus a doloribus abdominis convulsivis exortum. Cum igitur observatio a me habita novam ferme morbi ideam medentibus objiciat, operæ pretium duxi eam clinicis exhibere.

*Ejus curatio.* Art. 1673. Casum enarrat rustici cujusdam gracilioris sicciorisque corporis habitus annorum



CAP.VII. *Ischuria Renalis & Vesicalis.* 251

50. vino indulgentis, atque ab infantia morbo sacro obnoxii, cui dum æstivo tempore magis magisque a convulsivis insultibus exerceretur, bini parvi tumores supra spinam ossis sacri erupere, & tunc aliquali prius difficultate in lotio reddendo per 7. aut 8. dies, demum legitima ischuria laboravit. Hic vix mixturæ sequentis quatuor haustis cochleariis quod bis minxit, atque dolore, & tensione ad pubem liberatus est. ℞. *Aq. succ. meliss. unc. vj. liq. C. C. succin. ℥j. sem. laud. liq. sydenh. gutt. xvj. m.* Emolliens antea ei injectum fuit clyisma, pertusaque vena pedis cum octo sanguinis unciarum educatione, tum etiam inuncta spina dorſi essentia rorismar. ol. spicæ, succinique stillatitiis, pubisque regio ac Perinæum ol. ex scorpionibus Matthioli. Ab assumpto igitur paregorico postridie alvus ei subducta fuit flor. Cassiæ cum conf. viol. ac Tart. crem., neque inde rediit Ischuria. Tumores curabantur a Chirurgo.

*Farrago sententiarum.*

Art. 1674. Nullus hoc morbo laborans super- Diem  
xviij. non  
superui-  
vunt.  
vixit diem xvij. uti hoc in mea praxi observa-  
vi. *Greenfield.*

Art. 1675. In ancipiti casu & moribundo ex Renre-  
diū sin-  
gulare.  
*ischuria* plurium dierum, aliis medicis dimissis hominem sic restitui, ℞. *Succ. limon. recens ex-press. ℥vj. succ. cochlear. hortens. ℥iv. hepatic. plap-tag. ana ℥ij. violar. ℥ij. m.* hujus ℥iv. tertiis quibusque horis succavit, & postridie urinam copiose reddidit. *Lister.*

Art. 1676. *Apes siccata* in pulverem redactæ Pulvis  
apum,  
propinentur *vino albo*, urinam paulo post pro-  
vocant, N. iij. sufficiant ut plurimum. In se-  
ipso

ipso Ischuria laborante sæpius expertus est *Hibernia primarius Armaghanus. Majerne.*

*Remedia alia.* Art. 1677. *Bals. copav. ad ℥j. vel ultra, decoct. incrassans, haust. diuretic. acid. & pil. diuret. Fullerii usui esse possunt, item expressio diuret. seq. Vuillisii. ℥. Milleped. viv. tinct. sal. tart. ana ℥ij. contunde, & fortiter exprime Dos. gr. xl. vel l.*

## S T R A N G U R I A

*Tralliani sententia.*

*Causarum strangu-ria di-agnosis.* Art. 1678. Urinæ difficultas partim cum dolore, partim sine dolore oritur. Si igitur *urina* vix, & cum dolore excernitur, scire licet vesicam morbo laborare, sin autem cum rosione vehementi etiam pus excernatur, & citra gravitatem, ulcus esse in vesica suspicandum est. Si vero gravitatis sensus accedat suspicabitur magis, aut de inflammatione, aut de abscessu, si absque gravitate dolor, aut distentio sola percipiatur retentionis causa erit spiritus copiosus, & flatulentus, & si æger nullum dolorem, aut tumorem, aut distentionem circa vesicam sentiat scito obstructionem, aut calculum in renibus, vel meatibus urinariis existere.

Præterea si acrimonia quædam in urinis, & totus habitus ad acriorem biliosioremq; fuerit conversus, conjiciendum prorsus est, stillicidium ob rosionem, quæ ex acrimonia provenit, excitari; sin autem nihil tale fuerit, sed contra & *urina* magis alba appareat, & ea quæ præcesserunt frigidiora, frigida potius intemperies vesicæ causari debet, quæ urinam non finit evenire.

*Earumdem curatio.*

Art. 1679. Ad obstructionem urinarum quæ

cx



ex viscosis humoribus nascitur, bene facit oxymel, & mulsa, & decoctum rhamni, quod ex radice ipsius fit, item origani decoctum, ac magis adhuc, si magna obstructio fuerit, ut urinæ retineantur, efficax est corticis tithymalli decoctum, quod incidit, & aperit.

Si quidem acrimonia fuerit, humectantibus, & contemperantibus, nullo calido, aut falso utendum est. Omnino igitur ptisana his utilis est per se, & cum modico hydromelo, aut chrysattico, interdum etiam cum lacte. His apta sunt etiam continua balnea, & aqua tepida ante cibum, & cucumerum medulla, & pepo, & germina fœnugræci, & uva dulcis, vinumque dulce, quale est Bithynum.

At si stillicidii vitium ob frigidam intemperiem fieri contingat, iis quæ calefacere possunt, & in victu, & in medicina uti necesse est. Vinum igitur calidius his est idoneum, mulsum absinthites. Inter olera apium, porrum, daucus, & quicquid citra rosionem calefacit. Interdum scordii, & artemisiæ decoctum ad stillicidium, & difficultatem urinæ benefacit, ubi non est multa acrimonia, aut inflammatio.

### *Ettmulleri sententia.*

*Art. 1680.* Stranguria, Latinis urinæ stillicidium, est quando urina guttatim excernitur cum acerbo dolore & continua stimulatione ex acore urinæ; ulcus vesicæ interdum pedetentim sequitur. *Stranguria quid.*

*Art. 1681.* Exhibendum est *emeticum* cuius vires magnæ sunt in affectibus urinariis, item *taxantia* cum *mercurio dulci*, *rad. liquiritiæ cum fol. malv.* in jure pulli, decoctum *cort. aurant. opiata*. Pro euporisto decoctum *raparum* remedium *Curatio.*

dium sine pari, decoctum *sem. cannab. ol. amygd. dulc. syr. de alth. succus cancrorum fluviat. decoctum bacc. alkekengi cum passulis*. Conveniunt *clysteres emollientes, injectiones in vesicam ex lacte cum ol. amygd. dulc. &c. Thermae* etiam profunt.

*Pujati sententia.*

Stran-  
guria  
potior  
causa.

*Art. 1682.* At nunc mihi illud animadvertere liceat, quod nescio an a practicis huc usque satis animadversum sit. Ajunt equidem inter stranguriæ causas esse humores acres in vesica productos; at horum humorum genesis clariorem ideam nobis minime objiciunt.

Mihi itaque sæpe animo subiit, an non vitata secretio illius humoris, qui e glandulis nervæ internæ vesicæ tunicæ extillat; vesicam irritando difficultatem urinæ quandoque non pariat? Sic ab acriore lymphæ per glandulas Epiglottidæas, Aritenoidæas, trachæales secreta, muscularibus trachææ fibris crispatis, & homo ad tussendum subinde impellitur, & respiratio vitatur. Forte etiam omnino sublata quandoque mucii vesicalis secretionem, contra irritantes urinæ sales, nuda vesica exponetur, vitiumque in lotio reddendo manifestabitur; quæ omnia a cl. Hestieri adnotatione illustrari videntur, qui animadvertit glandulas dictum mucum ex Graafio, & Dracke secernentes, circa vesicæ collum magis conspicuas apparere, ubi nempe mejendi stimuli a stranguriosis percipiuntur.

Omnia hæc non ita a ratione abhorrentia mihi videntur, ut ea sapissime contingere non credam; potissimum quia Cous Senex inter morbos, qui senes corripiunt, quos a defluxionibus cum tussi; ab articulorum doloribus, a totius

cor-



corporis pruritu; aliisque morbis, five a crasso, five ab acri phlegmate provenientiibus tentari dixit, urinæ quoque stillicidia, difficultatesque numeravit. Quin praxis quotidiana ostendit, senes eos potissimum stranguriosos fieri, qui mucis, seu lymphæ acriore scatent.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1683.* In ardore urinæ magis afficitur *Strangu-* urethra, & sphincter ab ejusdem urinæ acrimonia, quod inde constat, quia retineri potest per *ria a* aliquod tempus, donec ejus quantitas fuerit collecta, & tunc demum, quando excernitur, doloris sensus percipitur, in stranguria vero ureteres, & vesica magis afficiuntur, hinc etiam dum per ureteres, vel guttula urinæ destillat ad vesicam statim, & in his, & in vesica dolorem atque stimulum ad excretionem inducit, hinc hoc in affectu continuo mingere conantur ægri. *dysuria differencia.*

*Art. 1684.* In Cura ante omnia intentio dirigatur ad acrimonie correctionem, quæ obtinetur: primo per diluentia, copiosum potum. aquæ fabarum ex consilio *Sennerti*, vel aquæ extinctionis fabrorum &c. deinde per absorbentia terrea, oculos cancr. lapides &c. tertio per viscida, & glutinosa, massichen, thus, gumm. arab. tragacanth. terebinth. mucilag. sem. psyll. & cydon. lac bubul. & caprin. emuls. sem. quat. frig. maj. min. amygdal. & castanear. decoct. ptisanæ & rapar. passar. rad. malv. glycyrrh. &c. quibus non male si dolor fuerit nimius anodyna: ut sunt sem. papav. alb. & hyoscyam, vel crocus adduntur. *Stranguria curatio.*

*Langius.*

*Art. 1685.* Non inconueniens quoque erit *Maxime per injectiones.* cuncta hæc glutinosa, & pinguis, vel loco illorum

rum albumen ovor. conquassat. terebinth. cum album. ovor. subactam, & sub emulsionis forma; aut mel dilutum, vel balsamum sulph. vel de Copayva in ipsam vesicam per urethram immittere: longe enim citius inviscationem acrimoniæ præstabunt, quam interius sumpta; in primis si jam erosa, & inflammata sunt interiora.

*Quæ a phlogosi diluentia reposit.*

*Art. 1686.* Stranguria (ea nempe quæ a vesicæ sphincteris, aut adjacentium partium phlogosi oritur) auscultat sæpissime solis diluentibus calidis, ex. gr. thee, coffee, tanta copia adhibitis, donec lenis diaphoresis succedat, conjunctis, si necessarium videatur, temperantibus nitrosis, *Junkerus*.

*Remedia varia.*

*Art. 1687.* Decoctum foliorum ribium nigr. utile admodum expertum esse, in stranguria testatur *Forestus*. Olei ceræ gutt. iij. vel iv. in decocto cicerum rubrorum exhibitas Stranguriam solvere inquit *Hartmannus*. Externe vero axungiam hirci umbilico applicat *Helmontius*, & oleum mastiches stillatitium, nec non infessus, & fomentationes ex herbis emollientibus peragit.

Ad stranguriam, inquit *Lucas Tozzi*, ea potissimum convenire videntur, quæ urinæ acritudinem temperant, quando vero morbus consequitur arenulas, calculum, inflammationem, aut veneream luem, medicamenta his opportuna in usum ducenda sunt.

*Si a cantharidibus.*

*Art. 1688.* Si a cantharidum usu aut ex alia acrimonia morbus oriatur, conducunt in primis viscida, & glutinosa ut emulsiones sem. frig. min. & major. juxta *Riverium* & *Binningerum*, lac in quo fl. chamæmel. decocti sint, atque etiam ex *Sibbald*o resina abjetis magn. nuc. mosch. cum saccharo assumpta tamquam singulare remedium.



## D Y S U R I A.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1689.* Dysuria est excretio urinæ cum *Dysuria*  
conatu & dolore, & ardoris sensu; ut plurimum *quid.*  
fit, ab abrasione mucii naturalis ductuum uri-  
nariorum, quos isto munimine orbatos urinæ  
acrimonia irritat, & vehementer lædit; quan-  
doque causatur ab excoriatione vel exulcera-  
tione vesicæ colli vel urethræ; excernitur ma-  
teria crassa vel mucilaginosæ, nutrimentum par-  
tium læsarum; malum est perquam molestum,  
non tamen per se lethale, interdum diuturnum,  
unde periculum est, ne exulceretur tandem ve-  
sica, aut urinæ incontinentia superveniat.

*Art. 1690.* Remedia ad stranguriam hic con-  
veniunt, ut *ol. amygd. dulc. decoct. malvæ, terebin-* *Remedia*  
*thinata & balsamica, antimon. diaphor. cum tereb.* *nonnul-*  
*la.*  
in forma pil. *clysteres emollientes, injectiones,*  
de quibus vide locum, p. 738. „Sequens mucii-  
lago valde commendatur, *℥. Gum. Arabic. ℥ij.*  
„*tragacant. ℥ij. aq. cinnam. ten. ℥x. syr. de alth.*  
„*℥ij. f. Mucilago cochleatim sumenda.*

*Luca Tozzi sententia.*

*Art. 1691.* Dysuria seu mējendi difficultas, *Dysuria*  
quamvis a nonnullis cum stranguria confunda-  
tur, proprie tamen ab illa differt: etenim in *a stran-*  
dysuria non cogitur vesica tam frequenter, & *guria di-*  
guttatim urinam reddere, cum possit, nedum ju-  
sto tempore illam continere, sed etiam diutius,  
quam deceat. At vero cum emittitur, difficilis  
simul, & dolorifica est, quamvis cum prodierit  
libertim profluat.

*Causa.*

*Art. 1692.* Hujus causa refertur quoque, vel ad vitium urinæ, quæ mordax, & acris est, unde dici consuevit ardor urinæ; vel ad vesicæ cervicem, & urethram erosam, & ulceratam fortasse a calculo, arenulis grandioribus, & asperis, lue Gallica, medicamentis acribus præsertim ex cantharidibus, injectionibus in penis ductum aquarum erodentium, aliisque.

*Curatio.*

*Art. 1693.* In Dysuria danda opera est, ut urinæ mordacitas temperetur; illaque quodammodo dulcescat; quamobrem expressiones alias memoratæ ex feminibus, & condituris anodynis hic locum habebunt, & multo magis si urinæ ardor, ex cantharidum usu oriatur. Gummi Arabicum pulveratum optimum dicitur a Boyle ad urinæ ardorem. Item gummi tragacanthum, gummi cerasorum, & prunorum, cum albumine ovi inspissato, & ficcato, rad. alth. & symphyti, & succus glycyrrhizæ.

*Si ab ulcere fiat.*

*Art. 1694.* At vero si ulcus in vesicæ orificio timeatur, inutilia ista erunt, sicut etiam in senibus ex languore, & mucosis, acidisque succis; in quibus expostulantur roborantia, attenuantia, & aromatica subamara, vinum, vini-que spiritus. Commendat Heurnius vinum tenue cum myristica, & lixivium ex cineribus rorismarini, & vino albo, Thonnerus ol. succini purissimum ad gutt. vj. in aqua petroselinii, & Horstius etiam aromata in urinæ ardore præscribit, quamvis vitiosus humor acer, & calidus videatur.

*Vitæ ratio.*

*Art. 1695.* Vitæ ratio ejus sit conditionis, ut nec urinam, crudosque succos cumulet, nec ad vias urinæ recrementa deducat. Modico igitur cibo, & parciori potu utatur æger, acrida, & acida devitet, sed in cibum urtica minor, fysymbrium aquaticum, raphanus, filer, capra, alia-



aliaque his similia in juribus excocta sæpe sæpius contulere.

Cæterum Narcotica, & opiata tuta non sunt, *Cautela* nisi dolor urgeat nimis.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1696.* Multis difficultas fuit urinæ, quod *Dysuria* corpus vesicæ aut crassius fuerit, aut quod multa *causa* pituita corpori vesicæ adhæserit, unde aliqua *aliquando difficile* ex parte occupata fuerit capacitas ipsius vesicæ, & sic pauca urina contenta fuit. Id vero vitii maxime iis contigit, quibus carnositas aliqua in utethra fuerit. Nam tenuior & subtilior pars materie excreta fuit per penem: crassior vero remansit, quæ obhærescens id symptoma attulerit. Et hujus dysuriæ, & brevis mictionis causa ignoratur. Id Domino *le Veau* contigit. Medici putabant esse calculum, aut resolutionem aliquam. Et hinc nisi diligenter animadvertitur, datur occasio generationi lapidis utendo diureticis, & perperam falsa calculi opinione utimur iis, quæ frangunt calculum, quum dysuria a veteri carnositate fortasse fuerit. *Balloonius de Constitutione æstiva anni 1578.*

*Art. 1697.* Dysuria a calculo, inflammationibus & ulceribus, gonorrhœa, febribus variis, aliisque, quorum symptoma est, remedia reposit, *Causarum curatio.* quæ hujusmodi causis aptiora cognoscuntur, quæ vero ab urinæ acrimonia oritur ita curari debet. Phlebotomia primo ex brachiis mox e pedibus pro plethoræ magnitudine, virium & ætatis ratione, aut inflammationis periculo repetenda celebratur; clysteres inde ex sero lactis aut ipso lacte cum rad. alth. liquir. lilior. malv. utriusque, portulac. lactuc. plantag. nymph. violar. sedi utriusque, telephii, aceto, endiv. &c.

Seminibus quat. frig. maj. min. sem. pap. alb. fœ-nugr. lini, psyll. cydonior. flor. chamæmel. melilot. malv. trium cordial. nymph. cum cassia, lenitivo, butyro insulso, ol. lilior. violac. lini amygdal. dulc. &c. mel. violac. rosac. &c. Per os autem exhibenda ægro quæbilem contemperant ejusque acrimoniam demulcent. Profunt & mucilagines cum decocto alth. addito nitri momento, & serum lactis in quo decocti fuerint flor. chamæmel. cyani, calcatrippæ. Ad humores simul purgandos, & leniendos confert dilutum cassiæ in decocto rad. alth. & summit. aut flor. malvæ cum crystal. mineral. ad plures dies usurpatum; sed his omnibus adjungenda venit diætâ refrigerans, & leniens, ex *Calmette*.

*Dysuria a stomacho.* Art. 1698. Dysuriam præcipue in senibus aliquando a stomachi, & primarum viarum acidis putridisque viscositatibus oriri observat *Dolaus*, quo casu jubet vomitoria, & stomachica; tum terebinthinata omnia, & aquam contra ardorem urinæ *Mynsicht*, & decoctum contra ardorem *VVeckeri*. Præstare quoque succinata, ait, inter quæ essentiam succini, vel balsamum sulph. succinat. vel liq. C.C. succinat. aliis palmam præripere affirmat. Tum addit: Parens meus optimus dysuria vexatus ab usu essentiæ succini egregium levamen sensit.

*Externa quadam ad dysuriam.* Art. 1699. Ad magis liberum reddendum urinæ exitum instituatur femicupium, in quo dum per temporis spatium insedit æger, regio pubis ejus inungitur linimento ex unguento martiali agrippæ & ol. laurin. parat. Sic etiam enemata ex lacte puro, vel mucilagines mixto optima sunt. Hisce nihil juvantibus ad Ther-  
mas confugiendum est.

*Dysuria vetus sa- nara.* Art. 1700. In Ephemer. German. (Detur. II. Ann. 9. Obs. 61.) narratur de Comite quodam quem



quem pertinax dysuria per aliquot dies lecto affixum tenuerat, donec terrore vehementi incusso ex incendiariæ campanæ sono percepto, visaque simul in proxima vicinia ingenti flamma sanatus fuit.

## URINÆ INCONTINENTIA.

*Ægineta sententia.*

*Art. 1701.* Relaxatio musculi collum vesicæ ambientis urinæ incontinentiam producit; quæ propter pueris fere accidere consuevit, proinde communiter iis, quæ robur inferunt potissimum utendum, caventes quæ valide refrigerant: foventes potius ægros, quantum fieri potest, calidis. Refrigeratio enim veluti resolutionis vim obtinet.

*Causa  
& indicationes.*

Naturaliter autem huc faciunt. Gallinaceum guttur crematum aqua tepida jejunis potui exhibetur, aut leucanthemi flores, modo non absimili, aut leporis testiculus in vino bene fragranti friatus, bibendum porrigitur: nepeta item, myrrhaque ante cœnam, aut rutæ sylvestris semen tostum per triduum propinatur. Pudenda vero eorum, creta cimolia cum succo perdicii circumliniri ex usu est.

*Remedia.*

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1702.* Involuntarii urinæ profluvii causa est deficiens sphincteris vesicæ constrictio a paralyti, contusione, diuturniori mora in aqua frigida, partu difficili quandoque in ultimis gestationis mensibus. (*Lectimizingi* plerumque sunt vel infantes vel senes sub cura medica haud cadentes.) Affectus est difficilis curatu, qui vigi-

*Incontinentia  
urinae  
causa.*

lantibus contingit; in senibus immedicabilis, nisi interdum iis *therma* succurrunt, in morbis acutis male ominatur.

*Curatio difficilis.* Art. 1703. Pro scopo curativo in genere conveniunt *astringentia*, *nervina* & *antiparalytica*: speciatim decoctum *e lignis sudoriferis*, *calamintha* & *mentha*, *pulv. mastic. thus*, *gum. Arab. castor.* &c. laudantur: specificum audit *guttur galli tostum* ad ℥ss. in vino rub. propinatum, item *pulv. tunic. stomach. gallin. pudendum seu vulva suis* quocumque modo præparat. in vigilantium & dormientium affectibus singulare experimentum, *inures exsiccati vel in butyro elixati.*

*Langii sententia.*

*Urina incontinentia ex risu.*

Art. 1704. Vesicæ urinariæ sphincter in quibusdam subjectis solemniter risu excessivo laxatur ob nimium constrictas fibras ejus motrices carneas tunicam mediam efformantes: novi puellam cui involuntarie a risu semper fluebat lotium, nisi fasciis ventri arcte circumjectis munita incederet, utpote quo unico medio hucusque admodum rebelle malum sufflaminari potuit, sine dubio ob cohibitum musculorum abdominis enormem motum, quo urinaria vesica alias comprimebatur. Concordat cum hoc exemplo illud quod in Act. Haffn. vol. III. pag. 13. legitur de virgine, quæ non mingebat, nisi ab ancilla simul mingente admonita, vel facetiis, & jocis ad affatim ridendum invitata, sed hoc quidem foeminis commune est in Italia quod sub vehementi cachinno urinam continere nequeant.

*Diamnes quæ?*

Art. 1705. Licet quodammodo ad involuntariam mictionem urinæ stillicidium ob continuam irritationem, quam patitur vesica a liquore acri-

alla-



allabente pertineat; solum tamen hic de illa incontinentia agimus; quæ sine omni dolore, ac fere insensibiliter inter dormiendum potissimum accidit, quæ alias peculiari nomine *Diamnes* audit.

Corripitur hoc affectu solemmniter infantilis, *Descriptio.* & puerilis ætas; quandoque vero, & in adultis vel in ipso senio hoc vitium deprehenditur, sic ut vel plane urinam non contineant, sed omni momento involuntarie transmittant, aut saltem si per diem, & vigilantes illam suppriment, noctu tamen & somno sepulti stragula permin-gant, qui ultimi propterea stylo Helmontiano *lectiminge* vocantur.

*Art. 1706.* Causa unice vesicæ sphincteri tri- *Causa.* buenda, qui vel impar est retinendi urinæ copiam ut in infantibus, potatoribus quibusdam, & senibus, vel irritatur ab acrimonia urinæ, calculo, aut uteri magnitudine in gravidis, vel paralyfi afficitur ob casum ab alto, vertebra-rum, aut ossis sacri luxationem &c. vel ob læsio-nem fibrarum ex scalpelli Chirurgici acie in partus, & calculi sectione, ineptus plane ad re-tinendum redditur.

Pueris potatoribus, & senibus detrahatur po- *Curatio.* tus dum cubitum eunt, deinde per adstringen-tia, & nervina sphincter roboretur.

Si ex irritatione sphincteris: corrigenda est acri-monia potu ex ficibus, passulis, & glycyrrhiz. pa-rato, quem expertum laudat *Bartholinus* in Actis Hassnicis Vol. II. p. 273. Si calculus in culpa fue-rit ejus cura habeatur. Si uteri magnitudo: ab-soluto gestationis tempore, & fœtu enixo spon-te sua curabitur.

Quæ ex luxatione est per solam repositio-nem, sicut quæ ex paralyfi per antiparalytica &c. restituitur.

Tandem quando sphincter plane dilaceratus, vel dissectus est, ambigua admodum erit cura, præprimis si morbus jam inveteratus fuerit.

*Morgagni sententia.*

*Inconti-  
nentia  
urinae ca-  
sus sin-  
gularis.*

*Art. 1707.* Ubi foeminis hypogastrium tumeat, etsi læsi uteri non desint notæ, de vesica tamen, quæ ante uterum sita est, non est omnis prætermittenda suspicio: Hoc fancivi multiplici edoctus observatione præsertim vero Mulieris 40. circit. annorum natæ quæ profluvio sanguinis ex genitalibus cum acerbissimis hypogastrii, & subjectarum partium, nocturnis præsertim doloribus correpta, tunc sensit disjecta quædam tubercula quæ olim in medio hypogastrio perceperat in unum tumorem coaluisse. Subsequente vero anno cum hic tumor in ea ipsa sede esset, eo tamen usque ascendit ut ab umbilico vix duobus distaret digitis transversis: subrotundus, æqualis, prominens, & renitens. Assiduum accesserat urinæ stillicidium, dolor spasmodicus ad guttur, nausea, & vomitus aliquando, macies, febris. His malis admodum fracta decubuit, & intra sex septemve dies tandem defuit nemine dubitante quin ex cancroso uteri tumore defecisset. Et cancer quidem uterum ex parte eroserat, sed tumor ad ipsum non attinebat ut ex cadaveris dissectione innotuit, in quo repertum magnum illum tumorem fuisse vesicam urinariam valde distentam, & lotio plenam, quæ ad hujus expulsionem se se contrahere penitus nequibat, quia ejus anterior facies alte supra pubem cum ventris parietibus coaluerat.

*Cautio-  
nes præ-  
clia.*

Ratio cur ex disjectis olim tuberculis unus factus sit tumor, videtur ad distentam attinere vesic-



vesicam, quæ dum altius vi spasticorum cruciatuum se efferre incœpit, proxima intestina sursum urgendo, & partes eorum aliquas inferiores comprimendo, illam fortasse divisorum tuberculorum speciem ex iis effecit. Porro quis unquam, qui lotium a vesica non retineri sed jugi stillicidio effluere cognovisset, suspicatus, id quod erat, fuisset, magnam tamen lotii paruem in vesica restitasse? *Ruischius* similem vesicæ plenitudinem in puerpera deprehendit, quæ pariter nihil urinæ in vesica, quamvis magna ejus copia distenta, se credebat habere, eodem, ut videtur, stillicidio decepta, & in Sepulchreto Theophili Boneti altera mulier prostat cui foetus indicia erant uterum gravantis, sed revera nihil nisi magnus abscessus, qui inter anteriores increverat vesicæ tunicas, gestationis tumorem mentiebatur.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1708.* Urinæ incontinentia recens, quia *Remedia* sphincterem vesicæ debilem pro causa agnoscit *varia.* roborantibus; & nervinis externis atque internis, martialibus, aromaticis, ac spirituosiss, balneis martialibus, & nervinis, vino rubro, vel alio generoso modice usurpato curanda; atque externa præcipue regioni pubis, & perinœi imponenda. Urinæ incontinentia post partum a læsione, laceratione, debilitate, relaxatione, vel paralyfi cervicis vesicæ oriri solet, & malum est molestissimum atque simul ut plurimum per medicamenta curatu difficillimum. Interea tamen roborantia, & traumatica principio sæpe aliquid proficiunt: ut infusa herbarum traumaticarum, essentia traumatic. VVedel. tinct. terr. Japon. chinæ, & cascarillæ, immo, & tincturæ mar-

martiales; item externe fodus herbarum illarum cum vino rubro, vel aqua ferrariorum facti, & sæpius applicati. *Heisterus*.

Ad urinæ incontinentiam laudatur vesica capræ, aut Agni exsiccata, & pulverata, atque ad ʒj. in vino rubello epota, sæpiusque repetita, vel vesica vervecina in clybano siccata, ac deinde pulverata, ut scribit *Robertus Boyle*.

Alii laudant pudendum suis cum brassica capitata; nec non piscis in ventre lucii inventus, cinis erinacei, gummi Arabicum, styrax calamita, cera, myrrha, mentha, hypericum. Vinum autem, in quo decocta sint ruta, castoreum calyces glandium quernarum, semen myrti, & thus commendatur a P. Bayro, qui Bayrus emplastrum quod habet: Ladani, & massich. ana ʒij. lign. aloes, styrac. calamit. cinnam. & terebinth. ana ʒj. & cum succo menthæ pubi, & perinæo etiam applicat.

Magni faciunt alii pulverem a Rhasi descriptum, vel murem decorticatum, & in cibum exhibitum, quo remedio se edoctum fuisse a mulieribus Delphensibus testatur *Forestus*.

Fomenta quoque ex verbasco, mentha, myrtho, absinthio, balaustis, rosis, punicis, adjecto alumine prosunt. Item balneum, & unguentum valde efficax conficit *Hartmannus*.

Sed elegans sane, atque admirandum remedium memorat *Henricus ab Heers*, quod est: bufonis vivi in nova olla usti pulvis sacco e collo suspensus, quod in Mercatore Leodienfi se expertum esse testatur.



## M I C T U S C R U E N T U S.

*Coelii Aureliani sententia.*

*Art. 1709.* Fluor sanguinis per vesicam manifestus est, quando acervatim per urinæ meatum sanguis excluditur. Solent enim sicut in podice, vel foeminarum sinu, aut matricis collo, etiam in vesica hæmorrhoides generari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam intervallis variatum, quod oportet apprehendere prudenter, cum non coacervata primo fuerit effusio, sed augmentis quibusdam promota, interjectis defectionibus, ac sæpe retento sanguine doloris pubetenus admonitu; cessante cum tensione inguinum, & gravedine clunium, vel renum consensu, & cum sanguis (iterum) eruperit supradictorum relevatione sequente.

*Art. 1710.* Est præterea ex putredine sanguis ater, & male redolens, atque purulentus, qui ex ulcere proficiscitur, dolore antecedente, quo putredinis causa advenisse videtur, tum etiam antecedentibus excussu, saltu, aut percussu. Sed quoniam non solo ex ambitu vesicæ fluor iste fit, sed etiam ex collo, vel mictualibus viis acervatus sanguis excluditur, aliquando etiam de renibus, erit locorum discretio facienda.

Nam renibus patientibus dolor in clunibus (seu lumbis) demonstratur, vesicæ autem ambitu patiente sub umbilico, vel pube tenus apparet dolor, & sæpe urinæ commixtus sanguis excluditur; item collo vesicæ patiente circa veretri initium, quod Græci perineon vocant, dolor sentitur. Mictuali autem via patiente, ipsam veretri radicem dolor afficit, testante sanguinis puritate, cum jugi; & non intercapedi-

nata

*Singula-  
ris mi-  
tus cru-  
enti  
causa.*

*Mictus  
cruenti  
diagno-  
sis; quo-  
nam e  
loco san-  
guis ven-  
iat?*

nata emissione, etiam si digitis loca, quæ juxta infimam partem veretri sunt presserimus. Nam si ex aliis locis sanguis feratur digitorum impressione magis abstinetur, cum supradictis locis h. e. perineo, vel podici vicinis renititur impressio. Tunc enim ex vesicæ collo impedito pressu referetur, ac in superioribus viis abstinabitur.

*Curatio.* *Art. 1711.* Solutionem patiente vesica locandus est, æger in frigido mediocriter loco adhibita requie, cum abstinencia, & articulorum tenaciligatione: & si sanguinis fuerit fluor lumbis prominentius sublevatis; & officio mictus præmonente, quantum datur, imperandum ægro, ut neque id retento faciat spiritu, neque vi quadam, vel conatu.

Apponenda etiam spongia nova aceto tincta secundum clunes vel umbilicum pubetenus, ac usque ad veretri initium, addita tenaci cum amplexu ligatura. Tum Epithemata iisdem locis atque cucurbita constrictiva adhibenda.

Potus dandus frigidus, parvus cibus, medicamina quæ ad sanguinis fluorem, & sputum conveniunt. Prodest & sessio ex vino vehementiori confecta, in qua sint præcoctæ myrtæ bacculæ cum rosis: vel in posca aut aceto facta decoctio herbæ thaliæ vel rubi, aut mali punici corticis, & horum similium.

Vel per ferramentum quod Græci *catheterem* vocant injectio facienda eorum, quæ similiter medendo constringant ut: acaciæ, hypocistidis, aut plantag. succi, vel polygon. intybi vel poscæ frigida per se, aut adjuncta thuris ℥j. cum æquali pondere hypocist. vel gallæ cum vino nigro vel thaliæ herbæ aqua cœlesti concoctæ: quæ cum fuerit expressa, & adjecta, erit aqua recoquenda, donec ad mellis veniat crassitudinem.

*Etc.*



*Ettmulleriz Sententia.*

*Art. 1712.* Sanguis, qui tingit urinam, frequenter a renibus effluit, interdum ex ureteribus, interdum ex vesica, aut ex arteriolis penis; est hæmorrhagiæ species. Præcedere solet dolor gravativus & tensivus in loco affecto; aliquando est *criticus*; a diureticis fortioribus interdum causatur, item a nimia venere, a contusione, vel casu ab alto, equitatione, saltatione, &c. urina sanguinolenta semper est, opaca, turpida, & crassiuscula plus minus, prout plus minus sanguinis est permixtum, ex opaco nigrescit, ita ut linteam immersum suo rubore sanguineo inficiat, si aliquamdiu steterit, crassamentum deponere solet nigrescens, sanguinem grumofum exacte referens.

*Art. 1713.* In genere tollenda est sanguinis acrimonia; remedia ad hæmoptysin dicata conducunt; *venesectio* interdum locum habet; *ca-thartica* non conveniunt excepto *rhabarbaro*; semen *hyosciami*, sicut in aliis hæmorrhagiis, vim singularem obtinet.

*Indica-  
tione  
curati-  
væ.*

*Mayeriz Sententia.*

*Art. 1714.* In mictu cruento intentiones sunt, ut humorum acrimonia, si adsit, obtundatur, aut impetus minuatur; inflammatio si adsit, tollatur, & vasa consolidentur & constringantur.

*Intentio-  
nes.*

*Art. 1715.* Vidi quemdam, annorum circiter 40. qui a retentricis renum imbecillitate & vasorum laxitate tantum cruoris fundebat cum urina, ut corpus macilentum, exangue & pene tabidum evaserit, pulsus habens languidum ac febrilem. Eo usque res devenerat, ut refrige-  
rata

*Curatio  
singula-  
ris.*

tata urina, inconcoctus sanguis in ea concre-  
 sceret albicans, & gelatinæ potius quam sangui-  
 ni affinis. Vano labore assumptis & adhibitis  
 omnibus remediis, tandem intra tres quatuor-  
 ve dies convaluit, hausto quotidie mane *lacte*  
*vaccin.* recens multo supra ramum *menthae ru-*  
*bræ*, eoque calente ex animali, dulcorato satis  
*syrupo cydon. & cinnamom.* plures annos supervixit.

*Friderici Hoffmanni sententia.*

*Phlebo-*  
*tomia*  
*quando*  
*adhiben-*  
*da.*

*Art. 1716.* Si malum a criticis hæmorrhagiis  
 suppressis oriatur præcipuum tam ad curatio-  
 nem, quam ad præservationem in venæ sectio-  
 ne repositum est momentum, quare sanguinis  
 missio in principio largior quidem instituenda  
 est. Quando vero sanguinis mictus suas servat  
 periodos, duabus vel tribus ante accessionem ho-  
 ris vena pertundenda, & prout corporis condi-  
 tio fert, sanguis emittendus.

*Mictus*  
*sanguis-*  
*nei cu-*  
*ratio.*

*Art. 1717.* In mictione sanguinis ab ulcerato  
 rene vel vesica, vinum album mellei coloris  
 jucundissimum, probe temperatum bibendum  
 peritissime suadet *Hippocrates*. Alvi laxitas item  
 concilianda est rhabarbarinis præcipue passulis  
 mixtis, ut sunt passulæ corinthiæ, solutione  
 rhabarbari per blandam inspissationem laxativa  
 reddita, vel pulvere rhabarbari cum cremor.  
 tart. nec non clysteribus emollientibus. Fervor  
 sanguinis temperandus nitratis & pro vehiculo,  
 sero lactis dulci & acidulo, aqua decocta hor-  
 deo vel sola etiam aqua pura fontana. Vasa  
 nimium laxata leviter adstringenda decoctis vel  
 infusis ex leviter vulnerariis: ut agrimor. heder.  
 terrestr. equiset. millefol. cum summit. virga  
 aurea, rad. consol. maj. cum melle Prussico re-  
 aibus mirum amico, quæ decocta pro re nata  
 etiam



etiam misceri possunt cum lacte. Renibus aut vesica exulceratis conferunt, syrup. dialthææ Fernelii, item decoct. Foresti nec non ejus, quod Minsichtius contra mictum cruentum laudat. Facit hic quoque infusum, quod præter jam dictas herbas vulnerarias cortic. rad. acaciæ; gummi cerasor. habet.

*Art. 1718.* Ad dysuriam immo ischuriam, quæ frequens & periculosum renalis, veletiam vesicalis hæmorrhagiæ symptoma esse solet, dum sanguinei grumi ureterum principium, ubi vesicæ inseruntur, vel ipsius sphincterem vesicæ obstruunt, non certe efficacius, & promptius auxilium, quam aqua pura calida, copiose hausta, & exterius balneum applicatum prostat. Tum quoque præstat aquam tepidam syringa in urethram, & vesicam injicere, quo acris humor diluatur, & grumuli hi dissolvantur. Atque etiam ipse Hippocrates eadem hæc remedia commendat, lavacrum nempe aquæ calidæ, & tepesfactoria ad locum affectum apposita. Quod si vero ob grumos sanguineos in ipsa vesica, seu sphinctere ejus obvios spasmi oriantur, ut inde totalis, & pernicialis ischuria non inducatur, interne emulsionem ex seminibus quatuor frigid. cum lapid. cancror. & nitro; externe vero vesicam repletam decocto flor. emollient. ex lacte abdomini applicatam, nec non alvi apertionem, cum manna, vel clystere emolliente, & oleoso, usus deprehendimus longe præstantissimi.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1719.* Interdum aucto corporis motu cruentum lotium absque labe renis vel calculi præsentis suspicione potest accidere. *Boerhaave.*

*Quandoque accidit nullo existente calculo.*

*Art.*

Lac ovillum.

Art. 1720. *Lac ovillum* maxime laudatur a *Foresto*; sæpe, inquit, sanguinis mictum solo lacte ovillo, nempe sumendo *lactis* ℥iv. & *bol. armen. ver.* ℥j. curavi. Idem etiam laudant *Hollerius* & *Duretus* ex *Hippocr.* & *Avicenna*.

Sanis quandoque accidit.

Art. 1721. Constat mictionem cruentam flatibus periodis recurrentem ob hæmorrhoides suppressas quibusdam sine sanitatis detrimento accidere; hinc verum est illud *Hippocr.* quando ait, quod sanguinem mingere raro quidem, & sine febre ac dolore nihil mali significet, sed lassitudinum solutio fiat.

Remedia varia.

Art. 1722. Remedia ad hunc affectum curandum a capite de hæmorrhagia petenda sunt. *Stercus porcinum* apud rusticos est remedium certissimum pro jumentis sanguinem mingentibus. *Radix symphyt. in lacte chalybeato coct.* quibusdam profuit. *Electuarium Boyleanum*, decoct. catechu, decoct. incrassans, haustus japonicus, nitrurum saturnisatum, trochisci Gordonii, &c.

Si sanguis purus mingitur.

Art. 1723. Si excretio sanguinea effusissima sit cum summa virium jactura, mixturam adhibet *Sylvius* efficacissimam ex aq. plantag. unc. ij. portulac. cinnam. acet. destillat. ana unc. j. sem. coral. rubr. pp. lapid. cancr. terr. sigillat. ana ℥j. laud. gr. ij. syrup. corall. Quercet. vel de symphit. Fernel. q. s. ad gratum saporē.

Ad urinam sanguinolentam sapo venetus ad ℥j. bis terve per diem sumptus cum aliquo vehiculo multum valere ait *Boylius*; ut & flores consolidæ majoris in vino rubro cocti, & bis in die assumpti.

Ulceris inde relictæ curationis ratio.

Ulceri fortassis relicto abstergendo conducunt præsertim decocta vulneraria cum balsamo sulphuris, extractum hyperici, consolidæ, verbasci, pulveres sarcotici dicti, terebinthina, tragacanthum, cera. *Sylvio* perutiles censentur

inje-



injectiones ex decocto plantarum aromaticarum in aqua, vino, vel hydromele, addito balsamo sulphuris, vel Peruviano.

*Art. 1724.* Mictum cruentum nasci posse a cantharidibus negat *Sennertus*, testaturque etiam ab usu interno cantharidum se numquam tale quid observasse; contrarium tamen testatur *Langius*, qui a cantharidum sola externa applicatione pro vesicatorio mictum cruentum observavit. Id ipsum confirmat Boyle qui simul refert exemplum *Michaelis Pascalis* Chirurgi, qui cantharides in pera gestando mictum cruentum sibi contraxit.

*Mictus cruentus a cantharidibus.*

*Art. 1725.* Probe notetur circa usum adstringentium, nequis abutatur illis in omni mictu cruento; tantum enim abest, ut locus sit ipsis, ubi malum ex translatione sanguinis ex alia parte, aut evacuatione critica, & naturali originem sumat, quin potius illis in casibus notabiliter noceant, naturæ conatum impediendo. *Langius.*

*Nota bene.*

## D E U R I N I S.

*Inter legendum & ex observatione.*

*Art. 1726.* Urina præcipue ex aqua, sale, & terra conflatur; & quo plus salis respectu aquæ in se continet, eo rubicundior est, & quo minus, eo pallidior; & quo plus terræ, eo magis contentis saturatur, & contra; si itaque terra & sale multo abundet, dicitur urina crassa, si paucio, tenuis: atque hinc quidem oriuntur maximæ urinarum diversitates, ex quibus deducuntur judicia, scilicet, a *consistentia*, *colore*, & *contentis*; adeo ut quicquid de urina aliqua particulari pronunciari potest, huc tantum re-

*Urinarum compositionis diversitas.*

*Alen. Pars II.*

S

deat;

deat; scilicet hanc urinam plurimum salis continere & terræ parum; secundam multo salis & terræ abundare, tertiam ex modico sale & terra & plurima aqua conflari, & sic de reliquis.

Colores  
varii.  
Urina  
alba.

Art. 1727. Colores urinarum sunt albus, fulvus, flavus, rubeus & niger. *Albus* est vel *tenuis lymphida & aquosa*, vel *crassior & subalbicans*, quæ juri carniū semicoctarum assimilatur; & hujusmodi lotium plerumque reddunt pueri, dum febricitant, & etiam ii, quorum viscera lumbricis scatent, & non solum hi, sed etiam pueri sæpissime, qui optima valetudine fruuntur, adulti quoque nonnunquam, ut taceamus fluore albo vel gonorrhœa laborantes, in apparatu variolarum, ut ipse sæpissime observavi, excernunt *albicantem* urinam. *Alba remissior*, ut *lactea*, & *glauca*, incipientibus, & incrementibus febribus reddita, copiam materiæ putridæ, naturæque laborem demonstrat; quod si autem diutius fertur, longi frigidique indicium morbi præbet.

Tenuis  
& aquo-  
sa.

Art. 1728. *Urina tenuis & aquosa* in plurimis morbis occurrit; talis redditur in affectibus ventriculi, & indigestiones ac cruditates plerumque denotat; item in chlorosi, cachexia, hypochondriacis & hystericis affectibus; hujusmodi *urina tenuis & aquosa* copiosa quantitate non raro est signum animi perturbationum, & sæpissime paroxysmorum hystericorum vel affectuum quorundam spasmodicorum prodromus, unde conicere licet hos affectus a salibus urinosi provenire, vel saltem iisdem foveri. *Tenuis* *urina* quoque conspicitur in diabete, hydrope, aliquando in apparatu variolarum, frequentius in declinatione. In nephriticis paulo ante paroxysmum, denique a computatione aquarum mineralium aliorumque liquorum tenuium, spirituosorum, diureticorum, &c. In febribus male ominatur;

a tur-



a turbida & crassa in tenuem & aquosam mutata, est signum imminētis phrenitidis, scilicet, per materiæ febrilis in cerebrum metasthesin.

*Art. 1729. Fulvus sive citrinus color in urina Citrina.*  
statum naturalem ut plurimum denotat. Et quoad quantitatem urina debet esse in proportionē aliquanto minori (forsan subtripla) liquorum assumptorum: ab hac norma vero non raro deflectit, nunc superabundans, nunc deficiens.

*Art. 1730. Urinæ flavæ sive aureæ duo sunt Flava  
gradus, viz. flammea, quæ in febribus tertianis, sive aureæ.  
ut etiam in variolosis, & non raro in benevalentibus cernitur: Et crocea, quæ hystericis, scorbuticis, hypochondriacis, ut etiam iis, qui rhabarb. crocum, folia fennæ, &c. comederunt, plerumque cernitur.*

*Art. 1731. Urina rubicunda est signum febricitantium, sed non proprium; nam in scorbuto diuturno urina tam intense rubescit, ut non magis in febre ardente, in arthritide quoque urinæ intensa rubedine saturantur. Rubicunda.*

*Art. 1732. Urina viridis ac nigricans est signum plerumque morbi cujusdam virulenti aut venenati, aliquando in febribus quartanis conspicitur, ut etiam in puerperis, & iis, quæ menses habent obstructos (teste Galeno), in calculosis etiam post calculum foras eliminatum, in melancholicis purgatio non operans urinam facit nigram; cassia & alia quædam pharmaca intus sumpta lotium atrum reddunt. Viridis ac nigricans.*

*Art. 1733. Contenta urinarum respectu locorum in matula tria nomina sortiuntur, viz. in summitate nubeculam, in media enacrema, in ima parte hypostasim vocamus. Urinarum contenta.*

*Art. 1734. Nubecula in urina in morbis tam chronicis, quam acutis est signum redeuntis in*

Stomachum fermenti, & recuperatæ plus minus digestionis.

*Bullæ & spuma.* Art. 1735. In summitate urinæ interdum conspiciuntur *bullæ & spuma*; talem urinam vidi in mania laborante, in qua spuma & bullæ per integram nycthemeram manserunt, & eadem urina hypostasim valde nigricantem deponebat. *Cremor innatans* in urina phthysicorum plerumque cernitur, sed frequentius in hypochondriacorum. Urina in summitate *caudam* pavonis representans ut plurimum est signum scorbuti. *Pinguedo* aliqualis & *guttula* quædam *oleosa* frequenter apparent in urinis febre ardente, colliquativa, aut etiam hectica, ulceribus renum, & similibus afflictorum.

*Enaorema.* Art. 1736. *Enaorema* in praxi quandoque occurrit, sed nihil peculiare, quod scio, indicat; nisi quod in febribus plenioris concoctionis appropinquantis indicium sit.

*Sedimenta varia.* Art. 1737. *Hypostases* sive *sedimenta* in Urinis sunt vel alba, vel nigra, vel rubra, aut saltem his vicina; *album sedimentum* in benevalentibus occurrit, *nigrum* in Urinis nigris, de quibus antea. *Rubrum* & *crassum* sedimentum ad instar pulveris laterum in febribus intermittentibus, & remittentibus, & etiam in scorbuto, & colica frequentissime occurrit. Quibus febricitantibus, in Urinis subsidentiæ fiunt crassiori farinæ similes, longam infirmitatem significant (inquit *Hippocrates in Aphorif.*)

*Contenta præternaturalia.* Art. 1738. Sunt & alia in Urinis contenta, quæ præternaturalia, & quasi accidentaliter dicta sunt; talia sunt arenæ, calculi, pus, sedimenta furfuracea, sanguis, &c. *Arena* in scorbuticis; *caruncula* & sedimenta *furfuracea* in Urinis calculo laborantium, necnon in vesica & renum ulceribus excernuntur *furfuracea*; sedimenta ali-

quando



quando etiam in morbis cutaneis, ut pruritu, scabie, &c. occurrunt. Materia *purulenta* non tantum a renibus, verum aliquando a vesica, & meatu Urinario ulcere affectis in lotio deponitur; quandoque e vasis, & locis genitalibus fœnies, semen corruptum, & fluor albus Urinis suffunduntur, & subsidentias purulentas efformant; pestremo sedimenta purulenta in Urinis peripneumonia aut empyemate laborantium reperiuntur, quæ etiam morbum solvunt. Urina *cruenta* non tantum in calculosis occurrit, sed etiam in plerisque scorbuticis multo cum levamine, modo limites non excedat; nec defuerunt quædam fœminæ, quæ sua catamenia per vias urinarias inter lotium per multos annos innocue emisserunt, hujusmodi historiam habemus apud *Hollerum*, &c.

*Art. 1739.* Post omnia vero quotquot dicta *Corollari- fuerunt* ( ut proverbiali utar dicto ), *urina est rium. meretrix & mendax*; nihilominus urinarum inspectio in praxi medica est usus eximii, modo cum reliquis symptomatis diligenter pensitatis conjungatur, tum ad judicandum ægritudines earumque statum, tum etiam ad curandos morbos. Ideoque periti, & fidelis est medici operam dare, ut, quod artis est de Urinis, haud temere negligat, neque artis suæ limites transiliat.

## C A P U T VIII.

*Sive Fasciculus Morborum octavus.*

## C O R P U L E N T I A N I M I A .

*Ettmulleri sententia.*

*Corpu- Art. 1740. C*orpulentia nimia sive obesitas  
*lencia si-* nimia, est, quando corpus to-  
*ve obesi-* tum tam venter quam artus in tantum augen-  
*tas.* tur, ut actiones, imprimis motus ac respirationis,  
aut omnino impediuntur, aut insigniter vitien-  
tur. *Seppertus* refert mulierem 450 lb. item vi-  
rum 600 lb. pendentem. Prostant exempla apud  
*Schenckium* corpulentorum obesitate suffocato-  
rum. „ Obesitas nimia corpus reddit variis mor-  
„ bis obnoxium, speciatim apoplexiæ, asthma-  
„ ri, hæmorrhoidibus, calculo, ulceribus cru-  
„ rum, hydropi, &c.

*Difficile  
collitur.*

*Art. 1741.* Ad obesitatem tollendam non da-  
tur præstantius remedium quam *acetum scilliti-*  
*cum* jejuno stomacho haustum. Semen *fraxini*  
seu *lingue avis* ad ℥j. mane in haustu vini pro-  
pinatum insigniter commendatur ad evacuan-  
dam urinam, ratione cujus, & hydropicos cu-  
rat, & crassos emaciat.

*Valde o-*  
*bese quã-*  
*doque*  
*subito*  
*moriun-*  
*tur.*

*Art. 1742.* „ Borellus commendat masticatio-  
„ nem *fol. tabaci*, sed in omnibus minus con-  
„ venit, ne ad *tabem* disponat. Qui natura  
„ sunt valde crassi magis subito moriuntur,  
„ quam graciles; “ *Hippocratis Aphorism.*



*Junckeri Sententia.*

*Art. 1743.* Nimia obesitas uti totam vitam <sup>Nimia</sup> fatis moleſtam reddit, ita & in Medicis mul- <sup>obſtatis</sup> tas deliberationes excitavit, qua fieri poſſet ra- <sup>cauſa</sup> tione, ut ejuſmodi ſubjecta ab hoc onere libe- <sup>frustra</sup> rafentur. <sup>quari-</sup> <sup>tur.</sup>

Vanis ſpeculationibus ſuperſtructurum eſt, quod ſecundum veteres hepar calidum temperare, vel ſecundum recentiores illud fermentum aut ſal ſubigere, & corrigere quod pinguem lym- pham coagulat, nuncupatur. Immo nec illa qui- dem methodus, quæ ſanis rationibus innititur, hic ſufficit. Licet enim blandæ laxationes, & venæ ſectiones æquinoctiales inſtituantur, ex- cretiones naturales promoveantur, & diætâ te- nuiffima imponatur, hæc tamen omnia obesi- tati nihil detrahunt.

*Art. 1744.* Multo minus operæ pretium fa- <sup>Plurima</sup> ciunt illa remedia, quæ ſpecifica paſſim cele- <sup>remedia</sup> brantur ex. gr. piper, ſal abſinth. ſuccus citri, <sup>celebran-</sup> acet. ſquillit. decoct. lign. ſanct., maſticatio fol. <sup>tur inu-</sup> tabac. & ſimilia. Exiguum etiam emolumen- <sup>tilia.</sup> tum afferunt chirurgica præſidia: videlicet ve- ſicatoria, fonticuli puncturæ cum acubus, ut pinguedo effluere debeat.

*Art. 1745.* Per ſalivationem, fortiffima pur- <sup>Quædã</sup> gantia, frequentes ſudationes, & alia impetuo- <sup>etiam</sup> ſa remedia corpulentiam nimiam remove- <sup>noxia.</sup> re, temerarium, & periculofum eſt tentamen. Fe- bres acutæ atque intermittentes auferunt qui- dem ſæpius obesitatem ad ſummam uſque cor- poris emaciationem, ſed non raro, quod con- ſumptum eſt, mox recuperatur.

*Art. 1746.* Moderatus uſus thermarum, & <sup>Nonnul-</sup> acidularum ſalutaris quidem ſubinde obſerva- <sup>la qua</sup> tur,

*magis  
va.ent.* tur, ita ut corpulentia quid detrahat, & speciatim sterilitatem in obesibus foeminis auferat, attamen brevi post pondus pristinum refarcitur.

Hinc nisi vita otiosa, & sedentaria in laboriosam, eamque sufficienter per prudentes succussus, & gradus mutetur, reliqua omnia erunt manca, & inepta. In laboriosis enim quamquam habitus corporis pinguis nonnumquam reperiatur, ad excedentem tamen corpulentiam non pertingit.

## C A C H E X I A.

*Cache-  
xia cau-  
sa.* *Art. 1747.* „ Cachexia ita dicitur a corporis  
„ malo habitu; nascitur plerumque ex intem-  
„ perantia ægotantis, vel alicujus morbi præ-  
„ gressi mala curatione; a tumore scirrhuso je-  
„ coris vel lienis, vel a fluxu hæmorrhoidum  
„ nimis longo, & profuso, vel aliis hæmorrhæ-  
„ giis; ex febribus continuis diuturnis, vel in-  
„ termittentibus male curatis; ex crapula, vel  
„ nimia spirituosorum liquorum ingurgitatio-  
„ ne; ex chlorosi, catameniorum obstructio-  
„ ne vel fluxu nimio, & ex innumeris aliis  
„ causis. “

*Signa  
diagno-  
stica.* *Art. 1748.* „ Signa diagnostica sunt pallor su-  
„ baibidus, aliquando etiam plumbeus color,  
„ debilitas ac piger corporis motus cum infla-  
„ tione aliquali, in quibusdam ventris fluor  
„ cum febricula vesperi recurrente, pulsus cre-  
„ ber ac densus, cibi fastidium, & vini magis  
„ appetentia, urina biliosa, interdum vero ru-  
„ bicundissima, frequenter autem cruda, &  
„ pallida. “



*Cœlii Aureliani sententia.*

*Art. 1749.* Cachexia nomen sumpsit a corporis habitu malo. Ejus curationem ante *The- misonem* nullus ordinavit. Fit autem five na- *Cachexia causæ.* scitur hæc passio intemperantia ægrotantis, vel curatione mala medicantis, aut post ægritudinem tardæ resumptionis causa; item ex medicaminibus (in primis purgantibus) sæpissime potatis, vel ex saxeæ duritie jecoris aut lienis, vel ex fluxu hæmorrhoidali longissimi temporis, aut vomitu &c.

*Art. 1750.* Est autem hæc passio sæpissime *Effectus.* hydropismi antecedens causa, aut macularum in superficie corporis accidentium. Sequitur cacheticos pallor subalbidus, aliquando etiam plumbeus color, debilitate tardus, & piger corporis motus cum inflatione inani, in aliquibus etiam ventris fluor cum febricula in plurimis latente, quæ circa vesperam magis augetur; pulsus creber ac densus, cibi fastidium, & vini major appetentia, urina fellea, & extensio venarum.

*Art. 1751.* Hujus morbi curationem eleganter sic exornat *Ægineta*: sanguis si nihil prohibeat pedetentim, & partitis vicibus per tri- *Curatio.* duum aut quattriduum exhaustus est: evacuandi autem maximæ sunt, qui ob hæmorrhoidalis aut menstrualis expurgationis retentionem in hanc affectionem inciderunt. In iis vero, qui ob humorum plenitudinem hoc malo conflictantur, ab evacuatione sanguinis per venam abstinendum: omnino vero hiera ex colocynthide apparatus purgandum. Victus ratio hoc malo implicitis tenuis ac siccifica ex usus est.

Naturalium aquarum usus conceditur maxime,

me, quæ aluminis, & nitri mixtura constant; deinde quæ sulphuris naturam habent. Mirifice autem ipsos juvit delibatio juris absinth. & dropaces. Quod si affectus in aquam intercutem deciderit, tum hydropicorum curatione subveniendum est.

*Ettmulleri sententia.*

*Cachexia descriptio.* Art. 1752. Cachexia est affectus in quo natus, & floridus cutis color, ac imprimis faciei nitor perit, mutaturque in pallidum, lividum, luteum, virescentem, intense rubicundum, &c. frequenter cum corporis habitu subtumido, lassitudine, &c. adest sæpe febris lenta, ægro vix sensibilis.

*Curationis methodus.* Art. 1753. Principium curæ a vomitu faciendum est: attamen ante vomitorium consultum erit, ut *digestiva salina* præmittantur cruditates solventia, ut *crem. tartar. vitriolatum*, *sal digestivum hypochondriacum*, dos. a ℥j. ad ʒß. bis in die; *sal. absynth. tinctura sal. tartar. &c. item pulveres absorbentes dicti*, *antimon. diaphoretic. antihectic. Poterii*; & tunc propinandum est *vomitorium*, vel, si minus conveniat, catharticum; deinde his ita præmissis fit accessus ad *martialia*.

*Remedii singulare.* Art. 1754. „ In tota republica medica vix datur præstantius remedium quam *mistura ecphra-*  
„ *etica Fulleri*.

*Tozzi sententia.*

Art. 1755. Cachexia plerumque sequi solet obstructionem, & affectionem hypochondriacam vel scorbuticam, in foeminis autem sæpenu-mero ab utero oritur, vel ob immodicum men-  
struo-



struorum profluvium, vel ob eorundem suppressionem. Neque vero solum foeminis sed viris quoque viscerum infarctus Cachexiam attulere ex Anatomicis observationibus Bartholini, Lotichii, Highmori, Hildani, Heurnii, & aliorum.

*Art. 1756.* Cachexiam diutius protractam infequitur Hydrops, qui in Ascitem Tympanitem, & Anasarcam communiter dividitur ut paulo supra. Ad ejus causam emendandam præterea, quæ ad viscerum obstructions usurpantur, summe proderit tinctura hæc quotidie mane pluries, prout necessitas exegerit, repetita. *℞. Limat. mart. q. v. Tartar. albiss. duplum decoquantur in aq. pluvie repurgatæ octupla vel decupla quantitate quousque pulvis in fundo vasis siccus remaneat. Mox vero extrahatur inde cum sp. vin. tinctura, & seorsim servetur. Residuum iterum cum s. q. ejusdem Aquæ ad siccitatem usque decoquatur, & tinct. pari modo ut supra extractam priori adjice, & tertio id ipsum denuo repete. Tandem per filtrum trajice, & in vase vitreo tinct. ipsam ad usum serva. Hujus dosis est unc. semis.*

*Martis  
Tinct.  
singula-  
ris.*

### Heisteri sententia.

*Art. 1757.* Si cachexia a febribus intermittentibus inveteratis, vel male tractatis oriatur, primo ad humores noxios evacuandos lenia laxantia, ut pilulæ tartareæ, extr. panchym. *Crolii*, pilul. nostræ polychrestæ, Beccherianæ, aliæve similes dandæ, ac deinde medicamenta antifebrilia, salina & amara, quo cortic. aurant. cortex peruvianus, & cascarilla pertinent quæ sæpius usurpata maxime conducunt, & præsertim

*Cachexia a  
febribus  
curatio.*

tim etiam vina medicata, quæ præter alia amara, modo laudati cortices ingrediantur.

*Ab hæ-  
morrhoi-  
dibus aut  
mensibus  
suppres-  
sis.*

*Art. 1758.* Si ab hæmorrhoidibus suppressis, tunc præmissis attenuantibus, & evacuantibus, speciatim hæmorrhoides pellentibus, si eæ iterum non fluant, hirudines ano applicabuntur vel venulæ tumentes scalpello aperientur, aut si hoc non placeat, earum loco venæ sectio in pede instituitur, quæ deinde præservationis gratia circa æquinoctia repetitur, idoneo victu subjuncto, & motu frequenti.

Cachexia a mensibus suppressis vel inordinatis requirit, ut fluxus eorum restituatur, atque in ordinem redigatur: quod qua ratione fieri debeat, dictum est, quibus postea roborantia, & tonica adjungentur.

*Animia  
hemor-  
rhagia.*

*Art. 1759.* Si ab hæmorrhagiis nimis prægressis cachexia oriatur, blanda analeptica, emulsiones, gelatinæ, & juscula, maxime vero moderata diætâ adhibenda, ne copiosioribus alimentis chylus crudus, indigestusque nimia copia generetur: quapropter & blanda stomachica, ac roborantia, præsertim amara, itemque mixtura tonica ex sp. C. C. cum tinct. tart. remixto, vel ex essent. absynth. composita cum essent. chinæ aut cascarillæ, vel & vina medicata amara, & roborantia sunt suadenda, vitando calidiora aromatica, & spirituosâ, ne novus orgasmus aut ebullitio in sanguine excitetur, quæ alias novam facile hæmorrhagiam concitaret.

*A repul-  
sa scabie.*

*Art. 1760.* Si a scabie repulsa, purgantia mercurialia, & diaphoretica, sæpe jam laudata, alternatim adhibenda, speciatim vero inter diaphoretica: essentia helenii, & fumariz, itemque decocta lignorum, sive infusa eorum pugillaria calida, matutino præsertim tempore cum



cum leni sudoris regimine, reliquis palinam præripiunt. His denique mixtura tonica aliave roborantia subjungenda.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1761.* Cachexia habet pro causa vel li- Cache-  
xia cau-  
sa.  
quidi nutrientis depravatam indolem ab assum-  
ptis, quæ non possunt assimilari restituendis, a  
defectu motus animalis a vitiatis organis, vel  
vasorum recepturorum vitium ob nimiam con-  
tractilitatem & laxitatem, vel defectum facul-  
tatis applicantis, quia vires circulantes sunt ni-  
mis languidæ, & nimis violentæ. *Eoerhaavius.*

*Art. 1762.* Organi primarum concoctionum Curan-  
di ratio  
genera-  
lis.  
leni digestivo, vomitorio, purgante vel robo-  
rante probe dispositis, attenuantibus, diureti-  
cis & sudoriferis insistendum aliquamdiu erit,  
atque ultimo loco calybeata adhibebuntur, Al-  
calina, saponacea, cum exercitio cursus, ve-  
ctionis, frictionis, balnei. *Idem.*

*Art. 1763.* Acrimonia humorum potest ali- Tabes  
Cache-  
ctica.  
quando causam dare consumptioni, & tibi ca-  
chetica, illamque in hoc morbo adesse non-  
numquam indicavit Celsus, dum de hoc morbo  
agens, dixit: *Hnic, præter tabem, illud quoque  
nonnumquam accidere solet, ut per assiduas pustu-  
las, aut ulcera, summa cutis exasperetur*, quod  
ab acrimonia majori humorum ad cutem dela-  
torum fieri videtur. Sed ex tabe inde exsurgente  
liquido innotescit, quod dum acida acrimonia  
laborant juniores diu, totum corpus miserrime  
contabescit, solo abdomine tumente, & infar-  
cto, a reliquiis indigestis ciborum. Sic in scor-  
buto inveterato: ubi acrimonia magna humo-  
rum adest atrophiam sequitur. Item in cancro  
exulcerato, dum veris sanies pro parte resorpta  
san.

Sanguinem infecit, videmus torosa corpora vero marasmo exsiccari, licet optimorum alimentorum debitam copiam sumant. Ut autem curatio hujusmodi tabis Cachecticæ rite procedat prius debet cognosci acrimoniæ prædominantis indoles propria, quantum per artem hoc indagari poterit. *Van Schuvieten.*

*Cachexia a primis vis curatio.*

*Art. 1764.* In Cachexia curanda quando primæ viæ sunt in culpa vomitorium, vel purgans primo requiritur, postmodum in massa sanguinea, stagnansque in partibus pituita facili negotio per appropriata resolventia, & diaphoretica remedia eliminatur, qualia sunt: rad. ari, armoratiæ, vincetoxic. cichorii, helenii, zedoar. galang. herb. centaur. min. Card. bened. absinth. rorifmar. menth. rutæ, salv. nastur. cochlear. faturej. thym. puleg. meliss. hyssop. Rhapont. dauci, organ. & alia aromatica ac salina volatil. præcipue sal volat. viperarum.

*A debilitate solidorum curatio.*

*Art. 1765.* In Cachexia a spirituum defectu, & fibrarum motricium languore præ memoratis spirituosæ utiliter adduntur qualia sunt: Mellissa cum vino, cinnamom. &c. immo ipse vini spiritus, quo *Ridlinus* cachexiam hujusmodi curasse testatur, inter cœnandum, & prandendum tantum adhibitus. *Langius.*

*Monitus ad præxin.*

*Art. 1766.* Ad pedum tumores, ne indecore augeantur, fasciæ idoneo modo involutæ faciunt, vel machinæ ex corio vel linteo ad modum tibialium constructæ, de quibus vide Institut. Chirurg. *Heisteri Tab. XXXVI. fig. 11.*

Tandem circa curam Cachexiæ in genere hanc attendat cautelam Medicus, ne remediis fortioribus illam aggrediatur, sed, in quantum possibile, lenissimis, citius enim obtinebit intentionem suam, si debitam diætā simul observaverit æger, & animi pathemata rite composue-



posuerit . Siquidem novum non est cachexiis felicissime succurri , statim ac ægris animus reddit , antea curis , aut aliis objectis adversis pressus . Venus hinc non raro medica observatur , virginumque fœdos colores auferre .

## H Y D R O P S .

*Art. 1767.* Hydrops morbus est auctæ magnitudinis totius corporis vel inferiorum artuum præsertim vero abdominis a lymphæ stasi, quasi ab aqua, quæ consuetum absolvere nequit circulum : unde græci vocabuli significatio derivat . De hujus morbi speciebus omnes sane æque non conveniunt ; sed ex Antiquorum mente easdem opportune sic distingui posse percipimus . Omnes  
hydropis  
species .

1. Hydrops improprie dictus totius corporis Græce *Leucophlegmacia* summus gradus Cachexiæ videtur , quod impedito lymphæ circuitu eadem in vasis suis stagnando , & minimas præsertim intercutaneas arteriolas venulasque comprimendo cutis albedinem atque omnis exterioris corporis habitus flaccescientiam , & turgescientiam producit . Hanc vero speciem sapienter Hippocrates hydropem secundum venas dixit ; quamquam nec hydropis vocabulo dignam reputet in Aphorif. 78. Sect. VII. ubi ait : *Leucophlegmati hydrops supervenit .*

2. Hydrops proprie dictus totius corporis Græce *Anasarca* , prima morbi species videtur , cui proprie hydropis nomen conveniat . Hæc nihil aliud est quam gravior Leucophlegmacia , ex eo quia serum sanguinis a vasis lymphaticis per cellularem tunicam tandem erumpit ; & hanc Hippocrates *Hydropem secundum carnes* , Galenus *aqua intercutem* , & Serenus Samonicus *lymphaticum errorem* vocarunt ,

3. Hy-

3. Hydrops per *diffusionem* quem Lympha non per cellularem tunicam, sed in quadam corporis cavitate affatim congregata tumorem edendo producit. Atque hæc species pro diversitate loci: ubi effusa lymphæ congregatur, varia acquirit nomina: nam in Thorace *Pectoris hydrops*, in Pericardio *pericardii hydrops*, in Capite *Hydrocephalon* &c. vocatur. Ubi vero Abdomen tenet tunc triplicem subit divisionem patat: in *Ascitem*, *hydropem cysticum* vel *vesicalem*, & *hydropem Peritonæi*, de quibus omnibus singillatim infra.

4. Hydrops *Tympanites* abdominis, in quo venter non magis aqua, quam contentio aëra turgescit, quæ species improprie hydrops diceretur si nisi ex aëre esset, sed quia una cum eo etiam plurima aqua seu limpha semper invenitur, sicut ipse ascites omni aëre non caret, ideo nec perperam Tympanitidi hydropis nomen tribuitur, nec omnis abdominis hydrops unius speciei semper reputandus.

## LEUCOPHLEGMATIA,

*Leuco-phlegma* „ *Art. 1768.* „ Quoties in toto habitu pinguedinis subcutaneæ lymphæ stagnat, vel effunditur, hydrops oritur ἀνὰ σάρκα, ὑπὸ σάρκα, καὶ ἐν σάρκι, qui & circa abdomen, & circa scrotum. „ *Boerhaave.*

### *Areteæ sententia.*

*Bina* „ *Art. 1769.* Si omne corpus intumescat præter *Leuco-phlegma* Illia, & ventrem ex alba pituita crassa, & viscida morbus *Phlegmatias* dicitur; si vero carnes liquatæ sint in humorem sanguineum, aquosum, & tenuem, qualis ab intestinorum ulceribus



ribus emanat, cujus similis effluit, vix ac alibi cutis superficies vulneratur morbus dicitur *Anasarca*.

*Art. 1770.* In utroque hydrope sub tumore omnia mala delitescunt, somni sunt graves, torpentes, breves, animi languor, circa minima quæque sollicitudo, vivendi cupiditas, tolerantia non ex animi alacritate, ac bona spe, ut in iis est, qui prospera fortuna utuntur; sed ex ipsa morbi natura; neque causa dici potest, sed mirari tantum id licet, quod mehercule magnum est; namque in aliis haud omnino perniciosis affectibus ægrotantes abjecto sunt animo, tristes & mortis amatores; in his vero, & bene sperant, & vitæ cupidi sunt. Interea colore ex atro viridique permixto infecti sunt, obscurasque, & nigras venas habent.

*Utri-  
usque  
sympto-  
mata.*

Inter hydropes leucophlegmatia mitior habetur: nam multæ & variæ sunt ejus tollendæ prosperæ occasiones, sudoris nempe aut Lotii excretionem, aut alvi nonnumquam copioso effluvio.

*Prognosis.*

*Art. 1771.* Morbum hunc describit Coelius Aurelianus: quod mollis sit atque humida inflatio ventris, ac vultus, & crurum, & scroti, vel præputii, relucente liquore per cutem albidum coloris, item cum oris vel spirationis, five anhelitus foetore: totius corporis gravedo, & impressioni digitorum cedens tumor ita, ut paululum cava permaneant loca. Aliquibus etiam alborum atque crassorum humorum vomitus, vel per ventrem egestio: unde etiam nomen passio sumpsisse a græca derivatione videtur; *leucon* enim albidum, *phlegma* humorem crassum vocaverunt, vel quod ægrotantis color albidioris pituitæ imaginem referat.

*Descriptio  
priori al-  
tera.*

*Ettmulleri sententia .*

*Art. 1772.* Signa Leucophlegmatix sunt totius corporis tumor albus, mollis, laxus, revera œdematosus in pedibus ac cruribus potissimum, & manibus, bibendi desiderium, urinæ tenues, albæ, &c. incipiente cachexia ( inquit *Lommius* ), vitatur cibi concoctio, incolumi etiam appetentia : progressu vero temporis hæc quoque offenditur : spiratio debilis, ac rara, alvus varia ac inæqualis est, atque hujusmodi *cachexia cruda* seu *pituitosa* nominatur, hydropis speciem antecedit, venturamquæ prænunciat, quam *λευκοφλεγματίαν* Græci nominaverunt.

*Curatio.* *Art. 1773.* Præter purgantia & martialia, &c. in cura *cachexie* superius laudata, hic conveniunt sudorifera & diuretica, speciatim decoctum ligni guaiac. &c. Lixivium ex ciner. absynth. genist. &c. post martialia, amara (& stomachica) utramque faciunt paginam: In *Anasarca* conveniunt folia virid. bardanæ plantis pedum, & juncturis applicata: nam mirum est quantam uliginem extrahant cum ægrorum levamine.

*Vuillisi sententia.*

*Anasarca.* *Art. 1774.* Anasarca est totus corporis exterioris, aut quarundam ejus partium, tumor albus, mollis, tactui cedens, & foveam a compressione relinquens.

*Curatio.* *Art. 1775.* In curanda anasarca lixivialia cæteris diureticis longe præstant. ℞. Ciner. genist. ad albedinem calcinat. & cribrat. ℥iv. ponantur in lagena vitrea cum vin. alb. ℔ij. digerantur clausæ & calide per hor. iij. vel iv. dein coletur vinum



num dos. cochl. vj. vel viij. bis in die. ℞. Ciner,  
genist. alb. & mundat. ℞ij. rasur. lign. sassafr. ℥iij.  
rad. galang. ℥j. bacc. junip. sem. dauc. ana ℥jss. f.  
saccul. pro cong. iv. cerevis. post 7. vel 8. dies hau-  
riri incipiat. *Chalybeata* in hoc morbo sæpe-  
numero egregie profunt, & aliis præstant præ-  
paratis, quæ sulphure non spoliantur; ℞. Rasur.  
lign. sanct. sassafr. ana ℥iv. rad. irid. florent. calam.  
aromat. galang. minor. enul. campan. ana ℥i ss. bacc.  
junip. laur. ana ℥ij. sem. anis. carui, fœnic. dulc. co-  
riandr. anath. ana ℥i ss. piper. long. cubebar. ana ℥i ss.  
caryoph. N. M. zinzib. ana ℥ss. piper. Jamaic. ℥ij.  
fol. ficc. salv. scord. calamenth. agrimon. ana mj.  
liquirit. ℥iij. incis. & contus. coq. in aq. font. cong.  
iv. ad mediet. colatura servetur in lagenis vitreis  
ad usum; hujus potu constanti plures Anasarca  
fere deplorata laborantes convaluisse novi, p.  
254. Medicamentum sequens, *Radcliffeanum*  
„ fuit præscriptum. ℞. Cort. interior. sambuci m. ij.  
„ summit. absinth. Roman. mss. rad. gentian. ℥ss.  
„ sem. sinap. dauc. sylv. ana ℥iij. infund. in vin. alb.  
„ Gallic. ℞ij. Bibat. haustul. ter in die.

### Farrago Sententiarum.

*Art. 1776.* Anasarca totius Corporis potius *Defini-*  
quam imi ventris affectus sic describi potest, *tio.*  
quod sit totius corporis exterioris, aut quorum-  
dam ejus partium tumor albus mollis, tactui  
cedens, & foveam a compressione relinquens,  
ab humore aquoso extravasato, atque tum intra  
musculorum interstitia, tum intra carnium, cu-  
tis, imo glandularum, & membranarum poros  
aggesto procedens.

*Art. 1777.* Hydropem Anasarcam, & vena se- *Anasar-*  
cta interdum, & purgatione curare oportet in- *ca inter-*  
quit *Trallianus* quantum vires permittunt. Se- *dum san-*  
guinis

emissio-  
nem exi-  
t.

cus commodè sanguis detrahitur ubi vires re-  
creatæ, & copia vitiosi humoris Picra levata  
fuerit. Post usum vero eorum, quæ aperiunt,  
materiamque fluxilem reddunt, transeundum est  
ad ea quæ tuto, & paulatim evacuant. Explicat  
autem sanguinis missionem faciendam esse, in  
quibus & maxima est obstructio, & inflammatio  
scirrhusa.

In ea-  
dem in-  
solatio  
proficua.

*Art. 1778.* *Celsus* vero partes quæ tument So-  
li subicere jubet, sed non nimium ne febricu-  
la incidat, & si vehementior est caput velan-  
dum, tum frictiones laudat madefactis tantum  
manibus aqua cui sal, & nitrum, & olei pau-  
lum sit adjectum.

Tum ti-  
bie inci-  
sio.

*Art. 1779.* In Leucophlegmatia incisio in ti-  
bie parte interiore fieri debet, duobus super  
talum digitis, ita ut vulnus ad cellulosa mem-  
branam nec ultra penetret, quo per dies ali-  
quot frequens humor feratur, crus autem inte-  
rea fovere oportet decocto herbarum emollien-  
tium, & calidarum, adjecto spiritu vinoso, cui  
addita sit camphora. Hanc medicinam non tan-  
tum in hac morbi specie, sed & in ipso ascite  
multum profuisse, quin & interdum sanasse  
multoties expertus sum; profluente per multos  
dies, tanta liquoris copia, ut fidem superet.  
Ita *Meadius* quem verisimile credimus hujus-  
modi remedium a *Celso* mutuatum esse. Inquit  
enim: „ Incidendum quoque est super talum  
„ quatuor fere digitis ex parte interiore, qua  
„ per aliquot dies frequens humor feratur, at-  
„ que ipsos tumores incidere altis plagis oportet „.  
Monitum vero addit insuper *Meadius*  
quem plurimi facimus, videlicet cavendum es-  
se, non in ea tantum incisione, sed & in omni-  
bus, quæ in quacunque corporis parte aquæ e-  
ducendæ causa fiunt, ne nimis inde exhaurien-

tur



tur vires, quas æque prosternit humor ita emissus, ac si sanguis tantumdem efflueret.

*Art. 1780.* In hujusmodi hydrope quoque *Remedia* præstant staphæ siccæ, sive sudatoria in lecto *alia*, secundum artem facta, modo febris absit.

Anasarcam cathartici validioribus impet cum *Villifio* vel *Sylvius de lo Bois* sentit, *Barbette* contra cum Antiquis placet evacuatione per episcrasin curare. De utroque purgantium genere nos summopere ambigendum credimus, utiliora namque diuretica, & sudorifica reputamus.

## A S C I T E S.

### *Cælii Aureliani sententia.*

*Art. 1781.* Generatur hydrops ( præcipue ascites ) ex accidentibus plurimis, atque diversis *Omnis hydropis causa.* causis, ut cachexia, febribus in corpore tardantibus, item duritie, & saxeæ densitate jecoris, vel lienis, aut stomachi, vel peritonæi membranæ aut matricis: item spirationis difficultate quam græci dispnoeam vocant, vel ventositate stomachi, aut coli, aut ventris passione quam coeliacam vocant: item longi temporis dysenteria, vel in foeminis menstrualis fluoris retentione: item hæmorrhoidarum veterum repentina, atque incondita curatione facta abstinentia, vel coacervata bibentium transvoratione, & magis si falsa fuerit aqua: item medicaminum frequentata potione, & horum similibus.

*Art. 1782.* Asciten sequitur ventris inflatio, *Diagnos.* vel extantia, & pro corporis motu liquoris se se collidentis sonitus ad concussam palmæ tanquam semipleni utris resonus; item cum ex uno latere in alterum æger vertitur, & palma impressa, demersio & resurrectio liquoris. *Superio-*

iores vero partes siccae sunt, & tenues perinde ac cutis secundum ora, vel colla, aut jugula, vel pectora extenderetur. Jacentibus præterea ægrotantibus diffusa, atque latior tumoris extantia fit, surgentium vero vel flantium major, atque extenta.

Crescente passione corporis frigus atque torpor accedit, aliquando etiam tussicula, & stercoreum vel urinæ suppressio, & per ventrem fluidior exitus, & apprehenso scroto atque veretro extans inflatio reduplicata, quia veretrum ipsum tamquam in nodum torquetur, & aliarum partium surgens tensio sicut in leucophlegmatia.

Prognosis.

Art. 1783. Difficiles curatu sunt hydropes a saxea duritie facti alicujus visceris, a dysenteria, a jecore: quam qui a simplici duritie, a nimio potu, & a liene fiunt. Difficilius maribus curantur foeminae, adulti, & senes quam pueri, vel pubentes, æstate ob multam sitim ægrius quam hyeme. Observat insuper *Hippocrates*: Quibus magni tumores facti emarcescunt, ac rursus attolluntur hi magis convalescunt, quam illi qui ex sanguinis eruptione implentur, seu hydropici fiunt; nam hi hydropes ipsos ægros fallunt, faciuntque ut a medicis discedant, ac pereant. Si autem febris post multum sanguinem sursum ac deorsum eruptum insuper accesserit, & æger multa aqua inde repleatur, hic hydrops brevissimi temporis est, ex quo paucissimi evadunt.

Eum qui ab hydrope correptus est, & superstes esse volet; bonis visceribus præditum esse oportet, ita ut natura se exerat simulque facile concoquat, & bene spiret, sitque sine dolore, & totum corpus æqualiter tepidum habeat, & non circa extremas partes colliquatum; Me-  
lius



lius est autem, ut tumores potius habeant in extremis partibus. Optimum tamen est neutrum horum habere. Nam molles & graciles esse convenit extremas partes, itemque ventrem ad contactum mollem, tussim vero adesse non oportet, neque sitim, neque linguam resiccare, tum reliquo tempore tum post somnos, cibos libenter accipere, & ubi multum satis comedit non affligi, alvum vero ad medicamenta quidem celerem habere, reliquo autem tempore egarere recrementum molle efformatum; Urinam pro fluidorum ratione, & vinorum mutatione transeuntem. Laborem denique ferre oportet facile, & lassitudinis exortem esse. Homo ita per omnia dispositus securissime sanus fieri poterit; sin minus, sed plurima ex his habeat, spes erit, ut superstes evadat; qui vero nihil horum habuerit, sed contraria eum desperatum esse scito. *Hippocrates. Lib. II. prædict.*

*Sydenhami sententia.*

*Art. 1784.* Foveæ a digitorum impressione in surarum parte inferiori, sub noctem imprimis conspicuæ & mane evanescentes, primum humilis. *Hydropis historia.* jusce morbi indicium præbent, maxime si adsit dyspnœa. Patulatim crescit morbus, & abdomen quoque intumescit, & reliquæ corporis partes emaciantur. Tria hunc morbum stipant symptomata, *dyspnœa, urine paucitas, & sitis intensa.* Causa hujus mali in genere est debilitas sanguinis.

*Art. 1785.* Indicationes curativæ sunt tantum duæ, viz. *aquæ evacuatio* & sanguinei roboris *instauratio.* Magni interest, an æger facile vel difficulter purgetur. *Cathartica fortiora, & quæ* *Indicationes curativæ.* cele-

celeriter operantur, mitioribus & fegnioribus sunt præferenda, & repetenda sunt, quoties ægri vires ferre queant. Duo sunt medicamenta palmaria, nempe *elaterium*, & infusio *crocī metallorum*. Quinam sint meatus isti, per quos aquæ ex abdominis cavitate in intestina deducuntur, incertum est; experientia vero constat a dicto emetico sursum ac deorsum potenter evacuari, & quasi ruptis repagulis pleno alveo effundi. Est etiam aliud medicamentum, quod hunc morbum expugnat, vomitionem ac catharsin ciens pariter ac crocus metallorum; viz. *℞. Cort. interior. sambuc. m. iij. coq. in aq. & lact. ana ℥j. ad dimid. Colaturam capiat ægrotus dimidiam vespere & reliquam mane, repetatque quotidie, donec convalescat.*

*Sanguis  
ac visce-  
ra corro-  
boranda  
sunt.*

*Diureti-  
ca usur-  
panda.*

*Stoma-  
chica &  
amara.*

*Art. 1786.* Fatendum est tamen, quod in quibusdam casibus *emetica & cathartica* malum non tollant, sed potius augeant; rebus itaque sic se habentibus totus curationis cardo in sanguine ac visceribus omni ope *corroborandis firmandisque* omnino vertitur; ad hoc autem magnopere conducunt *aeris mutatio* atque *exercitium*. Ii quorum crases sunt debiliores, quam ut purgantibus ferendis pares sint, *diureticis* evacuandi sunt; illa optima sunt, quæ e salibus *lixivialibus* fiunt, nec quicquam refert e quorum vegetabilium genere cineres petantur: sequente infusione uti soleo; *℞. Ciner. genist. ℥j. fol. absynth. m. j. vel ij. vin. Rhenan. ℥iv. infunde frigide; dos. ℥iv. mane hor. 4<sup>a</sup> pomerid. & sero.*

*Art. 1787.* Aquis his modis eductis ad *corroborantia* deveniendum est; in hunc finem ægrotus bibat vinum & liquores generosiores, item capiat *invigorantia, stomachica & amara*; primum locum obtinet *chalybs*, *allium* quoque mustum confert. Semper recordandum est, quum san-



sanguinis corroborationi navatur opera, quod tota res in eo solum cardine vertatur, & æger nullo modo expurgandus sit. Morbus ad supremum gradum proventus artis subsidia spernit.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1788.* Hydrops *primarius* per se incipiens plerumque vitio læsæ in primis viis digestionis ortum debet; *secundarius* ex variis causis oriri potest, ut hæmorrhagia, febre intermittente, &c. Hydrops superveniens morbis chronicis, & ætate gravescentibus rarius curatur. Sudor in *ascite* plus nocet quam prodest; evacuationes per alvum & urinam sunt magis proficuæ. In initio Hydrops tanquam *cachexia* curatur. Recte dicit *Lindanus* qui vult curare Hydropem, raro debet purgare, dare tamen tunc debet ea, quæ certo ac vehementer purgant, sed raro; intermedio tempore appropriatis & aperientibus, ac massæ sanguineæ vitia ex cruditatibus orta, ac reliquorum humorum corrigentibus, & in naturalem crasin reducentibus, debet insistere. Instituantur purgationes decrescente luna. „ Qui „ *cachexia* laborant inveterata (inquit *Doleus*) „ & qui sunt quasi eviscerati, iis non conducunt *cathartica* nec *diaphoretica*, aut alia ulla „ remediorum genera aquis exhaustiendis accommodata, sed solis *corroborantibus* utendum. „ Hujusmodi itaque in casibus sero nimis accersito medico aliud nil quicquam restat faciendum, nisi ut prudenter præmissis permagni illius, in quo ægri versantur, discriminis prognostico experimentum faciat, quantum auxilii sit sperandum ex usu *cardiacorum martialium*. „ Et si scorbuti labes simul adsit, cum *antiscorbuticis* commixtis res peragenda est.

*Methodus  
medicandi.*

*Art.*

Diure-  
tica &  
purgan-  
tia.

Art. 1789. In Hydrope curando *diuretica* sunt omnium optima, sed semper præmitti debent universalia *attenuantia*, *aperientia* & *laxantia*, alias non tuto ad *diuretica* acceditur. *Purgantia* sunt *cort. sambuci*, *ebuli*, *rad. irid. resin. jalap. gum. gutt.* præ omnibus *elaterium* teste etiam *Lindano*, denique *colocynthis*; inter mineralia, *pilul. lunares*, *mercurialia*, &c. cæterum his purgantibus semper interponenda sunt *stomachica*, inter quæ eminent *absynthium*, *marrhubium*, &c. proximo loco *diuretica* in usum revocanda sunt, *radix allii* multum laudatur (in quibusdam vero intolerabilem capitis dolorem excitat) item *bacc. juniperi*; sed præ reliquis omnibus succus *herbæ kali* ad ℥ß. bis in die in haustul. vin. tribus tantum diebus singulis septimanis usurpetur, alias nimis urinam pellit; item eodem modo cineres *busonum* ad ℥j. vel ultra. „ Hoc remedio *Roma* sanatus fuit *Hydropicus* diu decumbens, „ cui ejus uxor, sumptuum pertæsa, de eo derat, veneno tollere cogitans, unde copiosum reddidit lotium, iterumque dato pulvere, ut mortem præcipitaret, sed multo uberiorius reddita præter spem sanatus est vir ejus, „ ut habetur in lib. Vvieri de Lamiis. *Helleborus niger* (monente *Avicenna*) urinam potenter movet. Hujusce remedii (inquit *D. Freind. Hist. Med. p. 105. vol. 2.*) vires frequenter expertus sum, & in *Hydrope*, confiteor, effectus plus admirandos, observavi, quam ex alio qualicunque diuretico.

### Vvillisi Sententia.

Art. 1790. *Ascites anasarca* superveniens est facilioris curationis, quam morbus *solitarius* propter tumores circa viscera, vel propter vasa lym.



lymphatica, aut lactea disrupta eveniens. Si quando in Ascite, a cathartico exhibito, aqua copiose cum *Ascopia* per sedem evacuatur, indeque abdominis intumescencia quidpiam minuitur, de curatione non desperandum erit, si vero venter plus intumescat, & velut *tympaniticus* evadat, morbi eventum non nisi funestum expectare licet.

*Art. 1791.* Foemina ascite gravissima, ac, uti *Curatio.* mihi videbatur, deplorata laborans, medicamine seq. per vj. dies continuos assumpto, multo melius se habuit, & brevi postea integre convaleuit; *℞. Gum. gutt. Gamb. gr. xij. ol. cinnam. gr. j. conserv. ros. rub. q. s. f. bolus;* dosis indies augeatur ad gr. xx. *julapium & elaterium* potentissima *hydragoga* habentur. *Diuretica* quoque in hoc morbo conveniunt; & si cum *tympanite* complicatur, applicari potest *empl. diasaponis*, & injici enema ex *urina sani*, &c. infra descript.

### Boerhaavii sententia.

*Art. 1792.* Hydrops in genere producitur ab omni causa, quæ valet 1. liquidum serosum ita *Causæ hydropis in genere.* coercere, ut stagnare faciat in vasis, vel 2. ipsa vasa rumpat ita, ut intra membranulas effundatur, vel 3. vasa reducentia a cavitatibus ita obstruat, ut liquida non exhalent, nec resorbentur. Causæ hæ sunt variæ, aliquando morbi acuti, tumores scirrhusi alicujus visceris insignioris, evacuationes quæcunque nimix, præsertim hæmorrhagiæ, &c. Signa sunt tumores, primo pedum ac crurum, & postea abdominis indies crescentis, hujus extensi sonus in *tympanite*, si percutiatur, in *ascite* strepitus fluctuantis aquæ; at in ascite ab aquis clausis in suis cistis, fallit. Adest insuper dyspnœa, sitis, gra-

*Signa.*

gravitas, torpor, alvus dura, urina pauca, febricula lenta, sudor nullus, macies, vultus livor, &c.

Intentiones  
curativa.

Art. 1793. Ad curationem primo fluor conciliandus est lymphæ cardiacis, roborantibus & stimulantibus, quæ, si sitis valida non urgeat, petuntur ex aromaticis, salinis, oleosis, & calidis sub variis formis, inter quas eminet vinum medicatum & infusum nostrum. Si vero morbus erit validior, & sitis vehementer urgeat, adhibenda sunt cardiaca reficientia, acida grata, & leniter aromatica. Videantur remedia quæ in hoc casu sunt tartarus vitriolatus, item aquæ Spadana, Tunbrigenses, &c. tum vin. Rhenan. Secundo liquidi nimia tenacitas (si adsit) tollenda est salibus alcalinis, volatilibus & fixis, item remediis mercurialibus, antimoniatibus, & e cupro præparatis. Tertio aquæ in cavitates congestæ educuntur, interdum Paracentesi, de qua operatione vid. locum, emissariis arte factis, causticis, lanceolis, &c. (sed huic praxi adversatur aphorismus Hippocratis; Hydropicis ulcera in corpore orta non facile sanantur.) Diureticis, vomitoriis, quæ mirabiliter in hoc morbo profunt; catharticis; dissipatione, calore foci, hypocausti, furni, arena, salis, salis, fimi, &c. tum maxime pertinaci abstinencia a potu, victu panis biscocti cum paucis sale ex pauxillo vini oleosi. Labes viscerum debilitatorum emendatur chalybeatis & roborantibus, victu sicco, vino veterimeraco, & exercitio. Egregium est vinum chalybeatum, stomachicum nostrum. ℞. Limatur. chalyb. cort. Peruv. crasse pulv. ana ℥ij. rad. rheiz pulv. ℥ss. vin. hocomorens. lbij. infunde frigide; dos. ℥ij. vel iij. ter in die.



*Mayerni sententia.*

*Art. 1794. Mercurius dulcis* cæteris intactis *Laus mercurii dulcis.*  
 quasvis causas morbificas aggreditur, & si sup-  
 rari possint, prosternit; sed dandus est iste athle-  
 ta in debita dosi: scio aliquando huic succedere  
*ptyalismum*, qui præcavebitur addito *cathar-*  
*tico* satis activo; sed si nihilominus moveatur  
 sputum, nihil est periculi, imo *salivatio* in Hy-  
 drope, quamvis semper sit molesta, attamen sæ-  
 pissime est salutaris. Nihil majus dat Hydropi-  
 cis levamen, quam larga *urinarum profusio*, id-  
 que cum minima virium dejectione. Sales omnes  
 sunt diuretici, verum *nitrum* omnibus præfero,  
 quod sitim, intolerabile in hoc morbo flagel-  
 lum, extinguit, & calorem præternaturalem vi-  
 sceribus in hac muria mersis impressum egregie  
 temperat. *Ova formicarum* in lacte ebutyrato  
 cocta copiose urinam movent. *℞. Ovor. formi-*  
*car. coch. j. coq. in lacte ebutyrato, exprime &*  
*dulcora pauco sacchar. detur mane superambulan-*  
*do hor. 4. ante prandium per octiduum.* *Ovorum formica- rum.*  
 Mulier Hydropica, cui hæc *ova* præscripsi, mire  
 commendavit, dixitque movisse ingentem fla-  
 tuum copiam, & prolixos crepitus magno cum  
 levamine; dixit etiam frequens primo ortum  
 menjendi desiderium, tandem se fudisse copiosas  
 urinas, ita ut una vice totam repleverit matu-  
 lam sæpius.

*Listeri sententia.*

*Art. 1795. Quædam Hydropica ab omni po-*  
 tione ex toto abstinuit per mensem; ad sitim *Absti-*  
 autem fallendam sic fecit, tenuem ac parvam *sententia a*  
 particulam panis tosti cum *spiritu vini* intincti *potu.*  
 super

super linguam detinuit ad salivam potenter inc-  
vendam, & convaluit.

*Absti-  
nencia a  
potu.*

*Art. 1796.* „ Pharmacopola quidam, habitus  
„ obœsioris, vir equidem haud mediocris inge-  
„ nii, neque inhonestæ existimationis, in Hy-  
„ dropem incidebat; valde intumuerunt crura,  
„ & venter quoque turgescere incēpit. Hic ex  
„ lectione *præcedentis sectionis* animum obfir-  
„ mavit, & secum decrevit ab omni potu per  
„ 30. dies abstinere, & abstinuit; unde a mor-  
„ bo gravissimo liberatus est. Idem vir probus  
„ ( ut nuper aliquis mihi retulit ) in eundem  
„ morbum lapsus *eidem experimento* spem o-  
„ mnem sanitatis recuperandæ iterum creditu-  
„ rus est. Huic affinis est Historia *Samuelis*  
„ *Ongly Equitis aurati opulentissimi*, civibus Lon-  
„ dinensibus, dum vixit, satis noti. Hic, cum  
„ septuagenarius esset, in Hydropem incidit  
„ deploratissimum, medicis celeberrimis ( qui-  
„ bus fretus ) prorsus incurabilem. In hoc re-  
„ rum statu animo secum statuit *se a potulen-*  
„ *tis quibuscunque ex toto abstinere*: sitim vix  
„ tolerabilem forti animo aliquot menses susti-  
„ nuit, ac convaluit; & vixit sex vel septem  
„ annos ab isto morbo immunis, & non nisi  
„ biennium circiter abhinc, dum hæc scribo  
„ mortuus est. Atque hic reticere nequeo ( *ut-*  
„ *cunque me forsitan ludibrio sibi quis habuerit* )  
„ experimentum, paucis credo adhuc notum,  
„ curandi intumescentiam crurum equorum me-  
„ diante nimirum *potus eorum decurtatione*. Hic  
„ morbus Hippiatrīs vulgo *The Grease* appella-  
„ tur, equi hoc malo affecti decumbere omni-  
„ no respuunt, unde intumescencia valde auge-  
„ tur, & insuperabilis quandoque evadit. Me-  
„ thodus medendi breviter sic se habet. Qui  
„ curam equi attendit, *duas tantum aqua libras*  
„ ad



„ ad potandum equo præbere solet , mane &  
 „ vesperi , ad dies 6. vel 8. quo tempore cura-  
 „ tio efficitur ; crura detument , & equus ad  
 „ dormiendum procumbit , &c.

*Art. 1797.* Quod ptarmica faciunt in naribus, *Laus elaterii.*  
 idem *elaterium* aut *euphorbium* in intestinis effi-  
 cere videtur , pituitam vehementer movendo .  
 Illud notandum est , *elaterium* ( quæ istius me-  
 dicamenti summa est commendatio ) dejectiones  
 movere , *authore Dioscoride* , citra stomachi in-  
 juriam , exhiberi potest ad gr. x. *℥. Elater. gr.*  
*x. sal. gemm. ℥j. miv. cydon. q. s. f. bolus.* In casu  
 ancipiti & moribundo ex dysuria plurium die-  
 rum , aliis medicis dimissis , sic hominem resti-  
 tui ; *℥. Succ. limon. recenter express. ℥vj. cochlear.*  
*hortens. ℥iv. hepatic. plantag. syr. violar. ana ℥ij. m.*  
 hujus ℥iv. omni trihorio potavit , postridie uri-  
 nam copiose reddidit , & postea modicis *hydra-*  
*gogis* detumuit venter & convaluit . Hydroke-  
 sicato *aq. absynthii stillat.* in qua *rhabarbarum*  
 maceratum , est usus eximii ad confirmanda  
 viscera . ( Virtutes *elaterii* per totam exercita-  
 tionem summopere extollit author , & revera  
 laudem omnem exsuperat . ) „ Hoc remedium  
 „ equidem successu vix credibili aliquoties ex-  
 „ hibui . Anno proxime elapso , verno tempo-  
 „ re , seni asthmaticæ , diuturnitate morbi con-  
 „ tritæ , cui pedes crura & femora valde intum-  
 „ mebant , quod moribundis fere semper eve-  
 „ nire solet , *elaterii* dosin unam & alteram at-  
 „ que tertiam , interpositis debitis intervallis ,  
 „ effectū plane admirando propinavi . Prima  
 „ vice humoris serosi per sedem evacuata sunt  
 „ duodecim pondo , secunda purgatione decem ,  
 „ & tertia demum vice , solummodo duo vel  
 „ tria . Atque ita a tumoribus Hydropicis omni-  
 „ no liberata est , & valetudine mediocri vixit  
 „ us-

„ usque ad initium hyemis, cum, ingravescentem  
 „ te asthma, colica vel iliaca passione correpta  
 „ est, ex qua, postquam ultra hominis ætatem  
 „ vixisset, tandem naturæ satis fecit.

## HYDROPS VESICALIS.

*Hydrops Vesicalis.* *Art. 1798.* Hydrops abdominis Vesicalis est *ascitis quædam species*, in qua quidem inclusa aqua tumorem abdominis facit, non vero in ejus cavo fluctuans, sed in vesiculis sive hydatidibus innumeris variæ magnitudinis contenta; quæ hydatides nihil aliud sunt, quam portiones vasorum lymphaticorum alicujus visceris, in quibus motus lymphæ est impeditus; unde spatiola inter valvulas, liquore prædicto distenta, in figuras oblongo-sphæroidales efformantur, & totam cavitatem adimplent; ita ut post abdominis apertionem quandoque nihil aut parum aquæ extravasatæ effluxerit. Hic morbus in brutis animantibus frequentius occurrit, præcipue in ovibus. In corporibus humanis exempla prostant apud *Sennertum*, *Tulpium*, *Bartolinum*, &c. Valde curiosum est illud in *Collectaneis Gallicanis Acad. Scien. Memoir. p. 215. anno 1722.*

*Historia.* *Art. 1799.* Sexennium abhinc historiam mihi communicavit *D. Richardus Blinck. pharmacopola Bidisfordensis* juvenis cujusdam nautici, qui ex febre ardente, in qua permagnam frigidæ copiam potasset, in ingentem abdominis intumescientiam incidebat. Applicata erant emplastra, & cataplasmata, ex quibus parum utilitatis: demum loco prominenti ad latus sinistrum umbilici caustico imposito apertum est foramen, ex quo *hydatides quamplurimæ prodierunt*, aliæ ova gallinæ æquantes, nonnullæ grandiores, plu-



plurimæ minores, omnes numero ad minimum octoginta. Homo convaluit, & adhuc vivit ab omni morbo immunis.

In Transactionibus Philosophicis N. 370. extat historia cujusdam hominis hujusmodi Hydrope laborantis, e cujus abdomine facta paracentesi exivit ingens hydatidum copia, figura & magnitudine diversarum Num. septem vel octo millium; una cum his etiam evacuata erat magna quantitas materiæ gelatinosæ, coloris grisei & lutei, albumine ovorum aliquanto spissioris. Vid. locum. *Alia.*

## HYDROPS PERITONÆI.

*Art. 1800.* Hydrops Peritonæi est collectio aquæ inter abdominis musculos, & Peritonæum, maxime inter hoc, & tendines musculorum transversalium, unde ex errore quidam authores, anatomix ignari, hunc morbum *Hydropem duplicaturæ peritonæi* falso nominarunt. Tumor abdominis aliorum æquabilis circa umbilicum minus prominet, ob fictam ibidem tendinum muscularium peritonæo adhæSIONem; atque hoc propriam morbi hujusce diagnOSin constituit. Aqua sive lymphæ eo loci comprehensa, ibidemque moram ducens, carnem muscularem corrumpit, & hinc ulcus sordidissimum internum progressu temporis procreatur. Hic Hydrops *tempestiva paracentesi* forsan sanari potest. D. *Chefelden* vero aliter sentire videtur, Anat. p. 126. *Hydrops Peritonæi.*

*Art. 1801.* Operatio Paracenteseos cum historia ipsius medicinæ est coætanea, ab *Hippocrate* memorata, & ab *Albucasi* æque accurate descripta ac in nostra ætate. Experientia recentiori docemur aquas una vice ad siccitatem tuto *Paracentesis.*

*Allen. Bars II.*

V

de

depromi posse, quod praxi in nostris nosocomiis, & Lutetiæ Parisiorum confirmatur.

*Art. 1802.* Memorabilis est historia apud D. *Cheselden Anat. p. 187. &c.* cujusdam Ascite laborantis, qui novies vigesiesque in uno anno paracentesin subiivit, & deprompti fuerunt plusquam septuaginta aquarum congii. Tribus ultimis septimanis ante obitum *rheumatismo* laborabat, & frequenti *narium hæmorrhagia*, quæ immediatæ rationes vel causæ mortis ejus videbantur; aperto cadavere jecur repertum est sanum,

*Art. 1803.* Operatio paracenteseos non molienda est in corporibus valde macilentis, vel senio vel tabe confectis, nec (nisi in Hydrope subito exorto) in ægris, qui non respirandi difficultate laborant, & quorum partes nobiliores adhuc fere sanæ & integræ sunt. De operatione, & ejusdem difficultatibus, vide *Barbette* & alios scriptores chirurgicos.

## HYDROPS PECTORIS.

### *Sponii sententia.*

*Hydropis pectoris, signa diagnostica.* *Art. 1804.* Si Hydrops in pulmone accidat, juxta *Hippocratem*, febris & tussis vexant, æger confertim respirat, pedes intumescunt, ungues incurvantur, & velut empycus afficitur, sed remissius & diutius. Hæc signa diagnostica Hydropis pectoris apprime sunt scitu necessaria; est enim morbus satis frequens, nec tamen satis cognitus; sed qui ista ad unguem tenebit, hunc morbum ab aliis facile distinguet. Plurima habet cum *empyemate* signa communia; ea tamen symptomata sunt remissiora, quia serum sive aqua minus impeditenti in pulmonum *bronchiis* & pectore afferunt quam pus ipsum;

at



at diutius durat affectus, quia fero non ita corrumpitur aut opprimitur pulmo, ac purulenta ibidem collecta materia. *Sponzii Aph. p. 145. &c.*

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1805.* In Hydrope pectoris præter pectoris tumorem, & sensum fluctuationis, adest *Sympt. mata,* tussis sicca, difficilis respiratio, orthopnoea, palpitatio cordis, febricula. Ex ruptis vasis lymphaticis oritur, & curatur ut aliæ Hydropis species. De *paracentesi* vid. locum, p. 766.

*Vuillisi sententia.*

*Art. 1806.* In Hydrope Pectoris lymphæ in compagem pulmonarem resurgente sæpenumero accidunt vesiculas, hydatidas dictas, in extima *Hic aff-* hujus visceris superficie excitari, quæ postea *fectus in ovibus valde frequens.* disruptæ *ascitem in thorace* producunt. Hujusmodi affectio in ovibus, quando ob tempestatem humidiores, & pascua aquosa ab Hydrope gregatim intereunt, passim cernitur. Morbus dignoscitur ex aquarum fluctuatione. Author historiam producit Hydropis Pectoris per *paracentesin* curati; & aliud affert exemplum cujusdam juvenis curati per *cathartica* & *diuretica*.

*Art. 1807.* De Hydrope ovarii, Hydrope uterino, & uteri inflatu alibi in morbis mulierum dictum est.

PARACENTESIS.

*Art. 1808.* Paracentesin generatim Medici *Definitio.* vocant pectoris, vel abdominis, imo etiam scroti perforationem illam, quæ pro materia purulenta,

ta, cruore, aqua, rebusque id genus aliis præternaturalibus emittendis instituitur.

## PECTORIS PARACENTESIS.

*Heisteri sententia.*

*Quo loco  
fieri de-  
bet.*

*Art. 1809.* Latus affectum in quo materia perniciofa delitescit cognoscitur considerando .  
1. in quonam pectoris latere inflammationem atque dolorem æger antea senserit. 2. Deinde ubinam gravitas quædam cum fluctuatione fuerit animadversa; 3. tum in quodnam latus cubare commodius æger possit; in hoc ipso enim vitium delitescere solet; nam in latere sano decumbere nequeunt; 4. denique tumor etiam plerumque aliqualis, cum calore vehementiore latus afflictum demonstrat.

Explorato jam latere affecto tutissimum est, operationem sic instituere, ut in sinistro latere inter secundam, & tertiam, in dextero inter tertiam, & quartam costam spuriam, ab infima numerando, eo loco, qui palmam circiter, aut quinque, vel in majoribus hominibus sex digitos latos, ab ipso dorso, atque ab infimo scapulæ angulo abest, foramen fiat.

*Quomodo  
operatio  
exornan-  
da.*

*Art. 1810.* Ipsum istum quem indicavimus locum atramento notare convenit; tum ægri corpus primum quodammodo inclinare, ut ipsæ costæ paulo latius ab invicem diductæ spatium satis amplum pro vulnere faciendo relinquant. Inde vero adducta Chirurghi, & ministri digitis cute, ut in fonticulis excitandis usu venit, scalpello eadem incidatur, plagaque trium circiter digitorum transversorum inflicta caro reliqua una cum pleura intra binas costas supra designatas transversum diligentissime disecetur. Sic

vul



vulnere satis amplo facto digitus in illud immitti debet, & si pulmo forte in vicinia adheret, ab eo separari, ut contenti humores vitiosi melius effluere queant. In factum vulnus ex *D. Petiti* documento linamentum molle, atque caudæ quasi formam habens, immittatur, quo non tam ipsum vulnus apertum conservatur, quam noxia materia continuo, & optime educi potest. Supra linamentum istud vulnere insertum linamenti carpti, & convoluti portio quædam filo annexa una cum linamentis carptis aliis, emplastro item, & fascia graviter deligantur.

*Art. 1811.* Diebus sequentibus semel, aut pro re nata, bis etiam, vel ter quotidie vulnus deligare convenit, prout anxietates ægrum sæpius, aut parcius urgent, amissaque, quantum ægri vires permittunt, materiæ vitiosæ portione, bis aut ter in deligationibus singulis liquorem purgantem, eundemque calidum, injicere, diligenterque rursus emittere. Facere autem in primis hic solet decoctum calidum ex herba quadam vulneraria, nimirum veronica, scabiosa, aut Solidagine Saracenica, cum rosarum melle, atque myrrhæ oleo; quin & nisi tussis ægrum vexarit, cum pauxillo essent. myrrhæ vel & *Wurtzii* balsamo pectorali permixtum. *Garengeotus* persicariæ, atque ubi, ex pleuritide, vel peripneumonia malum ortum est, althææ decoctum etiam atque etiam hic commendat, quamquam etiam sp. vin. vulgaris, cum antimonii sulphure permixtus haud minorem cum in expurgando, tum & sanando vulnere virtutem exerat. Alii aquam calcis cum mellis rosati portiuncula juncta longe nobilissimam hic esse proponunt.

*Art. 1812.* Quo autem melius humores in-

*Deligatio  
quo  
modo in-  
stituenda.*

*Castela.*

jecti ex vulnere rursus profluant , necessarium semper videtur hominem ægrum in ipsam partem illam, in qua vulnus est, diligenter inclinare, atque ut fortiter spiritum ducat jubere.

Quando injectus liquor ab omni materia vitiosa purus ex vulnere profluit, tunc sane sufficienter expurgatum esse pectus intelligitur, ideoque vulnus ea ratione glutinandum, quam in pectoris vulneribus usurpare solemus.

## ABDOMINIS PARACENTESIS

### *Junceri sententia.*

*Tempus* *Art. 1813.* Antequam morbus nimium inveteravit operatio hæc instituenda est: sed, vel *hujus* *operatio-* *es.* mox in principio, vel in augmento secus ac vulgo usu venit, cum ad hanc operationem prius non accedatur quam varia remedia per longum tempus frustra fuerint propinata. Quando eandem exornare constitutum sit, æger paululum antea ambulet, vel alio modo corpus moveat, ut sedimentum aquarum a fundo quasi excutetur.

*Modus* *Art. 1814.* Deinde sellæ insideat, vel in lecti *eandem* *instituen-* *ai.* spondam ita collocetur, ut locus perforandus reliquis sit declivior. Postea minister tumorem manibus suis premat deorsum ad urgendum renisum, & facilitandum instrumenti transitum. Denique acus tricuspidata cannula argentea munita, Gallis *Trocart* dicta, in ventrem quocumque in latere immittatur, & quidem sine metu læsionis intestinorum. Aquæ enim inter hæc, & integumenta multum spatii relinquunt. Quando item locus electionis conceditur, alterutrum latus trium, vel quatuor infra umbilicum, totidemque a linea alba digitorum intervallo



vallo eligitur ; necessitate autem urgente punctio in illo loco instituitur, quem tumor quidam quasi monstrat . Si umbilicus ita protuberat, ut aquæ conclusæ levissimam dumtaxat extenuatæ cutis discrimen objiciant, in hoc casu haud difficulter pertunditur, neque alius locus eligendus est.

*Art. 1815.* Facta perforatione acus extrahitur, cannula autem relinquitur, & per hanc una vel altera libra feri quotidie evacuatur, non tamen continuato, sed aliquoties interrupto cursu: Interea locus perforatus emplastro, & turunda munitur. *Quomodo aqua extrahi debeant.*

Post singulas aquarum egestionibus infimus venter fasciis constringatur, quo ipsius integumenta visceribus conclusis admoveantur. Quando aquæ proventus post abdominis depressionem non magis succedit, fistula extrahitur, emplastrum duplex, & linteamen triplex imponitur. Sic cutis vulnusculum facile coalescit.

### *Farrago sententiarum.*

*Art. 1816.* Ex ingenti hydropicorum numero quos D. du Verney perforavit, regulæ sibi perspectæ fuerunt, quibus certam prognosin adferre valuit de exitu, quem hujusmodi operatio sibi vindicaret. Eædem vero ita se habent. *Paracentesis prognos.*

1. Cum effluentes hydropicorum aquæ Ptilisanæ citratæ formam referant consistentia mucilaginosæ, odore urinoso, atque sapore subsalsæ sint, quo magis eædem ab hujusmodi qualitatibus recedunt eo minor spes recuperandæ salutis evadit.

2. Ii, quibus aquæ parum a lymphiditate fontanæ exhauriuntur, quæque evaporatæ parum quidem sedimentum relinquunt, ut plurimum

occumbunt, eorum quippe venter brevi tempore iterum inflatur, externusque tumor augescendo durefeit.

3. Aquarum eductarum graveolentia suspecta prorsus videtur; quæ sunt sanguinolentæ itidem merito timentur, maxime si ex nigredine quædam verissimillimum sit sanguinem, cum difuso liquore diu in ventre stagnasse.

4. Aquæ luteo vel rubro colore nimium saturatæ pravam bilis qualitatem indicant.

5. Eæ, in quibus filamenta quædam albicantia, & pinguedinosa occurrunt, suppuratum corruptumque omentum ostendunt, atque proinde operationis exitum lethalem.

6. Quibus hydropicis urinæ rubicundæ, paucæ, turbidæque seu lateritiæ remanent, vel quibus ab Operatione ulla absque causa manifesta inquietudo accedit, quamvis plurimum levati videantur, mors ut plurimum supervenit. Id ipsum quoque dicendum est de iis, qui Ictero tentati hydropici facti sunt, præcipue si una cum hydrope etiam icterus perennet, tum etiam de iis, quorum venter mox ab operatione iterum intumescit.

7. Si a Paracentesi æger oppressionibus ut antea exerceatur, indicio est Pectoris hydrope quoque laborare.

8. Quanto a mulieribus aquæ mucilaginosæ educuntur, pro certo habendum est earum hydropem fuisse cysticum, atque adeo rarissime sanabilem.

9. Si ab Operatione alvi fluxus accedat, ab ejus diuturnitate æger exsiccatus, taboque confectus occumbit; hujusmodi enim evacuatio colliquativa semper evadit.

10. Quibus febriles accessus superveniunt a rigoribus indicati, tunc vel interna quædam fit  
sup.



Suppuratio, vel liquorum refluxus evenit. Mox dicti rigores internas contractiones convulsionisque producant, eodemque tempore tantas virium exinanitiones, ut ægri sæpissime ultimum diem subeant.

Omnes hujusmodi prædictiones ex instituta Paracentesi in Actis Academiæ Regiæ Parisiensis prostant, unde easdem deprompsimus ut in Medicinam exercentium decus, & utilitatem cederent, quæ itidem videri possunt *Memoir. de l'Academie ann. 1703. pag. 150. & seq. edit. Paris.*

*Art. 1817.* Quantum verò ad varios pectoris ventrisque hydropes observat D. de Gorter, medium ventrem frequentius, ac quis incautus judicaret, hydrope tentari, qui pro varia sede non semper eadem præbet phænomena: 1. quandoque aqua colligitur in pericardio, & *hydrocardia* tunc dicitur, anxietatem inducens, cordis palpitationem, & lypothymiam frequentem 2. Aut in alterutro, vel utroque cavo pectoris simul, vasis lymphaticis ruptis, vel ex hydatidibus exstillat, vel vasis absorbentibus obstructis accumulatur aqua, quæ tenuis si sit fluctuatione concusso corpore, sui indicia præbet: magis vero glutinosa difficile cognoscitur; ut & ille qui implet. 3. Membranam internam bronchiorumque ejusque glandulas; vel 4. Colligitur in cellulis pulmonum vomicas formans, vel hydatides.

*Art. 1818.* In ventre inferiore plura sunt loca, & viscera, in quibus hydrops generari potest, & hic etiam frequentius conspicitur, quam alibi. Nam 1. si aqua in cavo ventris colligitur Ascites est cum abdominis augmento, & intus fluctuantis murmure, ut plurimum etiam cum scroti & pedum intumescencia, superiorumque

*Pulmonum & pectoris hydrops.*

*In inferiore ventre hydrops.*

par-

partium extenuatione . 2. Si in hydatidibus , vasculisque lymphaticis dilatatis , cellulisque pinguedinosis omenti colligatur aqua , venter circa præcordia intumescit , circa pubem autem gracilis , nulla percipitur fluctuatio , & stomachus ab ingestis gravatur : 3. Si autem in peritonæi formatis hydatidibus hæreat , fere eadem conspiciuntur , sed totus venter æqualiter intumescit & paracentesis nihil juvat . 4. Etiam in utero ejusque ovariis hydrops generatur 5. nec non in scroto membroque virile , ut suo loco videbimus .

*Hydropis curatio.* *Art. 1819.* Ad generalem hydropis curationem requiruntur 1. Liquoris inviscati attenuatio . 2. Liquidi abundantis diminutio , aucta quadam evacuatione . 3. Symptomatis urgentis lenimen . 4. Detractio pabuli novum suppeditantis potus abstinentia , & diætâ exsiccante . 5. Tandem corporis roboratio ne recidivet .

*Farrago sententiarum .*

*Tussis in Hydrope.* *Art. 1820.* Qui ex morbofo jecore oritur hydrops , vehementissimam , sed inanem tussim conjunctam habet , quæ in aliis hydropum speciebus vix aut raro apparet . *Baglivus.*

*Prognostic. varia ex Hipp.* *Art. 1821.* Hydrops ( inquit *Hippocrat. in Coac.* ) qui medicinæ concedit & revenit , desperatus est . Hydrops omnis ( inquit idem ) qui ex acutis morbis oritur , malus & lethalis . Hydrope detentus ( addit ) curari potest , si robustis sit visceribus , si bene concoquat & spiret , sine dolore sit , & extrema colliquefacta non habeat . Omnes fere Hydropici circa plenilunium moriuntur . *Tycho Brayhe .* „ Diarrhœa „ in Hydrope , quæ non juvat , est pessima ; „ pra-



„ pravam enim in visceribus diathesin ostendit. “

*Art. 1822.* In Hydropicorum cadaveribus (inquit *Cheselden*) semper observavi cor solito majus, fibrasque ejusdem valde laxatas, & vasa sanguifera plurimum distenta, & præterea concretiones polyposas, interdum in ambobus auriculis & ventriculis, sed frequentius in dextris.

*Art. 1823.* Stomacho & visceribus rite emundatis *infusum theæ viridis* in vino Rhenano evadit medicamentum laudabile, non modo diureticum, & stomachicum, sed etiam sanguinem exagitans, & ejus motum adaugens. *Vvaine-vwright.* Ex vegetabilium classe (inquit *Dolans*) pro arcano in hoc morbo revelo succum *brionia* sequenti modo collectum; luna crescente, tempore imprimis verno, radicem *brionia* terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulo mane invenies coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico a coch. j. ad ij. vel iij. quo solo vili medicamine plures, Deo adjuvante, curavi. Deploratissimum Hydropicum curatum vidit Dr. *Beeston* medicus *Bathoniensis* celebris, nuper defunctus, ut mihi retulit, per radicem *brionia* circumforaneo quodam exhibente, cum ex aliis remediis quocunque a peritis medicis exhibitis nullum juvamen acceperat. Sequens infusum diureticum fuit præscriptum celeberrimi Lovveri, & in sua praxi frequenter usurpatum: ℞. *Rad. lapathi acut.* ℥ij. *taraxac.* ℥j. *flor. sambuc.* m℥. *summit. abiet.* fol. *cochlear. becabung. nasturt. aquat. ana* m℥. *raphan. sylv.* ℥ij. *sem. sinap.* ℥j. *infund. in vin. alb.* ℔ij. *clausæ & calide per hor. 4. coletur pro usu, dos. coch. iv. vel v. bis vel ter in die.*

*Art.*

*Remedia  
varia.*

*Art. 1824.* Inter remedia reliqua melioris notæ recensentur pil. hydropicæ Bontii : ℞. Aloes opt. ℥iiss. gum. gut. gam. ℥iiss. /diagrid. ℥j. gum. ammoniac. ℥iiss. tart. vitriolat. ℥ß. syr. ros. solut. q. s. f. massa pil. dos. a ℥ß. ad ℥j. Electuar. hydragogum Sylvii. ℞. Bacc. junip. in aq. coct. express. & ad pulpæ consistentiam redact. pulp. tamarind. ana ℥iv. rad. jalap. ℥iiss. scammon. elect. ℥j. cinnam. acut. sem. fœnic. dulc. ana ℥ij. sacchar. clarific. ℥x. m. f. electuarium; dosis in adultis a ℥iij. ad ℥ß. Potio hydragoga Listeri; ℞. decoct. sennæ Gereon. ℥iij. syr. e spin. cervin. ℥iiss. succ. limon. ℥ß. elater. gr. iv. m. f. potio Tinctura allii vino absynth. extract. tinctura cochlear. compos. cataplasma Hydropicum; pil. hydragoga, cerevisia Hydropic. cerevisia purgans hydrop. haustus hydragogus, lixivium de calce, vinum Hydropicum. Sapo Castiliensis, express. diuretic.

## T Y M P A N I T E S.

*Coelii Areliani sententia.**Tympanitidis  
descriptio.*

*Art. 1825.* Tympaniten sequitur rotunda atque extans inflatio secundum ventrem, cum tensione plurima, & ad percussum palmæ resona velut tympani, unde etiam nomen accepit: item ructationes, & aliquando intestinorum tormenta; quæ excluso vento per podicem digeruntur, atque gravedinis detrahunt quicquam.

*Curatio.*

*Art. 1826.* In tympanitide specialia, ut plerique volunt, juxta communem virtutem, recorporative curationis, ordinanda est decoctio centaureæ herbæ, & absynthii, & origani, & hyssopi, & marrhubii adhibenda, & similis virtutis Epithema, ut est quod appellatur *Dianitram* ex fico atque nitro, & absythio confectum. Tundendum igitur aridum ficum, sed quod



quod sit pingue, ac succidum, item singulatim absythium, & nitrum admiscendum duabus partibus fici, & quarta pars absynthii. Aliquando etiam rutæ admiscenda particula. Facit etiam medicamen, quod appellamus diahyssopum, item uva passa cum cumino, vel farre cum adipse veteri & vino. Alii item bubulo stercore ungendos cum aceto ægrotantes dixerunt. Utile tamen erit, si longi fuerint dies, partiri modum sumendi cibi; facilius enim accepta digeruntur duorum temporum oblatione divisa.

*Boerhavii sententia.*

*Art. 1827.* Tympanites iisdem mediis, & eadem methodo, tollitur, ac *anasarca* & *ascites*, si ortum duxit a rarefacto vapore humoris extravasati, & putrefacti; tum enim, causa ablata, tollitur: Si vero ortum duxit ex aere per membranas intestinorum putrefactorum perforatas in cava delapso, retroire non potente, sed calore corporis rarefcente, tum cuncta cito putrescunt aere juvante, malumque ex posita causa est fere semper insanabile: unde *hydrops siccus humido* longe magis immedicabilis habetur; *punctura* sæpe solatio, raro sanationi, suffecit; *fasciæ* post puncturam locum habent.

*Vuillisi sententia.*

*Art. 1828.* De hujus morbi *ætiologia* præ reliquis audiendus est *Vuillisius*. *Tympanites* est tumor ventris; sed quæ sit materies morbifica tumorem istum inducens, quomodo in ventre aut progignatur, aut aliunde illuc adveniat, plane nescitur. In *ascitem* degenerare solet. Non a flatibus intra vel extra intestinorum cavitates

*Quomodo generatur.*

vitates conclusis excitatur, verum exoritur ( quantum conjectura assequi possumus ) quatenus in imo ventre spiritus animales ad viscera membranacea spectantes, ab incongruo quodam in ἀραξία adacti, fibras ubique nerveas tumultuarie irrunt inflantque, nec statim de-  
nuo ab iis recedunt: hinc peritonæum extumescit, intestina ampliata, & distenta velut inflantur, mesenterium, aliaque viscera membranacea spiritu impetuose turgida, velut in molem attolluntur; porro dum hæc fiunt, ut vacuitates a viscerum concavorum extumescen-  
tiis factæ impleantur, humoris statim cujusvis intus contenti portio in vapores rarefacta, illico in flatus spatia isthæc inania oberrantes cedit.

*Quinam* Art. 1829. Spiritus animales potius quam fla-  
*huic mor-* tus ejusmodi ventris intumescencias saltem bre-  
*bo sunt* ves, & transitorias, quales in paroxysmis co-  
*obnoxii.* licis, & hysteriis contingunt, excitant: atque  
hinc evenit, quod, qui affectibus *hypochondriacis*, *colicis*, aliisque imi ventris *spasmodicis* diu obnoxii fuerunt, demum *tympanitici* fiant.

*Curatio.* Art. 1829. Hic affectus raro per se interficit, quin longo tempore protractus, quo demum certius jugulet, sibimet *ascitem* lethi prænunciam adseiscit. *Catharticks*, præsertim fortioribus fere semper exacerbatur hic morbus, saltem non alleviatur. *Enemata* crebro injecta eximii sunt usus, & hoc præ cæteris; ℞. *Urin. sani* ℥ij. *sal. prunel.* ℥j. *tereb. Venet. cum vitel. ovi solut.* ℥i℥. m. f. enema. Applicetur *empl. de sapon.* toti abdomini. Ad sitim intolerabilem in hoc morbo; ℞. *Conserv. lujul. per setaceum traject.* ℥iij. *pulp. tamarind.* ℥ij. *sal. prunel.* ℥j. *syr. e succ. lujul.* q. s. f. Eclegma molle, de quo sæpius lambat æger.

Art.



Art. 1830. „ Tympanites est flatuosa abdo- *Vix dif-*  
 „ minis moles, rugitu strepens, dumque per- *fert ab*  
 „ cutitur, instar *tympani* resonans. Vix differt *ascite.*  
 „ ab *ascite*; raro enim flatus absque aqua repe-  
 „ riuntur, nisi in ipsis morbi primordiis. Ex-  
 „ perientia didisci hoc malum tractari debuisse *Reme-*  
 „ remediis *antihystericis*, *antiscorbuticis*, & *cor-* *diū em-*  
 „ *roborantibus*, priusquam in ascitem demigra- *piricum.*  
 „ verit: Sequens est remedium *empiricum* val-  
 „ de decantatum; *℞. Suce. folior. perri & sam-*  
 „ *buci ana p. æ.* analytice misceantur, capiat æger  
 „ coch. iij. vel iv. bis vel ter in die; hoc valet  
 „ aliquando in extremis post alia omnia inca-  
 „ sum tentata. *Antihysterica*, *chalybeata*, *empl.*  
 „ *de cicutâ cum ammoniaco*, *fotus ad tympaniten*,  
 „ &c. sunt valde proficua.

### Littrii sententia.

Art. 1831. Scriptoribus de Tympanite inter *Essentia*  
 se minus convenit, quippe qui neque causam *morbi*  
 morbi neque sedem designarunt. Ex cadaverum *tandem*  
 Tympanite mortuorum sectionibus patet ven- *detegi-*  
 triculum & intestina, præ reliquis crassa, mi- *tur.*  
 rum in modum distendi, ac ingenti mole vix  
 sane credibili ampliari. Frequenter (*souvent*)  
 observavi *cæcum & colon femur humanum crassi-*  
*tie æquantia*, reliquorum viscerum in abdomi-  
 ne contentorum dimensionem ultra naturalem  
 nusquam inveni: In recentibus Tympaniticis  
 humiditatem tantum aliqualem in abdominis  
 cavo reperi, & in inveteratis non nisi duas vel  
 tres libras aquæ; quantitas adeo exigua neuti-  
 quam pro morbi causa haberi potest: ideoque  
*inflationi ventriculi & intestinorum* monstruosa ista  
 ventris moles soli debetur. Ventriculus & inte-  
 stina quasi musculus cavatus spectari possunt,  
 cui

cui aer inclusus est antagonista. Parietes intesti-  
 norum & aer internus sunt tanquam duo ἐλασπæ  
 se mutuo indefinenter impellentia. Quamdiu  
 hæ duæ potestates æquipollent, ventriculus & in-  
 testina alternatim se contrahunt & dilatant salva  
 dimensione naturali, suntque officiis suis obe-  
 undis paria, manente scilicet æquilibrio: si au-  
 tem laterum ventriculi & intestinorum systoles  
 vim elasticam aeris inclusi superat, fistula inte-  
 stinalis supra modum coarctabitur: e contra si  
 quando fibrarum intestinalium vires elasticæ quo-  
 quo modo imminuantur, aer inclusus canalem  
 plus justo dilatat, & quo debilior est intestino-  
 rum elasticitas, eo major evadit eorum capaci-  
 tas, unde *Tympanites ortum ducit*; qui affectus  
 ut plurimum est incurabilis ob amissam aut val-  
 de diminutam istorum viscerum elasticitatem;  
 fibræ nimis laxatæ sese contrahere rursus ne-  
 queunt, aut saltem admodum debiliter: & pro-  
 inde ventriculus & intestina non nisi imperfe-  
 cte admodum officia sua peragunt, in quantum  
 præcipua earundem energia & operatio a con-  
 tractione, dilatatione, & motu peristaltico ma-  
 gno opere pendent. *Memoir. de l'Acad. Vol. 17.*  
*p. 314.*

[*Farrago sententiarum.*

*Art. 1832.* In Tympanitide, inquit *Lommius*,  
 frequentis ructus desiderium est, eoque edito le-  
 vari aliquantulum homo videtur: pedes non us-  
 que adeo ut in cæteris generibus hydropis tu-  
 ment: reliquum corpus extenuatur. Sæpe hoc  
 malum ventriculi, & coli inflammationibus,  
 itemque longis febribus successit. Illud vero ab  
*Hippocrate* animadversum video: quibus torsio-  
 nes circa umbilicum, & circa lumbos dolores  
 sunt,



sunt, qui neque medicamentis, neque ullo alio modo solvuntur, ii in hoc ipsum genus ficci hydropis incidunt.

*Art. 1833.* Hydrops ficcus, sive flatuosus *Hippocratis* tunc dicitur, quando adest alvi ficcitas cum fœcibus stercoricaprino similibus: Nec non adsunt tormina, & dolores magni circa umbilicum, & lumbos, febris, sitis, tussis sicca. Fit ab hectica intestinorum intemperie, sequitur alios morbos potissimum acutos. Morbus est acutissimus, & difficillimus, citoque interimit; alvus & urina statim supprimitur, & nihil magis perniciosius remediorum copia & farragine. Cathartica perniciosissima sunt, usus nitratorum, serum lactis, lac asininum, & generaliter omnia humectantia intus forisque juvant. *Baglivus.*

In iis qui sicco hydropem moriuntur observantur glandulæ mœsenterii aridæ, exsiccatae, & tabefactæ, unde causa mali ex *Ballonio*.

*Art. 1834.* Vinum quoddam ab Epiphanio *Remedia* Ferdinando præscribitur, quod mirabile, sæpius *varia.* que expertum dicitur, ad educendos flatus, atque adeo tutum esse, ac saluberrimum remedium tam in Ascite, quam in Tympanite. Hoc hujusmodi est. *℞. Cucumer. agrest. seu asinini, sambuc. ireos, saldonell. ana unc. iij. incid. & infund. per hor. xij. in vin. alb. & clar. lib. vj. deinde bull. ad consumpt. tertiæ partis, mox add. sem. cumin. anis. fœnicul. ammeos, dauci, seseleos, ruth. aneth. ana pug. j. cortic. citr. ʒij. cinamom. elect. unc. sem. tragacanth. mastich. ana ʒj. iterum bull. tandem col. & serv. dosis unc. vj. vel viij.* *Hartmannus* pro speciale remedio liquorem habet ex flor. tapsi barbati elicatum, quem ad ʒj. exhibet in decocto seminum, & radicis fœniculi, interea ventrem

fovet urina pueri calida, in quam sal prunellæ dissolvit.

Hæc vero methodus laudatur ab *Heistero*: Singulo triduo, vel quatruiduo laxans e pillulis lenioribus, atque balsamicis, aliisque similibus, vel pulvere e jalapa, & mercurio dulci, vel sale amaro cathartico exhibeatur: hisque per duas tresve hebdomadas, aut diutius prout necessitas exiget continuetur, postea vero tonica, & roborantia usurpentur: ut essent cort. aurant. flor. chamæmel. &c. item limatura martis cum extractis amaris ad modum *Sydenhami* pro tono partium roborando in forma pillularum, vel electuarii, servato eodem regimine ac diæta, ut in cachexia. Abdomini olea destillata, & balsama carminativa calide sæpe illini debent; vel emplastrum de cumino, aut de baccis lauri, vel diasaponis imponi potest.

## ALIÆ VENTRIS INTUMESCENTIÆ.

### *Veinharti sententia.*

*Ventris tumor ex* Art. 1835. Hepar, lien, & glandulæ mesenterii subinde afficiuntur etiam tumoribus strumosis, & scirrosis, quod non rarum in infantibus cum atrophia, & tumore quasi tympanitico abdominis.

*Diagnos.*

Si in hepate adest durities, & renitentia in dextro hypochondrio percipitur, figura hepatis circumscripta est, gravitas & ponderis sensus in respiratione accedit, difficilior decubitus in latus finistrum, color faciei pallidus, ac quasi visceris, corporis macies, quandoque & tumor pedum, & si in liene, hæc observantur in finistro hypochondrio, & difficilior est decubitus in latus



CAP. VIII. *Alia Ventr̃is intumescentia.* 323

latus dexterum; si in mesenterio, itidem tactu, & ex situ loci percipitur; Interim bene res perpendenda, ne durties quæ circa finistrum hypochondrium sentitur, resideat inter musculos abdominis, & peritonæum, vel in glandulis omenti, & mesenterii vel in intestino stercore crassiori obseſſo, & tumorem farciminalem exhibente, cum durties lienis non sit adeo frequens prout vulgo putatur.

Scirrhus sine sensu curationem non admittit, *Prognosis.* qui vero difficulter sentit, difficilis quoque curatu est; adeoque ventris tumor ab hac causa vix vel ne vix quidem medellam admittit, quin imo præstat suæ sorti relinquere, quia si scirrhus aut interior ipsius tumoris causa ad suppurationem deducitur facile in cancerum degenerat. Inveteratus in Hydropem abit; Ictero autem succedens, vel ipsum faciens valde perniciosus est.

*Art. 1836.* Martialia ante perfectum scirrhum *Remedia interna.* optima sunt præsertim aquæ ferratæ, quæ tumentes lienes absumere dicuntur. Experientia quidem constat, animalia apud fabros ferrarios assueta aquis, in quibus candens ferrum extinguitur, exiguos habere lienes. Prodest igitur *tinct. mart. aperitiv.* vel *Mars aperitiv.* *Villis* quorum descriptionem vide in Praxi *D. Gaukes*, vel *limat. mart.* ad ℥j. quotidie præmissa, & subinde interposita evacuatione per *pilul. ex ammoniac. de tart. Quercet. tart. Bontii* vel seq. *℥. gumm. ammoniac. gr. viij. mass. pilul. Melanagog. Querc. ℥j. extr. gent. cent. min. a gr. iv. cum s. q. syrup. de fumar. m. f. pil. num. ix.* Nec irritum erit evacuationia cum calybeatis nubere veluti. *℥. Mart. cum Sulphur. calcinat. ℥iij. gumm. ammon. depur. scam. Sulph. a ℥j. syrup. de cichor. cum rhab. & sp. vin. q. s. m. f. massa pilul.* quarum dosis a gr. viij. ad ℥j.

quotidie; vel ℥. *Gumm. ammoniac. depur. limat. chalyb. subtil. trit. & cribr. mercur. dulc. a. ℥v. castor. ℥j. resin. scam. ℥ij. mag. gumm. guttæ ℥v. troch. alkekeng. ℥j. ol. charyoph. gutt. x. m. f. pil. num. LVI.* dentur quotidie num. 3. 4. vel 5. Præterea ex deobstruentibus conveniunt; *tart. vitriol. cum sal. cichor. absynth. sal hypochondr. Poter. croc. mart. aperit. tinct. & sp. tartar. item aperientia:* ut jura pulli alterata *cichor. cuscut. agrim. petrosel. &c. cum gutt. aliquot sp. tart. vel sal. armoniac. alii etiam commendant terebinth. usum; alii in scirrhus lienis specificum dicunt urtic. mort. in vino decoctum.*

*Remedia externa.* Ex topicis in usu sunt præsertim semicupia, & fomenta veluti: ℥. *Rad. bryon. alth. lil. alb. ana ℥j. fol. malv. violar. pariet. absynth. agrim. a. m. j. sem. lin. fœnugrac. aneth. a. ℥j. f. flor. cham. melil. ros. a. p. j. coq. in 3. p. aq. & 1. vin. alb. sub finem addit. vel in tantundem aquæ, & aceti pro foment. quo spongiis utere per semihoram, & si scirrhus contumacior sit addes rad. Ireos cucumer. agr. ebuli &c. postea fiat inunctio seq. ℥. Ol. tamarisc. lil. alb. a. ℥j. dissolv. mass. empl. de cicut. ℥ij. & f. linim. vel ℥. Ol. capp. absynth. mastich. a. ℥j. f. succ. rad. bryon. apii a. ℥j. j. f. coq. ad succ. consumpt. add. mucilag. rad. alth. acet. ros. fact. ℥j. f. gumm. ammon. acet. squill. dissolut. & inspissat. ℥vj. cer. q. f. m. f. unguent. Reliqua videantur penes Auctorem in Univ. Med. Nucl. Lib. VI.*

### *Morgagni sententia.*

*Ventris tumor a jecore & liene.* Art. 1837. Quamvis hypochondria ad ventrem apposita intumescant in affectionibus jecuris, & lienis, eadem vero alia etiam ratione, vel seorsim, vel una cum reliquo ventre eleventur, etiamsi nullum hydropis signum interveniat.

Quan-



CAP.VIII. *Alia Ventris intumescencia.* 325

Quantum ad eorum intumescenciam ob jecoris & lienis vitia observat in Epist. Anot. Med. 36. art. 28. tantam esse inter utrumque viscus commercii vicissitudinem ; ut si altero vitiato , in altero quoque vitium sit, id nullam habeat admirationem : habeat vero si vitium in alterutro dumtaxat occurrat veluti cum in sepulchreto Boneti ( lib. III. S. 14. Obs. 36. §. 4. ) legitur : *hepar grande, & multis in locis durum reliquis visceribus ventris naturalis erat constitutio* : aut alibi : *hepar fere exsuccum & pallidum ; ... Lien autem, & Renes naturaliter habebant*. Attamen vel longo in morbo , ubi majus in aliis visceribus , quam in jecore vitium deprehenditur , minime necesse est, ut in hoc quoque a longo tempore vitium sit.

Lienis arteria si forte a primordiis sine flexibus non fuit , videri alicui poterit hos amississe , dum impedito in durum jecur arteriosi sanguinis cursu , major hujus copia in splenicam illam arteriam influere coacta est . Quantum autem obstructo jecinore , arteriosi intra ipsum ramuli comprimantur , minusque sanguinis admittant , cum ratio indicat , tum observationes ostendunt ; sic affecto jecinore facilis transitus ad cachexiam est ; si vero gravius vitium hepar occupet , sæpius non ad cachexiam modo , verum etiam ad hydropem gradum fieri , frequentissimæ observationes testantur.

Præterea hypochondria cum reliquo ventre insigniter aliquando intumescunt , ut Medicis imponant , id vitio jecoris vel lienis contingere ; quamvis nisi fiat a tumoribus in mesenterio genitis . In Ep. 39. §. 6. inquit : „ mihi igitur „ non fit verisimile , nunquam a coquis a la- „ niis , a victimariis ullum in mesenterio tu- „ morem animadversum , & Medicis fuisse osten-

*Ventris  
humor a  
mesen-  
terio.*

„ sum , cum Galenus scirrhum circa cor tu-  
 „ morem in gallo inspexisse videam, & ad ho-  
 „ mines transfuisse . Crediderim potius , quæ  
 „ in libro aliquo prisca medici eade re attige-  
 „ rint, longo tempore, ut tot alia, intercidis-  
 „ se . Nam si Julius Pollux , ut legi apud In-  
 „ grassiam *circa mesenterium etiam strumas fie-*  
 „ *ri* , voluit ; certe aut a Medico aliquo ipse  
 „ Grammaticus id surrepserit, aut si forte per  
 „ se vidit; creditu difficile est, a Grammatico  
 „ admonitos Medicos, quicunque ab Sæculi II.  
 „ fine ad XVI. initium scripserunt; Commodus  
 „ enim imperante , ut Galenum, ita & Pollu-  
 „ cam vixisse , ajunt , nullum de hujusmodi  
 „ mesenterii morbi verbum fecisse, . Heu fa-  
 „ cientis morbi casum §. 2. sic refert.

*Casus.* Georgius Marchesius magno interno tumore  
 ventris laborans , ad dorsum & ad sinistrum  
 lumbum dolebat . Urinam sæpe , intestinorum  
 autemcrementa summis cum conatibus red-  
 debat . Cibos appetebat . Tamen omnibus de-  
 mum corporis partibus macie omnino extenua-  
 tis, nisi quod jam diu a duro tubere sinistrum  
 scrotum, novissimis autem diebus quindecim a  
 magno oedemate pedes tumebant , cum horum  
 sinistrum erypelas corripuisset , postridie obiit.  
 Ventre aperto, ad hujus centrum ingens tumo-  
 ris moles apparuit, viscera undique comprimens  
 adeo, ut si non prorsus extra suam sedem, &  
 certe essent contractiora , pluribusque in locis  
 sublivida, cæterum quantum oculis perspici po-  
 terat, sana. Pendebat tumor a mesenterio, to-  
 ta anteriore facie omento opertus extenuato,  
 multisque partibus lacero . Ejus pondus esse pos-  
 se videbatur librarum circiter XXV. sed aliis  
 in partibus extra tumorem turgebat omne me-  
 senterium eadem substantia, quæ tumorem effi-  
 cie-



CAP.VIII. *Alia Ventris intumescencia.* 327

ciebat, quorum tumor etiam alter conjungebatur ejusdem naturæ, qui in testiculo sinistro erat. Scilicet utriusque natura fuit, quæ cancroforum tumorum, & quorundam præsertim, qui in mammis observantur, magna ex parte similis.

Nec semper cancerosi sicut tumores, qui hic generantur, sed non raro de genere cysticorum, de quibus *in Chirurgia*; sed vide quæ Auctor addit in eadem epist. §. 7. 8.

„ Fit interdum abdominis tumor non ex hy-  
„ drope aut infarctu obstructioneque contento-  
„ rum viscerum, sed ex musculorum inflamma-  
„ tione præsertim vero rectorum, & transver-  
„ forum, idcirco facile cognoscitur, & a cete-  
„ ris distinguitur non solum quod oblongus tu-  
„ mor est, quamvis per totum ventrem exten-  
„ sus, sed cum dolore, & febre acuta conjungi-  
„ tur morborumque acutorum stadium absolvit.  
„ Cutis hic non sine dolore contrectatur, &  
„ apprehensa minime sequitur; si magis partes  
„ profundæ afficiuntur, quia isti muscoli sunt  
„ membranosi circa finem, & plures nervos ob-  
„ tinent, dolor est vehementior. In omni de-  
„ cubitu eadem tumoris magnitudo manet. Ab  
„ hepatis inflammatione distinguitur eo, quod  
„ figuram musculorum sequatur, nec ita sit ro-  
„ tundus. Curatio talis est qualis in aliis in-  
„ flammationibus. *Jonstonus.*

*Ventris  
tumor a  
muscu-  
lor. in-  
flamm.*

H Y D R O C E P H A L U S.

*Schenekii sententia.*

*Art. 1838.* Hydrocephalus est morbus adultis *Hydroce-*  
raro accidens, infantes vero sunt magis obno- *phalus.*  
xii, & frequenter fit a violenta obstetricatione.

Est tumor capitis aquosus; colligitur autem humor vel inter cutem & cranium, aut inter cranium & cerebri membranas; *Aetius* addit inter membranas & cerebrum; (*Boerhaave* addit inter cerebri plicas; & in cavitatibus; ) sed hæc posteriores species sunt incurabiles; externa & evidens causa est plaga aut contusio in puerperio. ( Ex tumore intus sub cranio neminem convaluisse vidi; sed ab externo tumore facile sanescunt. ) „ Caput in tantam molem turgescit, ut quandoque *integrum corpus* præponderet. Insignis historia habetur in *Transact. Philos. p. 407*. Infantis bienni hoc malo mortui, e cujus capite sectione patefacto exivere „ *aquarum decem pondo*: humor erat tenuis, „ pallidus, & insipidus, in interstitiis meningum & cerebri ventriculis reconditus; de reliquis circumstantiis vid. locum.

Metho-  
dus me-  
dendi.

Oppugnandus est hic affectus primo *resolventibus*; sed si id fieri nequeat, facienda est *incisio* vitato temporum musculo, & humor exprimendus est; (*Ambr. Paraeus*) ℞. *Ol. cham.* ℥iv. *Sulph.* ℥j. m. f. s. a. ungt. in hoc affectu magnarum virium. „ Hydrocephalus secundum *Boerhaave* „ levi *inustione*, *terebratione*, *punctura*, prudenter; lente, adhibitis, simulque *hydragogis* & „ *roborantibus* internis curatur: vel externis *dis-* „ *scutientibus* dissipatur excepta ista specie incurabili, quæ in cerebri cavitatibus formatur.

Remedia  
varia.

„ Inter cætera ad hunc morbum oppugnandum *psycrolousiam* emolumento fuisse animadverti. Inter evacuantia & corroborantia eadem sunt ac *in ascite*. Pro usu externo *lixivium calcis vivæ* egregium admodum est in „ discutiendo Hydrocephalo teste *Aquapendente*, „ & linimentum sequens a *Foresto* commendatur; ℞. *Ol. cham.* ℥iv. *flor. sulph.* ℥j. *digere s. a.*

„ Hy-



„ Hydrocephali curatio (inquit *Barbette*) omni  
„ tempore experientissimis medicis insignem  
„ creavit molestiam. Purgantia, sudorifera vel  
„ diuretica raro aliquid conferunt: ad cauteria,  
„ vesicatoria, fonticulos, setacea, immo plerum-  
„ que ad incisionem vel uisionem impellimur,  
„ quæ tamen media quosdam in vita conser-  
„ varunt.

*Petiti sententia.*

*Art. 1839.* Hydrocephalus est tumor capitis *Accra-*  
aquosus adultis raro accidens, infantes vero in *ta 10r-*  
primis annis a nativitate, immo interdum ante *bi de-*  
nativitatem occupat; & caput infantuli ex ute- *scrip.*  
ro nondum educti tam grande existit, ut *pun-*  
*cturam vel sectionem capitis* facere ad partum  
facilitandum chirurgus incumbat. Aqua secun-  
dum authores colligitur, vel externe inter cu-  
tem & cranium, vel interne 1. inter cranium  
& duram matrem: 2. inter duram & piam ma-  
trem, 3. in ventriculis ipsius cerebri; atque  
hanc ultimam speciem solam in praxi vel in  
cadaverum sectionibus unquam observare potui;  
credo itaque reliquas rarissime occurrere. Hoc  
morbo affecti sunt languidi, tristes, & pallidi,  
oculi illorum luridi & prominentes pupillis di-  
latatis; ossa cranii tenuia & mollia evadunt, &  
figuras irregulares induunt, nasus depressus,  
frons valde elatus, capitis magnitudo plane  
monstruosa, & gravitatis non sustentandæ, non  
raro crepat & disumpitur, & mors non multo  
post insequitur. In cadaverum sectionibus nota-  
vi duram meningem plus solito cranio adha-  
rentem, crasin cranii valde prolatam, & qua  
ubique contractam, ossium margines membr-  
nis e longinquo connexos, cerebrum minie-

corruptum, ventriculos cerebri adeo in immensum distentos, ut substantia ejus corticalis & medullaris extrorsum detrusa digiti vix duas lineas crassitie æquabat, & multis in locis a protrusione aquarum penitus divisa aquis usque ad meninges pertingentibus, vasa sanguifera prolongata & crassa, in pluribus *glandulam pituitariam scirrhosam*, quod inter causas hujus morbi locum habere videtur. Paracentesi quod attinet, tamdiu procrastinari solet, ut vix ullum ista operatione servatum vidi; intra 4. vel 5. horas plerumque moriuntur, si una vice aquas ad siccitatem depromant; si vero tardius progrediantur, non ultra quadraginta horas supervivere solent.

## I C T E R U S.

*Inter legendam & ex Observatione.*

*Trisignifica.*

*Art. 1840.* Signa hujus morbi & symptomata præcipua sunt lassitudines totius corporis, anxietas præcordiorum, difficilis respiratio, virium dejectiones, faciei pallor, pulsus debilis & lentus, urinæ tenues, aut crassæ, coloris flavi ad rubrum vergentis, croceo colore pannum immersum tingentes, interdum adfunt vomitus biliosus, dejectiones albæ, pruritus totius corporis, & ariditas & veluti exustione solis aspera cutis superficies, flavedo per universam cutem, maxime in oculorum albis, quo quidem colore interdum objecta omnia apparent tincta.

*Are-*



*Arete's Sententia.*

*Art. 1841.* Si bile flava, vitellina, aut crocea, aut nigra cum viride mixta omne corpus a viscere suffusum sit, affectus hic a Græcis *Icterus*, a Latinis *Regius morbus*, five *Arquatus*, five *Aurigo* dicitur. Difficile utique in acutis malum est: quia non solum ante septimum apparens, sed etiam post septimum infinitos necavit; raro item ad extremum febrem bene judicavit, ipse vero haud facile discutitur. „Per-  
„niciosius tamen ante septimum ac post eum  
„in acutis est. *Definitio.*

*Art. 1642.* Neque vitio jecoris tantummodo *Icterus* provenit, ut nunnulli medicorum existimant *jecore*. sed & ventriculus, & lien, & renes & laxum intestinum in causa sunt; A jecinore quidem nascitur si phlegmone aut scirrho viscus illud opprimitur, quia meatu ad intestinum bilem deferente intercluso bilis affluxu caret, idcirco stercorea, quæ ab ea non colorantur, albida sunt & argillam referunt, venter valde fuscus est si quidem a bile non stimulatur.

*Art. 1843.* Si morbus regius a liene ortum habeat color cutis ater est cum viridi mixtus, consuetaq. stercorea nigriori colore imbuta sunt.

*Art. 1844.* A laxo etiam intestino, & ventriculo arcuatus provenit, ubi concoquendi facultas in ventriculo, & laxo intestino, quod Græci Colon vocant, læsa fuerit; nam & in colo concoctio efficitur, & ab ipso alimentum in jecur digeritur, sed laborante colo albida non fit per alvum excretio. *Ab intestinis, & ventriculo.*

*Art. 1845.* Habitus quoque totius corporis ad morbum regium citandum summopere efficax est; nam in omnibus corporis partibus calor ad *Atotius corporis habitu.*

con-

concoquendum infusus est, si igitur ad singula obeunda munera calidum fatigatum, lassatumque fuerit, ipsum quidem in acre atque igneum vertitur, humiditates autem omnes in bilem abeunt, quod si & in sanguine cruditas incidat, sanguis biliosus efficitur, & quoquo versus nutriendus dispergitur.

*Sydenhami sententia.*

*Icterus ex colica.* *Art. 1846.* Icterus interdum est proles colicæ. In tali casu solo *rhabarbaro* purgandum est & morbus plerumque sponte sua sensim facessit; sin vero non nisi ægre discedere videatur, convenit sequens apozema; ʒi. *Rad. rub. tinctorum curcum. ana* ʒj. *chelidon. maj. cum toto, summit. centa. min. ana* mj. *coq. in p. æ. aq. font. & vin. Rhenan. ad* ℥ij. *colatur. add. syr. e quinque rad. ʒij. m. f. apozem. capiat* ℥ss. calide mane & sero usque dum convaluerit.

*Curatio in genere.* *Art. 1847.* At ubi icterus per se invadit, colica neutiquam prægressa, *cholagoga*, quæ per alvum bilem subducunt, ægro sunt exhibenda, & alia *antiicterica* usurpanda. His denique morbum non subigentibus ad *aquas ferreas*, quales sunt *Tumbrigenses*, adeundum, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

*Etzmulleri sententia.*

*Symptomata.* *Art. 1848.* Icterus est totius corporis *cachexia* flavedinem inducens, ut plurimum cum cardialgia, hypochondriorum dolore, præcipue dextri, alvi segnitie, lassitudine, &c. Si flavedo ad viriditatem, vel ad cœrulitatem, vel ad oscurum livorem inclinet, Icterus niger vocari solet; febris interdum conjuncta est, interdum ab-



abest. Tristitia aliquando inducit Icterus. Icterus *flavus* diuturnior semper in *nigrum* degenerat, unde *essentialiter* non differunt. Anxietas in præcordiis, dolor præcordiorum compressivus, virium dejectiones, lipothymia, &c. ante eruptionem Icteri frequentissime occurrunt. Urina ictericorum succussa spumam flavam ostendit, & linteum tingit colore croceo, sed non semper, sedimentum croceum dimittit; fæces alvinæ sunt plerumque albicantes, vel cineritii coloris, & hoc postremum ut plurimum est signum *calculi in vesica fellea*. Urina crassa turbida & nigerrima est signum solutionis morbi. Quo magis flavus existit Icterus, eo facilius est curatu, quo vero magis niger, eo difficilius. Cum *hydropè* conjunctus raro curatur. Prognosis.

„ Si sudor erumpat (inquit *Sylvius*) citius plerumque curatio expectanda erit, sin vero urinis plus deponatur materiæ rubentis & paulo post subsidentis, segnior erit expectanda.

*Art. 1849.* Quoad curam vomitoria, *martialia*, & hinc *amara*, totam absolvunt paginam. Præmissis universalibus usurpentur *stomachica*, *martialia* (*limature crudæ* in Ictero nigro) *rhabbarum*, *lumbricalia*, *viperina*, *alcalina*, *volatilia*, *amara*, *aque acidulæ*, *gum. ammoniacum*. *Venasectio* & *catharsis* vix locum habent. Specifica sunt (omnium optimum) *chelidonium majus*, *marrubium*, *flor. hyperici*, *crocus*, *genista*, *absynthium*, *sem. cannab. in lacte coctum*, *rad. curcum. rub. tinctor. urine potus*, *stercora* fere omnium *avium* & *animalium*, *pediculi*, *lapis in folliculo fellis tauri*. In genere moneo in curando Ictero resistendum esse ad tempus medicamentis *antiictericis*, quia morbus est chronicus & contumax: & quidem quandiu urinam ingitur tenuis & splendida, tamdiu illis insistentum,

dum, donec signa coctionis apparent, usque dum urina fit crassa & turbida, & cum sedimento repleta; his tamen apparentibus spes est salutis. Cura peracta, ad abigendum cutis flavum colorem conveniunt *frictiones & balneatio*.

*Villisi sententia.*

*Vomitorio* *Art. 1850.* Curatio Icteri inchoanda est cum vomitorio; ℞. *Fol. asari* N. 9. *incis. & contus. afund. vin. alb.* ℥iij. exprimatur succus & detur cum regim. Remedium vulgare & *empiricum* apud nostrates est, ut ix. *pediculi vivi* sumantur mane, per 5. vel 6. dies, quo remedio (cum alia minus efficerent) plures sanatos audivi. *Chalybeata* ut in aliis *cachexia* affectibus, ita in hoc juvamen præstant, atque hinc est quod *acide* frequenter post omnia profunt. „ Cum „ apozemate sequente (inquit *Doleus*) semper „ initium curationis facere soleo; ℞. *Rad. tarax. chelidon. maj. ana* ℥j. *herb. cichor. fragar. ana* mß. *marrhub. alb. mß. tartar. alb. fol. senn. ana* ℥iij. infund. in vin. alb. & aq. font. ana p. æ. coq. ad ℔ij. cola, &c.

*Velschii sententia.*

*Est affectus in prægnantibus sæpe fre-* *Art. 1851.* Mulieres sæpe gestationis tempore fiunt *Ictericæ*, præsertim in ultimis mensibus; an quod bilis tunc temporis viscosior evadat, & ita in glandulis hepaticis non secernatur? an quod uterus tumens comprimendo intestina in causa est, quod ductus choledochus nimis compressus bilem in intestina non transmittat? notandum est, quod hic morbus in prægnantibus post partum statim evanescat.



*Sampsonii sententia.*

*Art. 1852. Saponis Castellensis ℥ss. in haustul.* Sapo  
Castel-  
liensis.  
*vin. alb. solut.* valet ad urinas provocandas in Ictero & Hydrope experimento domus Bedfordiensis, ubi pro magno secreto habetur. Sylvius hoc idem medicamentum laudat, sed in lacte solutum ob salem fixum & oleosam ejus substantiam. Ego quoque in nonnullis Ictericis expertus sum, in his cum fructu, in illis aliter. Ubi acidi humores vel in Ictericis vel in Hydropicis abundant, credo hoc medicamentum valere, quoniam ab acri sale fixo temperantur, subiguntur, & per vias urinarias expelluntur: & e contra ubi acres humores domino potiuntur, acre medicamentum nihil valet, metuo, ut noceat.

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1853. Dubitatur, an Icterus semper oriatur* Dubita-  
tio.  
*ab obstructione bilis; quoniam neque in sanguine vel urina ictericorum ulla est amarities: Icterus etiam generari potest sine hepatis obstructione, teste Sylvio, & obstructions in hepate non semper pariunt Icterum, authore Ettmullero. Aliquando oritur ex animalium quorundam morfu. Ictericorum alvus & aperta & fæces flavo colore tinctæ (interdum) conspiciuntur. D. Gailard. in Thesi apud Cantabrigienses.*

*Art. 1854. Si sit suspicio hepatis scirrhi, ap-* In hepa-  
tis scir-  
rho.  
*prime conveniunt fofus & empl. seq. 2. Fol. malv. alth. absynth. flor. melilot. chamem. ana mʒ. fol. meliss. chamæpit. ana mʒ. sem. fœnuigr. ℥iʒ. coq. ex aq. ꝑv. sub finem add. vin. alb. ꝑij. &c. cum pannis laneis foveatur latus, deinde superimponatur empl.*

*empl. de cicuta cum ammoniac. vel de ranis cum mercurio. Pitcarnius in MS. Si vero jecur durum sit, i.e. scirrhusum, res est desperata. Hippocr. Aphor. Si morbus diu duret, hydropem minatur.*

*Avium stercora. Art. 1855. Candidum ex avium fimo est earum urina, ideo confert Ictero, qui morbus inflavatio est: album in anserino stercore diligenter abrasum ficcatumque privatim ad icterum facit. Listerus.*

In Ictero pertinaci, medicamentis usitatis minus cedente, ex repetitis experienciis omnibus commendo *Æthiopem mineralem tanquam remedium in hoc affectu potentissimum*. Icterus in ultimo stadio sanguinem fundens per sedem, per urinas, per ipsam cutem, per sputum, vel stillicidium ex naso, &c. vix unquam curatur.

*Boerhaave. Art. 1856. Instar omnium religiose consulendus est præclarissimus Boerhaave, qui de Ictero multiplici, & de hepatite egregie scripsit, p.201.*

*Remedia varia. Art. 1857. Stercus ovinum in cerevisia infusum pro pauperibus est laudabile medicamentum. Decoctum sem. cannabin. sapo Venet. flores sal. armoniaci martiati, ens veneris, &c. sunt remedia optatissima; ut etiam sequentia, cerevisia icterica, decoct. berber. decoct. icteric. expressio milleped. icteric. haust. saponac. pil. icteric. (probatissimum medicamentum) vinum chalybeat.*



## C A P U T IX.

*Sive Fasciculus Morborum novus.*

## R H E U M A T I S M U S.

*Ballonii sententia.*

*Art. 1858.* **R**heumatismus vel sana corpora *Rheuma-*  
 ulcerosa, & phlegmonodea lassitudine *tismo ob-*  
 tudine præcedente corripit, vel morbo longo *noxia*  
 jam jam desituro ægrotantia, aut qui falsa, & *corporum*  
 præcipite crisi solvi videtur.

Inter corpora autem quæ facile hunc morbum experiuntur sunt maxime aut valde caco-chyma, aut non ita caco-chyma, sed plethorica, & sanguinea, potissimum vero corpora illa, quæ febribus synochis putridis corripisolent.

*Art. 1859.* Eodem modo in sanis, & ægris *Morbo*  
 sese prodit; totum corpus dolet, facies nonnullis *descri-*  
 rubet, circum articulos maxime sævit do- *ptio.*  
 lor, ut ne minimum quidem, vel pes vel manus vel digitus sine dolore, & clamore moveri possit. Æqualibus autem doloris causis præsentibus vel in parte, vel in toto corpore, magis ea pars dolet, quæ sensum exquisitiorem habet.

Quum partibus apprimatur manus, sensus est & perceptio ( licet etiam blande attrectaveris ) cujusdam caloris acris. Si pulsum consulis, febrilis aut nulla aut exigua esse videtur. Et tamen febris est revera, sed non valde magna. Quod si major fieret, esset vere febris continens putris, nullas manifestas habens exacerbationes.

*Allen. Pars II.*

Y

Do.

Dolores quidem noctu exacerbantur, nec dormire queunt ægri, partim quia moveri loco nequeunt, & quo statu fere primo jacent, ac decumbunt, in eo maneant, partim quia sine cruciatu ac vehementi dolore vix moventur, aut attinguntur; tensio est & acutus eorum quidem sensus: est enim & plenitudo & cacochymia.

*Art. 1860.* Quod Arthritis est in parte aliqua id ipsum est iste rheumatismus in toto corpore; nec melius explicari describique potest hic affectus, quam proposita analogia, & affinitate, quæ est inter hunc, & Arthritidem. Durius utrumque est. At arthriticus dolor certis periodis repetit, certisque temporibus; rheumatismus non item: nisi quod in iis, qui in vitæ genere peccarunt, ut nervis redditis infirmioribus, & succrescente cacochymia, tandem habitum, aut diathesin arthriticam, afferre posset. Et revera qui istum rheumatismum bis aut ter sunt experti vix (nisi sibi caveant, consulenteque) tormentum arthriticum vitare possunt.

*Ejus differentia ab Arthritide.*

*Art. 1861.* Morbus more eorum, qui consistunt in inflammatione purgatione irritatur, in quo licet multum, & sæpe sanguis demitur, is plane corruptus est, & in serum quoddam putre resolutus. Quare laudamus quidem impendio magis phlebotomiam, quam saluberrimum esse remedium testamur. Clysterium frequens usus valet. Medicamenta per os sumenda nocent, inflammationem augent, & dolores in artubus, & habitu corporis irritant. Cassia, & lenientia tamen omnino non improbamus, hæmorrhagia confert, sub finem sudores. Tandem urina crassa multa, ut quæ ab abscessibus vindicat, & maxime in febribus laboriosis confert.

*Curatio.* Et quoniam ægri perpetuo conqueruntur, & sen-



sum habent caloris acris aliquatenus juvantur usu rerum frigidarum, sed nocent bifariam, partim quia difflatum prohibent, partim quia, ubi quis usus est paullo frigidioribus remediis, remanet, domito morbo, major infirmitas nervorum, unde arthritidis occasio postmodum nasci potest.

Vidi qui Thermis, & decocto ligni in dies uti voluerunt, sed nullo profectu. Immo omnia pœne recruduerunt. Cornicula frequentia, & hirudines copiosæ habitui corporis applicitæ conferrent.

Vidi plerosque sub finem morborum longorum hoc affectu laborasse.

*Sydenhami sententia.*

Art. 1862. Nullo non tempore, maxime autumno cum rigore, & horrore, & cæteris febris symptomatis adoritur, elapso uno vel altero die (citiusque) dolor adest atrox nunc in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris, & genubus præsertim; vicissim hos relinquens, & illos occupans, frequentius cum rubore, & tumore. Febris sensim evanescit, manente dolore: est morbus diuturnior, aliquando per menses aliquot durans, & annos non continuo, sed paroxysmis repetitis. In lumbagine Rheumatica immanis dolor adest circa lumborum regionem fixus, ne phritin mentiens, nisi quod æger non vomitur. In Rheumatismo sanguis pleuriticorum similis est.

Art. 1863. Sanguis mittendus est ad tertiam quartamve vicem, habita ratione virium, alternis vel tertiis diebus. Viſtus admodum tenuis præbendus est; æger quotidie e lecto ad horas aliquot exsurgat. Potus ordinarius sit cerevisia

tenuis vel potius pilana ex hordeo rad. liquirit. acetos. &c. vel *emulsio*; parti dolenti applicari potest cataplasma ex pane albo in lacte coct. cum tantillo *croc.* diebus a venæsectione liberis injiciendum est *enema* ex lacte saccharato, vel ex decocto communi pro *clystere*; &c.

*Alie me-  
dici me-  
thodi.*

Art. 1864. Si imbecillitas ægri *phlebotomia* repetitionem non ferat, tum post secundam vel tertiam venæsectionem curatio alia methodo tentanda est, viz. capiat alternis diebus potionem purgativam communem, donec convaluerit, & iisdem noctibus *paregoricum* ex syrupo de *mecon.* his minus ad votum conducentibus, *antiscorbuticis* morbi reliquæ fugandæ sunt. In juvenibus, atque iis, qui temperate vixerunt, vino non plus æquo deditis, Rheumatismus *dieta simplici* admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æque feliciter, ac repetitis venæsectionibus profligari potest, nempe *dieta* ex solo *sero lactis*.

### Schmitzii sententia.

*Rheuma-  
tismus  
est quodā  
modo ar-  
thritis u-  
niversa-  
lis.*

Art. 1865. Per Rheumatismum vulgo intelliguntur dolores erratici externum corporis habitum occupantes; crebri quandoque ac leviusculi horrores adsunt; febris si quæ adsit, mitis, noctu plerumque recrudescens, sed nocturna exacerbatione, & contumacia *luis venereæ* cruciamina æmulatur. Lubricus est Rheumatismi in *arthritin* transitus, nam communis est utriusque morbi materia, hinc *arthritidis universalis* nonnullis appellatur.

*Indica-  
tiones  
curati-  
væ.*

Art. 1866. Commodius sudoribus solvitur. Venæsectio semper in hoc affectu curando est necessaria; est enim remedium *νυσπομιχον*, neque sine magna sanguinis jactura, & virium ruina domari



mari potest; post venæsectionem *emetica* fortiora sunt propinanda, hinc *purgantia* leniora, ut pulv. *Comitiss. Vuarvicens.* &c. Partes affectæ foveantur repide cum *lapide medicamento* in aqua pluviali solut.

*Musgraviæ sententia.*

*Art. 1867.* In Rheumatismo tam ab acri sale <sup>alcalico</sup> calico, quam ab acido, lentorem fieri longe probabilius, *Baynardi* experimento liquet, viz. ex Rheumaticorum urina, salis alcalici ejus, quem habent sani bonaque utentes valetudine, pars quasi trigesima, nec quidem supra, distillando elicitur: unde conjicitur salem istum in sanguine retentum pituita (foran adjuvante oleo, veluti in *sape* compositione) irretiri involvique, & ad viscidum in Rheumatismo faciendum, ad dolores & tumores inferendos opere quidem maximo contribuere. Serum quoque sanguinis Rheumatismo laborantium *syrupo violarum* admixtum viridescit, & cum *mercurio sublimato* albissimum deponit concretum.

*Art. 1868.* De magna efficacia vomitorii aliquoties repetiti in hoc morbo debellando dignus est, ut consulatur auctor, p. 26. *Balsano sulphuris terebinthinato* attus motu privati bis die superillinantur, vel etiam *vernice terebinthinat.* *oleum terebinthina & camphora* sunt remedia interne, & externe proficua.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1869.* Arthritis vaga scorbutica seu Rheumatismus revera cum *Arthritide vera* convenit, accidentibus saltem variat, terminatur nunc per sudorem aut urinam aut per eruptionem cuti-



neam instar purpuræ relicta cutis asperitate: ad-  
sunt interdum gravissimæ præcordiorum anxie-  
tates, sitis clangosa, sudores, dolores lancinan-  
tes, & pungentes; imbecillitas ad motum, loco-  
rum dolentium tumores, &c. fundamentum hu-  
jus morbi est sal scorbuticum fibras vellicans.

*Curatio.* Art. 1870. Vomitus in principio convenit: *venesectio* in principio, & incremento: *volatilia* non debent exhiberi in principio, sed *alcalia* & *testacea*, ut etiam *antimonium diaphoretic. cin-  
nabaris antimonii*, speciatim *arcannum duplicatum  
Mynsichti*; postmodum fiat accessus ad *volatilia*  
cum *antiscorbuticis* mixta; *lumbrici terrestres*  
sunt remedium sine pari in vino infusi, vel in  
fero lactis cocti, vel pulverisati; *millepedes* etiam  
commendantur. Declinante morbo conveniunt  
remedia ex *pino* vel *abiete* (*scobs abietis in fero  
lactis coct.*) *rob. bacc. junip. sambuc. decoct. e li-  
gnis. Decoct. strobilorum pini* curam fere absolvit.  
Externe locis dolentibus applicandi sunt *lumbrici  
terrestres* donec moriantur.

### Farrago sententiarum.

*Partes nonilio-  
res quā-  
doque  
obsidet.* Art. 1871. Miasma rheumaticum quandoque  
cerebrum, pulmones & viscera obsidet cum do-  
lore & ægritudine excrucians. *Boerhaave.*

*Vires te-  
rebinthi-  
na.* Art. 1872. Dedi nonnumquam *terebinth. Venet.*  
*3vj. vel 3j.* (& tantam ejus quantitatem veteres  
vulgo adhibebant) cum vitello ovi solut. in hau-  
stu quodam, non modo in *paralyse*, verum in  
*arthriticis & rheumaticis* affectibus cum optimo  
successu, sed in hoc postremo affectu *venesectio*  
debet anteire, & si opus fuerit, repeti. *Har-  
ris.*

*Stercoris  
equi.* Art. 1873. Infusio *stercoris equi masculi* in vi-  
no tenui vel liquore posset. facta, ad *3iv. vel vi.*  
bis



bis in die propinata, est medicina in hoc affectu minime contemnenda. *Vuillis.* „ Et nunc quoniam de medicamentis sordidis sermo agitur, „ prætereunda non est *urina vacca* apud *Parisienses*, & etiam non ita pridem *Londinenses*, „ perquam celebrata, non modo in rheumatismo, sed etiam arthritide, hydrope, asthma, „ te, ictero, &c. curandis. *Memoir. de l' Acad.* „ Vol. XI. p. 41.

Art. 1874. Lini *sylvestris* cathartici herba integra cum caulibus, & capitulis vino albo leni calore infusa satis valide purgat serosos humores, indeque in *Rheumatismo* valde prodest; sed non nisi robustis propinanda est quorum plurimos, ruri degentes, solo usu istius remedii curatos vidi. Non novi præstantius remedium quam *rhabarbarum* diu continuatum ad hunc morbum contumacem oppugnandum. Et si malum sit habituale, ejusdem *recidivationem* præcavet. In corporibus languidis & emaciatis, hujus morbi diurnitate, nec non medicamentorum farragine, fractis & detritis, *lac asinum* cum pulveribus *testaceis*, saltem *dieta lactea* plerumque felici adjumento esse potest.

*Linum sylvestre.*

*Rhabarbarum.*

*Lac Asinum.*

Art. 1875. Ad rheumaticos lumborum dolores *lactis* cocti cum aqua decoctionis *theæ* & mane sumptum ad ℥j. circiter, felicissime sum expertus. *Baglivus.*

*Infus. theæ lactea.*

Art. 1876. Remedia *antiarthritica* & *antiscorbutica* fere omnia hic conferunt, præcipue declinante morbo, & in intervallis. *Pil. volatil. epithema saponaceum*, *unguent. salino-volatile*, &c.

*Remedia varia.*

## S C O R B U T U S.

Barbetti &amp; Deckerzii sententia.

Scorbutus  
quas  
mor-  
bus.Sympto-  
mata  
varia.

Art. 1877. Scorbutus est aliqualis *cachexia* species ab humore melancholico peculiariter corrupto orsus; in *calidum* & *frigidum* plerumque distinguitur; sed revera omnis provenit ab unica causa, nempe *lymphæ* vel *pituitæ* crassa; unde tot symptomata pro temperamentorum, & locorum diversitate, ex variis obstructionibus, & humorum stagnationibus: *Quadraginta* novem diversa enumerat *Eugalenus* in suo tractatu de *scorbuto*; sed illa omnia nunquam concurrunt in uno eodemque corpore. Conqueruntur de dolore interdum punctorio, plerumque gravativo capitis, de cordis palpitatione, angustia, inflatione ventriculi, tensione ventris; tussunt, putant se interdum suffocari, difficulter respirant, vomunt, febricitant; appetitus prostermitur; singultu, ructibus, flatibus, convulsionibus vexantur, tremunt, lassi sunt artus, maculis rubris vel purpureis aspersi, (quæ tamen non sunt multi faciendæ, nisi degeneraverint in ulcera, vel elevatæ sint) adest plerumque oris pruritus, gingivarum erosio, cum sanguinis effusione, dentium vacillatione ac nigredine, halitus gravis, immo cum reterrimo aliquando odore; salivatio adest multa, urina cruda & tenuis, jam vero crassa & rubra, immo fere nigra; pulsus semper inæqualis, ac, ut plurimum debilis; dolores vagi, imprimis crurum, præcipue noctu ingravescentes; ulcera maligna, tumores varii generis plerumque œdematosi, sudores copiosi, ipsa atrophia, viriumque defectus, carus, & sopor profundus.

Art.



Art. 1878. His regionibus adeo familiaris est *Est mor-*  
ut nullus fere reperiat morbus, cui non ali- *bus fre-*  
quid scorbuti subit; vere & autumnno maxime *quentis-*  
infestat, in adultis, & senibus gravior est; in- *simus &*  
veteratus & hæreditarius difficillime curatur; *diutur-*  
solvitur aliquando per alvum, per hæmorrhoi- *nus, &*  
des, vel per urinam; aliquando in alios mor- *difficilis*  
bos degenerat, scilicet, *hydropem, atrophiam,*  
*apoplexiam, epilepsiam, stuporem,* aut *convulsio-*  
*nem;* interdum Scorbutici subito moriuntur; dy-  
senteria rarissime laborant; plerumque *diarrhœa*  
vel *linteria,* quæ difficulter curantur, longo tem-  
poris tractu ægros necant *hydropicos vel tabidos;*  
respiratio difficilis non adeo periculosum est ma-  
lum quam vulgo putatur. „ Scorbutus fixam ha-  
„ bens sedem (inquit *Vvaldschmidius*) raro cu-  
„ ratur, nisi quandoque palliative: impossibile  
„ enim est sanguinem totaliter corruptum ad sta-  
„ tum naturalem reducere. *Dieta* in hoc malo  
„ est optima medicina, de qua videatur *Senner-*  
„ *tus* in praxi.

Art. 1879. Exactissima *dieta* medicamentis *Curatio.*  
præstat, sine qua Scorbutus sensim fit incurabilis;  
*venesectio* non prodest; *purgantia* fortiora no-  
cent; sufficiunt suo tempore leniora; præparandi  
sunt humores *incidentibus,* inter quæ *salia vo-*  
*latilia* quæcunque primarium obtinent locum.  
*Antiscorbutica simplicia primaria:* sunt *radix ra-*  
*phan. sylv. oxylapath. petasitid. scorzoner. tara-*  
*xaci, zedoar. angel. polypod. helenti, lignum gua-*  
*jac. sassafr. sem. sinap. fol. cochlear. becabung. na-*  
*sturt. aquat. trifol. paludos. acetos. persicar. mala-*  
*anrant. acidior. pom. citri, bacc. junip. sem. dauci,*  
*gum. ammoniac. lacc. crem. tartar. vitriolat. cha-*  
*lybs, &c.* Saccharum & saccharata omnia Scor- *Vires*  
buticis nocent. „ Omnem Scorbutum (inquit *mercu-*  
„ *Dolens*) feliciter intra xij. dies, diis faventi- *rii dul-*  
„ bus, *cis.*

bus, tollam per *mercur. dulc.* & revera dulcificatur singulari, & peculiari motu sublimatum, ut duntaxat sudorem moveat, & nullam efficiat salivationem, cujus ope omnes scorbuti humores intra prædictum tempus consumuntur, & educuntur, sed durante hac cura nihil bibendum, nisi decoctum appropriatum, & ab acidis & carne suilla abstinendum.

*Art. 1880.* Singulorum symptomatum curam peculiarem videre licet apud *Eugalenum*, cujus hæc summa est; quod omnibus specificis parti affectæ dicatis admiscenda sint *antiscorbutica*.

*Dyspnæa.* In difficili respiratione *sp. salis armoniac. cum tinctura croci & aq. cochlear.* specificè prodest.

*Gingivarum laxitas.* In gingivarum laxitate, & putrefactione *tinctura gum. lacc. sp. cochlear. &c.* pro lotionè, item mistura sequens. *℥. Pulv. rad. ireos florent. gum. lacc. ana ℥j. alum. ust. ℥j. mel. ros. q. s. sp. salis parum* pro grato acore, *m.*

*Dolores vagi.* In doloribus vagis crurum, &c. inter externa topica *epithema saponaceum Fullerii* maxime commendatur.

*Tormina ventris.* In torminibus ventris convenit *sp. sal. armoniac. cortic. aurant. infus. cumque sp. junip. vel sem. anisi* mixtus: externe fofus, & linimentum seq. *℥. Ol. lumbricor. terrest. chamæm. sp. cochlear. ana p. æ.*

*Convulsio.* In convulsione, & contractione interne convenit *sp. sal. armoniac. cortic. aurant. salu. & roremarino* effusus, item *ol. hyperic. & cochlear.* pro inunctione tendinum.

*Erysipelas.* In erysipelate præter externa exhibeantur *sudorifera*, ut *rob. sambuci*, *sp. ejusdem*, *bezor. mineral. sp. sal. armoniac. cochlear. &c.*

*Atrophia.* In atrophia non datur præstantius remedium, quam *lac caprillum spiritu aliquo antiscorbutico* prius ipsi instillato.

*Char.*



## Charletoni sententia.

*Art. 1883.* Scorbutus in his regionibus septentrionalibus est morbus *endemicus*, & maxime frequens in locis Boreæ patentibus, uliginosis, palustribus & maritimis; huc faciunt quoque insalubres ædium calce recens obductarum expirationes; & in carcerum, fornicum speluncarumque angustiis conclusus, nec solutus syderum luce aer. Scorbuto præ aliis maxime tentantur ii, quibus alimenta sale ac fumo indurata, crassa, viscida, terrestria, nautica, atque id genus alia, quæ nec facile digeri, nec ad statum summæ fluxilitatis cito perducì norunt, diutino in usu sunt; item quibus vina poligophora, & spiritus ardentes scaturientes particulis salinis, & sulphureis sanguinem succumque nutrimentum fœda ranciditate inficiunt; adjice & illos, qui oxygari, omphacii, acetariorum, aceti, &c. ejusdem commatis condimentorum languenti per luxum stomacho male consulunt; acida quippe omnia strenue faciunt ad productionem *melancholice hypochondriacæ*, quæ scorbuto adeo affinis est, ut non nisi gradibus quibusdam ab eo differre videatur; sub eodem censu cadunt insalubres potus, aquæ nimirum corruptæ, crassæ, fæculentæ, graves, subsalsæ, cerevisiæ, & vina vitiosa. Qui delicate vivunt magis Scorbuto obnoxii sunt, quam qui laboriose, fœminæ viris, urbani agricolis, studiosi obtusis, &c. Plures sibi Scorbutum *contagio*, quam ex aliis ullis causis forinsecus advenientibus contrahunt. „ Causa  
 „ Scorbuti ( inquit *Doleus* ) est sal fixum acre  
 „ in massa sanguinea, in qua latent multæ par-  
 „ ticulæ vel acidæ vel muriaticæ; *acidæ* quando  
 „ sanguis crassior, & nigricantior apparet, mu-  
 „ riaticæ

Scorbuti  
 causæ  
 insi-  
 gniores.

Causa  
 Scorbuti  
 secundum  
 Doleum.

5, *riatica* vero ubi consistentia amissa tota dif-  
 „ fluit ; certum est utcumque Scorbutum non  
 „ semper ab una aliqua singulari , & simplici  
 „ causa proxima ortum suum habere ac depen-  
 „ dere, sed sæpe a multiplici : tot enim Scor-  
 „ buti species seu differentiae dici possunt, quot  
 „ sunt vitiosæ sanguinis tincturæ e salibus diver-  
 „ sis ( quæ propemodum infinitæ sunt ) & ho-  
 „ rum diversimoda combinatione ortæ.

*Remedia  
ad Scor-  
butum  
acidum.*

*Art. 1882.* Acido scorbuto affectis nullum  
 ( spondemus ) sive præsentius, sive certius adhi-  
 bueris remedium, quam *lactis emulsionum ex a-*  
*mygd. dulc. decocti china*, *jusculorum consumma-*  
*torum*, & *cæter. antiacidorum*, & *analepticorum*  
 usum ad plures septimanas productum.

*Dyspnœa.*

*Art. 1883.* Difficilis respiratio oritur plerum-  
 que, vel a sanguine grumescente, vel ab irrita-  
 tione spasmodica a salium stimulis ; in priorè  
 casu conveniunt *incidentia*, *spiritus* & *salia vo-*  
*latilia*, *viperina*, *simus equinus*, &c. aliquando  
*venesectio* est necessaria ; in posteriori causa *an-*  
*tispasmodica*, *spiritus castorei*, *lavendule*, inter-  
 dum *opiata*.

*Diarrhœa.*

*Art. 1884.* In diarrhœa Scorbutica pluribus  
 indicationibus satisfacit rhabarbarum modice to-  
 stum, quo præmissio, cæteris omnibus merito  
 præfertur *crocus martis astringens* cum *conserva*  
*ros. rub.*

*Tormenta  
ventris.*

*Art. 1885.* In torminibus ventris *lac asininum*,  
*caprillum*, aut *serum lactis vaccin.* adhuc a coa-  
 gulo tepidum, sunt remedia proficua : his enim,  
 post mitigata tormina primarumque viarum pur-  
 gationem, propinatis, non alvina tantum regio,  
 sed totum etiam corpus perfectum *neoterismum*  
 consequetur ; sed omnium instar sunt *aque mi-*  
*nerales cathartica*, ut *Ebshamienses*, harum vir-  
 tus est plane admirabilis ( nec minores sunt vires  
*aquarum Bathoniensium.* )

*Art.*



Art. 1886. In paralyſi, ſtupore, tremore, &c. Paraly-  
conveniunt remedia *invigorandis corroborandisque ſis, ſtu-*  
*cerebro & nervis* appropriata cum *antiſcorbuticis* por.  
*generoſioribus* conjuncta, item *Balneatio in ther-*  
*mis ſulphureis* (& earundem aquarum potatio.)

Art. 1887. Atrophia Scorbutica partium nu-  
trientiarum crimine contingit. Inter *deobſtruen-*  
*tia* haud ſcio an quicquam utilius datum ſit *aci-*  
*dulis*, quæ facile in adyta meſenterii, & glan-  
dularum ſeſe penetrantes vias chyliſeras omni ab  
infarctu liberant, nec tamen ullum interim re-  
linquunt ſive caloris ſive acrimoniæ veſtigium;  
locum etiam habent *lac aſininum*, *caprillum*, ju-  
ſcula *inſtaurantia* ex *limacum*, *cancrorum aſtaco-*  
*rumve fluviatilium carnibus*, &c.

In atrophia ſcorbutica interdum contingunt  
dejectiones unguinoſæ, quaſi adipe vel oleo per-  
fuſæ, nimirum ſolidarum partium colliquationes  
ſunt: ægroti *hecticorum* more ſunt tractandi, ad-  
vocatis ſimul in ſubſidium *antiſcorbuticis tempe-*  
*ratoribus*.

### Vuillii ſententia.

Art. 1888. Scorbutus non eſt affectio ſimplex, ſed  
potius morborum *legio*; ſecundum vulgares  
appellationes dicitur *bilioſus* ſive *calidior exan-*  
*thematis* aliſque ſymptomatis apertioribus ſe  
prodens, vel *melancholicus*, cujus virus quaſi  
ſub cineribus latet. Dolor ventris Scorbutico adeo  
familiaris eſt, ut juxta *idioma Germanicum* *Scher-*  
*boyk* exinde nomen acceperit; hoc ſymptoma  
nonnullos in mitiori licet gradu fere continuo  
affligit; in quibuſdam vero dolores valde acuti  
ſunt, & tanquam affectiones *colicæ* frequenter  
eveniunt; paroxyſmo autem diutius perſiſtente  
cruciatus ſæpenumero in *lumbos*, & *dorsum pro-*  
*pagan-*

pagantur, cujusmodi affectioni non raro *paralysis* succedit; ratio est, quoniam nervi lumbares, & mesenterici intime communicant, ac pluribus in locis inosculantur. Dolores etiam alibi frequenter sentiuntur, ut in capite, pectore, cruribus &c. Novi plures Scorbuticos dolore molestissimo subter *sternum* excito perquam diu vexatos, ut in quibusdam nihil minus quam *abscessum* in mediastino latentem suspicarer. Cephalalgiae sunt frequentissimae, & intolerabiles, & tibiæ dolores atrocissimi.

*Cathar-  
tica &  
digesti-  
va.*

Art. 1889. Si ægrotantis constitutio sit calidior, *aloetica* & *diagridiata* vitentur, & temperatiora ex *senna*, *rhabarb.* &c. exhibeantur pro *catharsi*. Inter medicamenta *digestiva* merito recensentur *crem. tartari*, *tartar. vitriolat. tinct. salis tart. elix. propriet. mixtura simplex*, &c. *Tincturæ* cum menstruo sequenti melius ac facilius conficiuntur, quam vulgari modo: ℞. *sp. vitriol. rectific.* ℥vj. *sp. vin. alchaoisat.* ℥xvj. m. & distilla in retorta vitrea cum ternis cohiblis.

*Diarr-  
rhæa.*

Art. 1890. Præter scorbuti curam radicalem medicus symptomatis gravioribus sublevandis subinde operam navare debet. In Diarrhœa inveterata methodo sequenti sæpe bono cum successu usus sum; imprimis purgatio cum *infusorhabarbari*, *aromaticis astringentibus adjectis*, instituitur, & aliquoties iterata intervallo trium, & quatuor dierum: cæteris diebus sumatur dosis elect. seq. bis in die. ℞. *Conserv. absynth. vulger.* ℥vj. *spec. diarrhod. abbat.* ℥ij. *santal. alb. rub. ana* ℥j. *croc. mart. opt.* ℥ß. *syr. chalyb. q. s. m. f. elect.*

*Oris vi-  
tia.*

Art. 1891. Quoad oris vitia, quando caro gingivarum intumescit, & fungosa evadit, valet gargarisma scorbuticum nostrum: quando gingivæ putrescunt, & corumpuntur, medicamenta fortiora



tiora adhibeantur, imprimis infusio lapidis medicamentosi, & astringentia in dentium vacillatione.

Art. 1892. In artuum doloribus sudorifera cum Artuum  
julap. ex aq. cochlear. & sp. lumbricor. & diureti- dolores.  
ca, item lumbrici terrestres quocunque modo u-  
surpati frequenter juvamen præstant, aliquando  
tamen phlebotomia convenit. „ Infusum stercoris  
„ equi masculi, decoct. e lignis, gum. guaiac. &c.  
„ hic locum habent. „

Art. 1893. Crepitus ossium medelam vix ad- Crepitus  
mittit. „ Nec mirandum; nam ex cadaverum ossium.  
„ sectionibus patet epiphyses ab ossium extrema-  
„ tibus sejungi & penitus separari; unde sonum  
„ crepitantem inter movendum edunt. *Memoir.*  
*de l'Acadam.* Vol. III. p. 238.

### Pitcarnii sententia.

Art. 1894. Scorbutus est congeries plurium Scorbuti  
morbum natura diversorum. Ut febris est vi- essentia.  
tium sanguinis, sive omnium excernendorum,  
intra arterias dum fluunt, ita Scorbutus est vi-  
tium omnium aut multorum simul excretorum,  
dum per excretoria fluunt sua: vel est defectus  
aut augmentum in excretoriis canalibus. Pulsus  
in omnibus Scorbuticis est tardus (inter signa  
pathognomonica) ideoque generaliter nastrucia &  
antiscorbutica dicta profunt; quia talia remedia  
pulsui frequentiam conciliant.

Art. 1895. Scorbuti cura optime eruitur re- Curatio.  
solvendo ipsum in symptomata, quibus constat,  
quorum remedia sunt nota.

Art. 1896. Pro maculis in Scorbuto exhibe an- Macula.  
tistherica; nam maculae istae sunt lividae, & fere  
nigrae, ut in ictero pigro.

## Ettmulleri sententia.

Signa  
Scorbuti  
primaria.

Art. 1897. Præ aliis *Belgæ & Angli* Scorbuto sunt obnoxii, urina plerumque est nimis flammæ, vel cum arenulis istis rufis imprægnata, in summitate vari-colorata instar caudæ pavonis; jejuno stomacho frequens est pyralismus. Sequentia ceu signa primaria Scorbuti recenset *Lindannus*, colorem purpureum semilunarem sub concavo oculorum apparentem, cruentationem gingivarum, foetorem oris, maculas in femoribus & tibiis, vacillationem genuum, phlogosin & exæstuationem per totum corpus.

Respiratio  
difficilis.

Art. 1898. Maxime observatu dignum est prognosticon *Sennerti* de Scorbuto: Respirationis (inquit) difficultas, & pectoris angustia periculosum est malum, ob quam si medicus, & adstantes suum officium non faciant, sæpe ægri *syncope* præter expectationem intereunt; sin vero fortior natura morbum diutius tolerare possit, plerumque in *hydropem* incidunt, præcipue ii, qui purgantibus fortioribus subinde uti solent. Scorbutus calidus difficilioris est curationis quam frigidus; inprimis Scorbutus cum diarrhœa est periculosissimus, inquit *Eugalenus*.

Curatio.

Art. 1899. Basis curandi mali hypochondriaci Scorbuti est vomitus in majori dosi; purgantia fortiora nocent, laxantia conveniunt; alvus enim semper servanda est aperta: de usu martialium notabilis est cautela *Tachenii*; in iis, quibus viscera tumida, & infarcta jam ad schirrhosam naturam degenerant, minus proficua. Acetum est nocivum, non tamen succi acidi vegetabilium & fructuum. Lac & omnia lacticia in Scorbuto, præmissis universalibus, quamdiu stomachus adhuc digerendo aliquid valet, sunt optima.



ma. *Mercurialia* sunt vitanda ob metum salivationis, *antimonialia* potius sunt eligenda. Ad curam conducunt *martialia* omnia, præmissis digestivis & vomitoriis, ut *sal digestivum hypochondriacum* (i.e. caput mortuum *sp. salis armoniacæ* per solutionem, chr. statificationem, &c. factum, *tartarus vitriolatus*, *sal absynthii* (*pulv. hyst. Batean.*) *antihectic. Poterii*, *bezoar. min. elixir. proprietat.* &c. Præmissis ita digestivis, propinandum est vomitorium, inter quæ eminent *antimonialia*, *tart. emetic.* dos. a gr. iv. ad vj. & postea per alvum laxantia, inter quæ *gum. ammoniacum*, *extract. hellebor. nigr. rhabarbarum*, *mercur. dulcis* (sed parce.) Demum accessus fiat ad *martialia* & *acidulas naturales*, *amara*, &c. *Stomachica*, *arcanum duplicatum Mynsicht.* *Antiscorbutica* *Specifica* sunt, *cochlearia*, *nasturt. flammul. Jovis*, *trifolium palustre*, *radix raphani oxylapath. bardan. ar.*, *sem. sinap. abies*, *junip. chin. sarsaparilla*, *sassafr. cort. Vinteran. citri*, *aurant. sp. cochlear. rob. sambuci*, *juniperi*, *sp. sal. armoniac. & sal. volat. ejusdem.* *Specificæ.*

Art. 1900. In gingivarum pethematis succus *Salviae*, *cochleariæ*, *rorismarini*, *gum. lacc. myrrh. alum.* utramque faciunt paginam, cui addi potest cremor aque calcis supernatan. (1880. 1890.) *Gingivarum laxitas.*

Art. 1901. Maculæ cutaneæ sunt semper bonum signum malæ causæ foras erumpentis; interne conveniunt *diaphoretica*, *anthiectic. Poterii*, *cinnab. antimon. tinct. coral.* &c. item decoctum *summit. pin.* expectando sudorem. *Maculae.*

Art. 1902. Ad dolores crurum interne sudoriferæ decoct. e lignis, &c. Externe *sp. junip. can.* *phorat.* item *sal armoniac.* in *sp. lumbricorum* solut. *Balneum* quoque ex formicis earumque cubile est egregium. (1880. 1892.) *Dolores crurum.*

Art. 1903. „ Est & colica quædam Scorbuti. *Allen. Pars II.* *Colica nephritis.* „ ca

ca (inquit *Waldschmidtus*) ubi ægri queruntur de intenso dolore circa lumbos, & non in intestinis, sed in musculis abdominis; ibi mesenterium afficitur, & causa morbifica hæret in plexibus nervorum succo nutritio depravato, sæpe terminatur in paralyin, & cefante paralyi redit dolor consuetus. Conveniunt *antiscorbutica* & *nervina*, *diuretica*, *sudorifica*, &c. Ad colicam, & nephritin *Colicam* thain ol. amygd. dulc. in juscule gallinaceo, item *nephritis*. *sperma ceti*, & *opiata* cum *catharticis*, *clysmata terebinth. stomachica* & *carminativa*. (1910.) De arthritide vaga *Scorbutica* vide infra.

*Capitis dolor.* Art. 1094. Ad cephalalgiam *sal volatile succini*, *cinnab. antimonii*, & *usus lactis*.

*Paraly. ses, &c.* Art. 1905. *Paraly. ses* Scorbutica, ut & convulsiones, & contracturæ curantur *vomitiviis*, *antiparalyticis*, & *antispasmodicis* cum *antiscorbuticis* permistis. (1880. 1886.)

*Feb. scorbutica.* Art. 1906. *Feb. scorbutica* signa sunt omnia ea, quæ per se Scorbutum significant; palmarium interim notetur signum, quod in febre hac adsint notabilia circa appetitum vitia; v. gr. adest nimius, ut plurimum autem cum vomitu, aut depravatus, ut ad omnis generis salsa appetitus feratur, obstructions alvi contumaces, &c.

*Curatio.* Art. 1907. *Feb. scorbutica* curantur, ut alia, adhibitis etiam *antiscorbuticis*; *Arcanum duplicatum* est optimum remedium, & *sp. sal. armoniac.*

### Farrago sententiarum.

*Sydenhami sententia de scorbutico.* Art. 1908. Scorbutus non ita frequens est morbus, ac vulgo putatur; nam multi ex iis affectibus, qui Scorbutici audiunt, sunt vel effecta morborum fientium, vel reliquæ nondum perfecte devictorum, quod facile probatur exemplo *arthrit.*



arthritidis, podagra, atque hydropis: rebus ita se habentibus, methodus medendi non adulterinis illis symptomatis, sed ipsi morbo, qualisnam is demum fuerit, ceu perfecte formato, jamque actu existente accommodanda est. Sydenhami videatur locus m. p. 307.

Art. 1909. Succilimonum, aurantiumve sunt *Vires li-*  
*antiscorbutica* nunquam satis laudanda. 33 Peri- *monum*  
 33 tissimi, inquit *Piso*, nonnulli *Indie* medica- *& au-*  
 33 stri plus praesidii in limonibus ponunt, quam *rant.*  
 33 in *lapid. bezoart.* aut *theriaca* contra malignos  
 33 morbos, & pestilenciales febres atque ipsa ve-  
 33 nena. Ego autem sine jactantia affirmo, me  
 33 ex nullo alio aliquo remedio simplici tot feli-  
 33 ces effectus in tota praxi mea observasse, quam  
 33 ex limonibus. *Lister.*

Art. 1910. Sabulum rutilum tartareum in uri- *Stran-*  
 nis Scorbuticorum excerni solitum nephritidem *guria.*  
 spuriam saepius inducit, quatenus angulis acutis  
 ejusdem atomi gaudent (quod patet ex adhæsione  
 ejus tam firma matulae lateribus, ut non nisi  
 vi inde ablui possit) quibus partes nervosas vel-  
 licant, & tormenta ipsis nephriticis graviora ex-  
 citant, unde quoque saepius in stranguriam in-  
 ducunt, in quo casu omnia *diuretica* calidiora  
 malum exasperant, *sp. salis dulcis* tamen hic  
 multum praestat. *Ephem. German. Anno 30.*  
*obl. 44. 895.)*

Art. 1911. Usus remediorum sequentium pe- *Remedia*  
 ritus non ignorat. *Aethiop. mineral. aqua lima-* *varia.*  
*cam* Scorbut, *aq. omnium florum*, *aq. raphan. comp.*  
*aq. scelotyrbica*, *cerevisia* Scorbutica, *cerevisia*  
*Scorbutica* attemperans, *epithema de calce*, ex-  
*pressio* Scorbutica calida, *expressio* Scorbutica tem-  
*perata*, *fotus podagricus*, *fotus spirituosus*, *galba-*  
*netum Sennerti*, *gargarisma contra foetorem*, gar-  
*garis. myrrhysatum* 1. 2. *Gargarisma prunellorum*,

*mistura eephraetica*, pil. cathartic. *Scorbutic. ferum sinapium*, succi antiscorbutici, l. 2. *tinctura cantharid. 1. 2. tinctur. gum. lacca*, *tinctura antimonii*, *tinct. virginiana*, pulv. ari comp. *vinum viperinum*, vitriol. Martis.

Art. 1912. *Aqua Antiscorbutica Regalis D. de le Fevre.* ℞. Rad. Raphan. sylvestr. lib. semis, qua probe mundata in talleol. tenuiss. secatur & in magnam cucurbitam vitream indatur, dein adde fol. Cochlear. lib. vj. Nastu. hortens. & aquaticana lib. j. sem. Scabiosæ lib. j. Lact. recent. lib. xij. Vin. Rhenani vel cujusvis alijs lib. iv. distil. in M. B. usque ad siccitatem, & liquor emanans in phyalis probe clausis asservetur ne volatilem spiritum amittat, in quo ejus precipua virtus consistit. Hujusmodi Aquam ejus Auctor testatur ad rectificandam Sanguinis massam summe præstare, quia urinas, sudores & perspirationem promovet, Stomachi munera confirmat, atque proinde appetitum acuit. Hinc specificum antiscorbuticum audit, nec non ægregium deobstruens, quod ab unc. ij. usque ad unc. vj. hauritur mane diluculo ante jentaculum, atque etiam eadem dosi circa quartam, vel quintam horam a prandio. Singula vice qua sumitur, bihorio elapso aliquid etiam cibi ingerere licet, ejusque usus cum sequentibus Trochicis, & pillulis Antiscorbuticis, si opus, conjungi potest.

Tabella ℞. Antimon. diaph. unc. semis, Cortic. citr. recent. 3vj. Macis 3j. sem. Amygdal. dul. excorticat. unc. ij. Pistach. mundat. unc. j. Concis. & contus. omnibus misc. cum sacchar. q. s. & cum aq. ros. & cinam. fiant Tabellæ addita Tinc. Ambregris. 3. sem. & singularum Tabellarum pondus sit 3ij. vel iij. de quibus altera mane, altera vero vespere usurpabitur superbibendo de supra descripta aqua unc. ij. vel iij. quotidie.



℞. *Rhab. elect.* ℥ij. *Aloes succotrin.* ℥iij. *Myrrh.* Pillulæ  
recent. optim. ℥ij. sem. *Gumm. Ammoniac.* ℥ij. *Cro-* antiscor-  
*ci* ℥j. *sal. tartar. fol. senæ ana* Div. f. pulv. & cum butica  
*Elix. Propr. cum sp. C. C. guttatim instillat.* f. pil- ejusdem  
lularis massa cujus dosis a ℥. sem. ad. ℥j. & de sin- Aucto-  
gula drachma reformatur pillul. XL. ut facilius ris.  
dissolvantur. Eadem ante coenam, vel ante de-  
cubitum ingeruntur, quin nullatenus ciborum  
concoctionem turbare valent, nec tormina pro-  
ducere, quin imo mediocriter leniterque alvum  
tantummodo sollicitant. Singulo biduo vel tri-  
duo etiam repeti possunt.

*Cochleariæ spiritus*, nec non ejus aqua, & *Cochleariæ*  
extractum virtute antiscorbutica plurimum excel- ria uti-  
lunt, quorum præparatio cum in laudato Au- litas.  
ctore, tum etiam in aliis Chemicæ libris facile  
occurrit. Attamen simplex ejusdem plantæ suc-  
cus ex doctissimorum Medicorum judicio magis  
præstat, ac reliquæ quævis præparationes.

*Art. 1913.* Dictionarii Medicinalis Auctor se- Quædam  
quens Opiatum in omnibus Scorbuticis affectio- alia re-  
nibus summopere celebrat. ℞. *Antihæct. Poter-* media.  
*sal. Armoniac. ana* ℥ij. *Rad. Ari pulv. succin. pulv.*  
*ana* ℥iij. *fenugr. subtiliss. pulv.* ℥j. *Misc. & cum*  
*conf. ros. vel syrup. quovis alio ejusmodi f. Opi-*  
*atum*; quod duodecim in partes divisum, harum  
singulamumat æger quotidie mane superbiben-  
do de sequenti *Pisana* cyathum, qua etiam in  
potum communem fruetur.

*Pisana antiscorbutica.* ℞. *Nastur. aquat. Rad.*  
*& fol. fragariæ ana man. ij.* *Herb. cochlear. man. j.*  
*Aq. commun. lib. xij. coq. per horæ quadrant. & co-*  
*lat. absque expression. adjice Tart. martial. solub.*  
*℥ij.*

Quamquam prædictorum remediorum usu scor- Notan-  
butica symptomata leniantur, & conquiescant, dum.  
non inde tamen reputandum est morbum fundi-

tus superatum iri, quia scorbuticum fermentum profunde delitescit, atque ita latet, ut, quando minus cogitatur, iterum prorumpat. Præstat igitur aliquandiu in eorundem remediorum usu persistere, etiamsi secundæ valetudinis testimonia imponant, quin imo singulo anno bis eadem renovare Vere nempe, & Autumno ut inde morbi recidivatio evitetur.

*Ad gingivarum  
excoriationem.*

*Art. 1914.* Quantum ad gingivarum excoriationes seu ulcuscula, cum in hoc morbo gingivæ semper sanguinolentæ dentesque excarnes occurrant, satius erit succo Nastrucii aquatici, vel Cochleariæ, easdem subinde abluere, quin imo sal. Armoniac. ʒj. singulæ hujus succi libræ addere licebit.

Parisiis vulgo utiliter pro scorbuticis ulceribus detergendis ac mundificandis adhibetur Unguentum Styracis, quod hujusmodi est. ʒ. *Ol. nuc. lib. xxxvj. Resin. & Picis Burgundicæ ana lib. xxx. Cera lutea, Styrac. liq. ana lib. xv. solidioribus ad ignem fufis addantur liquidior., & ad unguent. consist. coquantur.*

*Altera  
Scorbuti  
curatio.*

*Art. 1915.* Methodus ut in Xenodochio Domus Belgiæ ejusdem Urbis ita se habet: Remedia generalia præmittuntur, deinde pro potu communi cerevisia præscribitur ex infusione Absynth. Beccabung. & raphan. sylvest. quotidie mane stomacho jejuno propinantur ægro vini albi unc. vj. in quo cochleariæ, & absynth. folia infusa sint, vespere autem sex drachmæ exhibentur de Opiato ex Nastrut. Beccabung. semin. Nastrut. & Synapeos composito. Ad echimoses circa brachia, crura & femora succrescentes linimentum applicatur ex Sapone nigro, & vini spir. Quando ægri gingivæ tumescunt hordei decoctio, & agri-monix adhibetur cui, nonnullæ sp. vitriol. & mellis rosat. guttæ adjiciuntur.

AR-



## A R T H R I T I S.

*Aretæi sententia.*

*Art. 1916.* Communis omnium articulorum dolor Arthritis est, sed pedum dolorem Podagram vocamus, coxendicum Ischiada, manuum vero Chiragram. Verum articuli ita fere dolere incipiunt. *Morbū invadentis descriptione.*

Magnum pedis digitum dolor occupat, dein priorem partem pedis qua nititur, postea vero concavam subit, & malleolus postremo intumescit. Principio debilissimus morbus est, sed temporis spatio adeo vires acquirit, ut aegrotis incredibile videatur quomodo præter causam legitimam, & evidentem in insanabilem affectum inciderint, nihil enim medici diligentia proficitur.

Quibusdam in pedum articulis usque ad mortem residet morbus, quibusdam in omnis corporis ambitum vagatur, plerumque a pedibus in manus prosilit, item cubiti flexuram, & genu tenet, post hæc coxarum cavitates, quas Corylas Græci vocant, & dicitur Peristrophus. Transitus quoque fit in dorsi, thoracisque musculos; incredibile enim quam late malus serpat; vertebræ dorsi, & cervicis dolent, & in summo sacri ossis dolor inhærescit, Verum etiam tendones, & musculi cum distentione dolores patiuntur nec non maxillarum, & temporum musculi. Item communicatur renibus, & vesicæ. Oh rem admirabilem! Post omnia nares, & aures, & labia afficiuntur.

*Art. 1917.* Universam quidem ossium compagem morbus depopulatur non secus atque pedis aut manus articulum. In articulis quoque to- *Ejusdem confirmati descriptione.*

facea quædam coalescunt, ab initio veluti abscessus, postea vero spissato humore, & concreto difficiles sunt inflexiones, atque demum toti solidi albique consistunt. In toto autem membro tubercula exigua: quales sunt *Jonthi* a græcis, & *Vari* a Latinis appellati, & majora exsurgunt.

*Prognosis.*

*Art. 1918.* Haec facile quidem continua Podagra gignitur: sed nonnumquam longo intervallo temporis intermittitur, tenuis enim est, & in ludis olympicis podagricus morbo sedato, cursu victoriam adeptus est.

Viri facilius in hunc morbum incidunt, & ex mulieribus agiliores, quæ rarius quam viri, & difficilius hoc morbo laborant. *Ætas* huic morbo obnoxia est a quinque annis supra triginta, celerius quoque aut tardius, prout cuiusque natura aut victus ratio postulat.

Atroces sane dolores sunt, sed eos comitantia atrociora; defectus animæ, ad manuum contactum immobilitas, ciborum averfatio, sitis, vigilia. Si discrimen evaserint tanquam ab inferis elapsi laxiorem vitam degunt, incontinentes, simplices, hilari, avari, in victu moles ac delicati, idcirco tanquam mortem rursus subituri licentiose præsentī vita fruuntur.

*Curatio.*

*Art. 1919.* Artuum exacerbationibus hoc sane modo subveniendum est. Lanæ ex ove sordidæ adhibeantur: irrigationes fiant ex rosaceo, & vino; nonnullis & spongia ex posca profuit. Ad hæc cataplasma fiat panis, cum refrigerantibus: puta cucurbita, & cucumere. Accipiantur cucurbita tenuis, plantago herba, & rosarum folia. Sideritis etiam cum pane & musco, & symphyri radix, & pentaphylli herba dolorem sedant. Marrubii decoctum vel infusum dolorem levat. Ex ipsa eadem herba, cum panis micis

aut



aut cum hordei farina cataplasma fit; Malorum quoque citriorum pars non apta cibo, cum lenta magnopere subvenit. Fici item acidi, & amygdalæ cum aliqua farina. Hæc quidem est refrigerationis materia, nonnullis vero calefacientia remedio sunt. Aliud alium juvit, & idem remedium alias aliis opitulatur.

Pervulgatum & hoc ad dolorem tollendum proficere. Capram oportet herba Iride ad satietatem depasci, deinde interposito tempore, quantum ad pabulum in ventriculo conficiendum satis est, capram immolare: atque intra ejus ventrem pedes ægrotantis occulere.

*Sydenhami sententia.*

*Art. 1920.* Podagra, exeunte Januario aut incipiente Februario, derepente, & nulla fere præfensione antecedente ingruit, nisi quod ventriculi cruditate, aut apepsia ad septimanas aliquot æger laboraverit; corporis interim intumescencia quasi ventosa, & gravitate; quæ indies augetur donec tandem detonet paroxysmus; quem paucis diebus præit torpor, & quasi flatuum descensus per femorum carnes cum affectione *σπασμωδῆς*; tum etiam pridie paroxysmi appetitus voracior, non tamen naturalis. Sanus lectu somnoque committitur, hora vero secunda post mediam noctem excitatur a dolore *pollicem pedis* ut plurimum occupante, quandoque vero *calcaneum*, *suram* aut *talum*: hic dolor eum refert, qui ossum dictorum dislocationem comitatur, cum sensu quasi aquæ tantum non frigidaë partis affectæ membranis affusæ. Mox sequitur rigor, cum horrore, & febricitatione aliquali. Dolor autem hic primo remissior gradatim intenditur (pari passu rigor, & horror recedunt) idque in  
fin.

*Podagra  
historia  
accura-  
ta.*

singulis horis donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, se ad varietatem ossiculorum *tarsi* & *metatarsi*, quorum ligamenta obsidet, perbelles accommodans ; nunc tensionem violentam, vel ligamentorum istorum dilacerationem, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram, & coarctationem exprimens : adhuc, ita vivum exquisitumque habet sensum pars affecta, ut nec linteorum superincumbentium pondus, nec cubi- culi a fortiori ambulatione concussionem ferre valeat ; hinc mille conamina, situs tum ipsius corporis, tum membri affecti mutatione assidua, doloris sedationem incassum exambit ; quæ tamen non contingit ante horam secundam tertiamve matutinam ( decurso scilicet *nycthemere* spatio a primo appulsu paroxysmi ) ; quo tempore æger post materiæ peccantis modicam digestionem, & distensionem aliqualem, subito a dolore respirat. Jam leni madore perfusus somno concedit, a quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur, easdemque excitat tragædias ; nonnunquam etiam ambos pedes in initio occupat ; postquam utrumque pedem exercuerit, qui sequuntur paroxysmi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum etiam quoad durationem, hoc tamen ubique servant, quod dolor noctu recrudescat, mane vero remittatur ; atque ex serie horum paroxysmorum constat paroxysmus, qui dicitur podagræ, diuturnior breviorve pro ægri ætate, &c. quod in vegetioribus, & iis, quos podagra rarius invasit, diebus sæpe quatuordecim fit ; in senioribus, atque iis, quos sæpius afflixit, duobus mensibus ; iis vero qui aliquot annis podagrici fuerunt, non prius valedicit, quam ætas adultior eam fugaverit.

Art.



*Art. 1921.* Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, quæ post separationem sedimentum rubrum, & quasi arenulis refertum depōnit; nec æger ut plurimum nisi tertiam portulentorum, quæ assumpsit partem per vesicam reddit, alvus item addictos fere primos dies constipata est. Appetitus prostratio, rigor totius corporis sub vesperam, partium etiam non affectarum gravitas, & molesta sensatio interdum paroxysmum comitantur. Recedentem paroxysmum excipit pedis affecti pruritus vix ferendus, maxime inter digitos, unde decidunt furfures, & pedes ipsi quasi ab epoto veneno desquamantur.

*Paroxysmi  
progressus &  
terminatio.*

*Art. 1922.* Atque hoc modo se habet podagra regularis, cum vero vel indebita medicatione turbetur, vel diuturnior invaserit; jam per annos aliquot phænomena sunt multum diversa a jam descriptis; jam manus, carpos, cubitos, aliasque regiones occupat; quandoque digitos distorquens, motu paulatim privans, tandemque concretiones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam vel oculos cancerorum emulantes, nonnunquam in cubitis tumorem subalbum ciet, fere ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur; nonnunquam femur occupans, sensum exhibet, quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili; at genu exinde petens, id acius urget, artus jam habet æger fere undequaque contractos, & impeditos, ita ut claudicet, & per moleste prorepat.

*Symptomata  
morbis  
post annos  
lali  
quot in-  
festan-  
tis.*

*Art. 1923.* Animadvertendum est, quod ubi quis ad multos annos podagra laboraverit, dolor singulis paroxysmis gradatim imminuitur, tandemque aegritudine potius afficitur, quam dolore; dolor & aegritudo quasi alternatim laceffit; DOLOR IN HOC MORBO EST AMARISSIMUM

*In morbo  
inveterato  
minuitur  
dolor &  
augetur  
aegritudo.*

MUM NATURÆ PHARMACUM, qui, quo vehementior est, eo citius præterlabitur paroxysmus, atque insuper, & longior erit intermissio, & magis perfecta, & vice versa.

Neque  
venese-  
ctio neq;  
cathar-  
sis nul-  
latenus  
prodest.

Art. 1924. In podagricis, quamvis qui educitur sanguis pleuriticorum, & rehumatismo laborantium sanguinem ut plurimum referat; attamen *venesectio* haud minus insigniter in hoc morbo officere ægro, quam in duobus prædictis prodesse cernitur; *catharsis* etiam justissimis de causis damnatur. Tam in hoc, quam in aliis morbis quibuscunque, dempta sola peste, sudores prolicere non tam medici quam naturæ provincia est; ideoque curatio medicamentis *diaphoreticis* incassum tentatur.

Unde  
diffici-  
lius est  
curatu-

Art. 1925. In hoc morbo curando duæ sunt causæ principales præcipue spectandæ, prima est *causa antecedens*, viz. humorum indigestio a caloris & spirituum defectu orta, altera est *causa continens*, viz. humorum calor, & exæstuatio; hæ duæ toto cælo discrepant, atque hinc, quæ huic profint remedia alteri obsint, unde hic affectus tam difficilis est curatu.

Præci-  
pua in-  
dicatio  
curati-  
va.

Art. 1926. Quæ *ventriculum roborant & concoctionem* adjuvant, medicamenta *digestiva* appellata, intentioni adimplendæ conferunt; hujusmodi sunt *radix anglic. enul. campan. & antiscorbutica*, e medicamentis vulgo cognitis *theriaca Andromachi* concoctionibus roborandis præ cæteris confert. Inter simplicia *cortex Peruvianus* primas obtinet, qui sanguinem corroborat vegetumque reddit, si ejus grana aliquot mane, & sero assumantur. Medicamenta *digestiva* modo laudata præcipue in paroxysmorum intervallis; idque longissime a paroxysmo insecuturo in usum revocanda sunt majori cum fructu. Liqueor sequens, utpote qui gustu ac colore jucundus est, auctori

ma-



maxime arridet ; ℞. Rad. sarsaparil. ℥vj. chin. lign. sassaf. ras. C. C. ana ℥ij. glycyrrhiz. ℥j. coq. in aq. font. cong. ij. per hor. dimid. deinde stent claufe super ciner. calid. per hor. 12. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem , cum primum ab igne amoveatur , infund. sem. anis. ℥ss. post hor. ij. coletur liquor , & per residentiam depuretur .

Art. 1927. Tollere nodosam nescit medicina podagram ; exercitatio tamen *tophorum* generationem præscindit, & etiam generatos, & induratos solvit; si cuivis innotesceret medicamentum, quod, & celare vellet, æque efficax in hoc morbo, ut in chronicis plerisque est *equitatio* constans & assidua, opes ille exinde amplissimas facile accumulare posset.

Tophi

Art. 1928. In debilitate, & languore ventriculi aut ventris torminibus neque *vinum gallicum rubrum* vel *theriaca Andromachi*, neque aliud quodlibet e *cardiacis* mihi hætenus notis pares habet vires, ac *vini Canariensis* haustulus subinde deglutitus languore atque ægritudine urgentibus.

Languores.

Art. 1929. Sin autem gravius aliquod symptoma ex retrocessu materiæ podagricæ subito ingruat, & mortem ægro minuetur, neque vino neque exercitio supra laudatis fidendum est, verum: modo non caput, at partes vel naturales, vel vitales ejusmodi malum impetat, ad *laudanum* cum *cardiacis* permistis statim confugiendum. Signum *retrocessionis* materiæ Arthriticæ, ægritudo ingens cum vomitione, & aliquali ventris dolore; in hoc casu congium unum *liquoris passetici*, vel alicujus istiusmodi devoro, & cum totum per vomitionem rejecerim, tum ebibo haustum *vin. Canarin.* cum *laudan. liquid.* gr. xvij. in lecto ad quietem me componens.

Arthritidis retrocessio.

Schedul. menit. p. 120.

Art.

Diarrhoea.

Art. 1930. Ad diarrhoeam, si *laudano* non obtemperet, unicum remedium est, ut *sudor* provocetur methodo & medicamentis huic usui destinatis; quod si fiat ad biduum triduumve per duas tresve horas continuas, sistetur ut plurimum diarrhoea, & morbi fomes magna vi in artus detonabit.

Peripneumonia.

Art. 1931. Metastasis materiae peccantis in pulmonum lobos pari modo tractanda est, quo peripneumonia absoluta, viz. *venesectione*, &c.

Nephritis.

Art. 1932. Si podagricis superveniat *nephritis* (quod saepissime accidit) posthabitis aliis bibat æger magna copia *liquor. posset.* cui *radix* (& *fol. alth. & malv.*) incoct. sunt. Et injiciatur *enema*, & postremo exhibeatur *laudani* dosis grandior.

Therapia radicalis ad huc desideratur.

Art. 1933. Therapia *radicalis* podagræ adhuc in *Democriti* puteo latet: neque temere curanda est arthritis; quid enim est nisi naturæ providentia ad depurandum senum sanguinem, atque expurgandum corporis profundum, ut cum *Hippocrate* loquamur.

### Listeri sententia.

Arthritidis causa.

Art. 1934. Ductus humori pituitoso in artubus excernendo dicati, aliquo modo labefactati, i. e. vel laxati ab improbo aliquo exercitio, maxime a cibo, ex nimia Venere, a qua tot motus articularum convulsivi, ex frequenti usu vini, &c. quibus iidem ductus vehementer resolvuntur; vel ex naturali quadam imbecillitate, qua contractioni impares sunt; vel obstructi ex aliqua longa hæmorrhagia, ex crapula & otio, humor ille ex crudo jam & lento fero confectus, in ductibus articularum excretoriis moram trahendo, facile putredinem & acrimoniam concipit, & ichorosus tandem fit; ipsa denique ossa



ossa rodendo, illa in tophos dissolvere potis est; quod satis constat ex ossibus cariosis vermiculato quodam opere profunde insculptis. Unde primum atrox dolor: nempe a continua distensione & dilatatione ductuum, a corrumpente humore, ex nativa autem partium istarum conformatione dolor acerbior evadit: atque hinc illi sensus strictionis infinitæ, compressionis, ponderis, caloris urentis, lancinationis, punctio-num, rosionum, ut humor putrescens in angustis & vix dilatabilibus ductibus impactus viam sibi faciat.

*Art. 1935.* Ad dolorem mitigandum sequens *Ad do-*  
cataplasma præscripti; ℞. *Mic. panis siliginei ex loreme*  
*lacte coct. ℥j. croci ℥ss. aloes succotrin. ad pulv. sicc. sitim in*  
*& friabilem ustulat. ℥iij. ol. lilior. q. s. m. f. cata- arthri-*  
*plasm. & alio paroxysmo atroci Emplast. viride tide la-*  
*Glyconis apud Scribonium Largum descriptum ad boranti-*  
hibui non minori cum successu; ℞. *Æris ust. bus.*  
*æugin. ana ℥vj. sal. gem. gum. ammoniac. thur. ana*  
*℥ss. aristol. rotund. ℥j. alum. ℥ss. myrrh. galban. aloec.*  
*ana ℥j. ceræ ℥ij. terebinth. chia ℥i℥. ol. ℥ij. m. f. s. a.*  
*empl.* Decursu morbi ad sitim leniendam con-  
venit hujusmodi *aq. limac. ad. ℥vj. ter. in die;* ℞.  
*Cochlearum hortens. NM. ℥j. lact. recent. ℥xij. cau-*  
te distillantur evitando empyreuma ad medias.  
Sing. ℥j. adde *succ. limon. matur. ℥ss. sacchar.*  
*cand. q. s.*

*Art. 1936.* Unica illa aurea regula de absti- *Quantū*  
nentia mihi certe maxime arridet; nempe ut *valer*  
iis, quibus aut integra sanitas, aut longiora va- *abstinen-*  
letudinis bonæ intervalla cordi sunt, PARVA *ria.*  
CIBATIO SUMMÆ CURÆ SIT: atque  
hoc omnibus hominibus, quocunque statu &  
conditione sint cum ipsius quoque EXERCI-  
TII loco esse potest, etiam *pedibus ex toto ca-*  
*ptis.*

## Ettmulleri Sententia.

*Signa  
arthritis  
dis ap-  
propin-  
quantis  
& sym-  
ptomata  
presen-  
tis.* Art. 1937. Arthritis fere per paroxysmos affligere solet, extra quos, nisi in inveterato malo, satis commode habent ægri; quoties imminet paroxysmus, alvus fere segnior evadit, ægri molestiam quandam haud bene explicabilem circa præcordia sentiunt, consuetum excrementum intra pedum digitos non reperitur, & circa articulos tensio percipitur, hinc dolor pungens, lacerans & pulsans, interdum ardens in Arthritide calida dicta, in hoc symptomata sunt acriora, sed breviores sunt paroxysmi; in frigida tumor plus minus oedematofus, nec nisi post longum tempus evanescens; in incremento paroxysmi conqueruntur ægri de æstu circa regionem stomachi, hinc sitis, & appetitus prostratus. Hæc fere ipsa symptomata in dolore ischiadico occurrunt; si crebrius redeant paroxysmi, & vehementius affligant, insigniter debilitantur articuli. *Bacchus dicitur pater, Venus mater, & Ira obstetrix Arthritidis.*

*Qualia  
remedia  
utiliter  
usurpantur.* Art. 1938. Ingruente podagra convenit vomitus, & forsan blanda purgatio, quæ omnino vitanda est in statu morbi. Opiata nunquam fere sunt proficua, malum contumacius reddunt, & motum naturæ impediunt. Optime conducunt fixa acida absorbentia, volatilia, &c. Venesectio minus convenit, nisi in ischiadico dolore, in principio paroxysmi, decoctum e lignis. Spiritus cochlear. trifolium palustre, &c. laudatur. Topica, non nisi præmissis universalibus, locum habent, narcotica fugienda sunt; symptomata adjuncta sunt considerata, ardor, dolor, tumor, &c. Topica non nisi in statu morbi sunt applicanda, laudatur sp. lumbricorum cum campho-



phora, sale armoniaco, &c. sp. theriacalis camphorat. misturæ ex calce viv. & sal. armoniac. affundatur sp. vini, & huic distillato adde camphoram, & sic optimum habetur specificum in inflammationibus podagræ. Flores sambuci in lacte cocti dolorem leniunt. Caro bubula sine pinguedine mane, & sero mutata dolorem compefcit, & omnibus præfertur; item stercus bubulum cum urina humana putrefacta, in qua calx viva extincta est; Sapo Venetus in spiritu vini solutus cum additione olei juniperi & petrolei insigne facit unguentum.

Art. 1939. Vesicatoria in malo ischiadico multum conducunt. Ad tophos, caseus vetus & putridus cum decoct. suille est proficuus. In malo ischiadico omnibus encomiis dignum est Poterii emplast. de pice sulphuratum; ℞. Pic. naval. ℥iv. terebinth. ven. ℥ss. mastich. succin. ana ℥ij. sulphur. commun. ℥ss. m. f. empl.

### Pitcarnii sententia.

Art. 1940. In Arthritide nihil ages urgendo pharmaca purgantia; vomitoria profunt, post illa mercurius sensim datus. Parti dolenti applicare licet balsamum Guidonis, aut lintea liquore sequenti madentia; ℞. Aq. font. fervent. ℔viii. arsenic. alb. vel flav. ℥ij. calcis viv. ℥vj. digere per hor. 24. lento igne. (Sed de ejus usu incidit mihi suspicio.) Si dolor accedat in ventriculo, utere N. M. condit. pulv. rad. saraparil. cort. Peruv. ol. cinnamom. zinzib. condit. &c. Proderit etiam in podagra decoct. sequens ℞. Vin. alb. vel. cerevis. ℔viii. lact. fervent. ℔iv. ablato coagulo immitte bacc. oxyacanth. ℔j. coq. per hor. dimid. bibat æger ℔j. mane, & vesperi.

*Musgraviæ sententia.*

*Sedes ar-  
thritidis  
Propria  
in artu-  
bus.*

*Art. 1941.* Sedes Arthritidis propria, & exo-  
ptatissima est in artubus, non in trunco corpo-  
ris, posteriori autem casu, non priori mortem  
minatur: „ quid agendum sit, brevi comprehen-  
ditur in divini *Hippocratis* effato, nimirum,  
„ revellenda ea, quæ, quo non oportet, repunt;  
„ sin autem quo convenit, iis viam sternere o-  
portet, ut singula eo vergant. “ Quando re-  
cessus fiat miasmatis Arthritici in partem aliquam  
internam, morbum istius partis adeo exquisite  
imitatur, ut de existentia ipsius minime consta-  
ret, nisi Arthritis regularis præcesserit.

*Indicatio  
generalis  
in arthri-  
tide ano-  
mala.*

*Art. 1942.* Medendi indicatio generalis est, ut  
Arthritide anomala pars affecta quam citissime,  
quam tutissime levetur; accurate itaque perpen-  
so morbi genio, juxta partem, quam occupat,  
& factis necessariis evacuationibus, optime felicif-  
simeque curatio perficitur per materiæ in artus  
translationem; hoc enim est ipsum naturæ pro-  
positum. Medicamenta huic intentioni inservien-  
tia interna, expellentia dicta, sunt plerumque  
cardiaca, quæ satis nota sunt; ad extrudendam  
autem Arthritidem nihil potentius & efficacius in-  
venitur quam *chalybs nutritus* ( præparationem  
videtis apud auctorem. ) Topica, quæ Arthriti-  
dem artubus invitant, sunt emplastra ex *gum.*  
*caran.* vel *oxyc.* vel *cephal.* cum *pice Burgun.* dimid.  
vel *triente*, vel *ceratum viride* vulgo *Hatcase*,  
& si vires ægriferant, & res in dubio versetur,  
*Phœnigm.* seq. *℥. Ferm. vet. part. ij. sem. sinap.*  
*raph. sylv. alii, cacumin. rut. sim. columb. ana p. j.*  
*contunde cum aceto vin. alb. q. s. & redige ad spis-*  
*situdinem cataplasmat.*

*Arthritis Art. 1943.* Si Arthritis ventriculum occupet,  
ibi-



ibique commoretur, indicatur lenē *emeticum* ex in ven-  
decocto *fol. thea viridis*, vel *cardui benedicti*, *triculo*.  
vel ex *sale vitrioli*; & finita operatione, *pare-*  
*goricum*; convenit etiam interdum *catharsis*, &  
demum Arthritis in artus omni vi depellenda  
est, ut ante ostensum est.

Art. 1944. In colica Arthritica propinari de- *Colica*  
bet *catharticum* huic morbo idoneum, & tunc *arthri-*  
*podagram expellentibus*, una cum *anticolicis*, *tica*.  
utendum est; *fotus* etiam & *linimenta* suum ha-  
bent locum; sed (quod maximi est momenti) *Nota bene*  
probe animadvertendum est, & recordandum,  
quod *vana & frustra arthritidis regularis in ar-*  
*tubus excitanda sit spes omnis, quamdiu intestina*  
*fuerint immunda, facibusque onerata.*

Art. 1945. In diarrhæa vel dysenteria arthri- *Diarr-*  
ca *laudano* sensim cohibendus est fluxus, & po- *rhæa*.  
stea expellendus est cum cautela inimicus.

Art. 1946. In paroxysmo arthritico, & ne- *Nephri-*  
phritico simul *paregorica* sunt necessaria: *adeps tis*.  
*cuniculi* externe inuncti. *dolorem mirifice lenit ex*  
*senis calculosi experimento.*

Art. 1947. In asthmate arthritico Cura variè *Asthma*  
instituenda est pro diversitate morbi vel *sicci* vel  
*humidi*; arthritis (si fieri possit) in artubus ex-  
citanda est; interim in spirandi difficultatibus o-  
mnium maxime certissimeque inflationem mirum  
in modum cicurat compescitque *potio Coffee*.

Art. 1948. In angina arthritica plurimum va- *Angina*  
let sequens gargarisma; ℞. *Aq. bord. ℞j. diamor.*  
*℞ij. sp. sulph. per camp. quantum lingua ferre poterit.*  
*m. nihil vero pulvere sequenti præstantius effi-*  
*caciulve novi; ℞. Cryst. min. sacch. crystal. ana*  
*p. & misce, teneatur in ore ℞j. donec saliva abun-*  
*daverit, tunc expuatur, & repetatur frequentissi-*  
*me, mirum quantum hinc saliva, &c.*

Art. 1949. „ In pleuritide, peripneumonia & *Pleuris*

*risperi-  
pneumo-  
nia, &c.*

„ angina arthritica non novi præstantius reme-  
„ dium, quam infusum vel decoctum *stercoris*  
„ *equini*; est etenim medicamentum non modo  
„ iis affectibus primario proficuum, sed etiam  
„ arthritidis in artus expulso fortissimus; ex-  
„ pertus loquor. “

*Arthri-  
tis caput  
petens.*

*Art. 1950.* Arthritis caput petens, varios ac-  
periculosos producit affectus, cephalalgiam, ver-  
tiginem, apoplexiam, convulsiones, paralytin,  
&c. in his affectibus cerebrum quam citissime  
allevetur *evacuatione, revulsione, & in artus a-*  
*mandatione*; in huiusmodi casibus ægrotantium  
pedes in *aquam fontan. fervidam* immitti curo,  
ibidemque ad tempus detineri, unde capi juva-  
men præsentaneum obtineatur.

*Consu-  
lendus  
est au-  
thor.*

*Art. 1951.* „ Si doctissimum auctorem inspi-  
„ cere haud graveris, ille tibi plura amplissime  
„ suppeditabit de arthritidis anomalæ ætiologia,  
„ & curatione.

### *Farrago sententiarum.*

*Tempe-  
rantia.*

*Art. 1952.* Omnia remedia calculosis, & po-  
dagricis præscripta inutilia propemodum erunt,  
nisi *vinum, Venus, otium, & crapula* temperan-  
tius usurpentur.

*Dieta  
lacteæ.*

*Art. 1953.* Novi quosdam insigne levamen ac-  
cepisse ex *dieta lactea* per tres aut quatuor men-  
ses sine ullo alio alimento: alios vero ex *lactis*  
usu deterius habuisse, viscerum obstructions con-  
traxisse; ideoque sine prudentis medici consilio  
utrum conveniat, necne, haud temere ineatur.  
*Villis.*

*Art. 1954.* Cum ego olim articulorum dolori-  
bus vexaret (inquit *Sennertus*.) & varios de ea  
re authores legerem; in eo omnes consentire ani-  
madverti, in arthritidis curatione, plus spei in  
*bona*,



*bona dieta*, quam in medicamentis ponendum esse.

*Art. 1954.* Summarium præscripti celeberrimi D. B. pro Nobili quodam Anglicano ad *arthritidem eradicandam* hujusmodi fuit.

— Lac novum cum duplici aqua commista repudiatis aliis quocunque liquoribus solummodo ad potandum concedendum est; utcunque tamen *coffee* & *thea* modica quantitate interdum permitenda sunt, his vero sorbitionibus lac semper conjungendum est. Mane cum primum expergiscaris, coctionibus plene ac perfecte absolutis, libram aquæ fontanæ bibas, suadeo; & deinde elapsis duabus horis ad jentaculum accedas; cui sufficiat lac coctum addito exiguo pane, jusculum avenaceum, cum vel sine lacte; interdum *coffee*, *thea*, vel *chocolata* cum lacte temperata, panis butyratus, &c. Prandionihil edendum est, nisi ex avenis, hordeo, oryza vel seminibus milii paratum fuerit, radices dauci vel raparum, spinachia, fabæ vel pisæ, &c. admitti possunt in victum; quinetiam fructibus vesci, cum maturi sint, non interdico; pyra vel mala furno cocta inter edilia minime contemnenda recenseantur; sed præ reliquis panem biscoctum, cum lacte commendo; aliquando sed rarius de piscibus non salitis modicum comedere licebit. Acida & salsa vitanda sunt. Cœna sit lac & panis. Hora 9. vespertina, vel citius cubitum eundum est. Somno indulgeas; quanto enim plus somni capis eo melius tibi cessurum est. Frictio sicca artuum mane, & vesperi repetita plurimum valet: Humores enim dissipat, & nodorum ac tophorum generationem prohibet: Exercitium inter primaria auxilia pono, equitatio licet potior sit quam curru vehi, ambo tamen utilia sunt, & in eorum frequenti usu esse debes. Inter exercendum

solummodo caveas, ne aeri frigido ac humido te ipsum nimium exponas. Si denique his non obstantibus arthritis insultum faciat, & cum vehementia desævierit, quod vix credibile est, interdum dosin laudani exhiberi, parca licet manu, & non nisi premente necessitate, concedimus. Transitus a communi vivendi more ad hoc vitæ genus est tutissimus, neque est quod extimescas a subitanea mutatione: sed hoc semel instituto in eo usque ad vitæ terminum persistendum est; nam reditus ad luxum, & liberam vivendi consuetudinem periculo haud vacaret. Arthritis hæreditaria perinde ac adventitia huic regimini cedit: labes etenim morbi in gremio sanguinis latitat, & in utroque genere hujusmodi victu facillime exterminabitur. Amplexibus veneris ne nimis obedientem te geras, concubitus illicitos omnino fugias, &c.

*Remedium celebre.* Art. 1956. Perquam celebre fuit præscriptum sequens aliquando apud Londinenses. ℞. Rad. turbith. hermodact. jalap. tartar. vitriolat. anagr. xv. m. f. pulv. in haust. vin. alb. sumendus singulis mensibus. In eundem etiam usum electuarium caryocostinum a quibusdam valde prædicatur. Ast omnium vomitus podagræ est prophylacticum præstantissimum, qui potest provocari emeticorum ope in insigni humorum colluvie, ubi juncturæ admodum laxæ, & morbus præ foribus est. Atqui Podagricus est vi sui arbitrii, præceptis non auscultat, sed genio in valetudinis incommodum plerumque indulget.

*Ad nauseam ventriculis.* Art. 1957. Ad nauseam ventriculi in hoc morbo frequentem non datur præstantius remedium quam vinum Canariense radice zedoariæ medicatum. Tinctura corallii specificum audit.

Art. 1958. Singularis est ista clarissimi Verulamii methodus. ℞. Mic. panis albißim. ℥iij. coq. in



in lacte recent. Sub finem add. flor. ros. rub. ℥℥.  
 croc. ℥℥. ol. ros. ℥j. m. f. cataplasma parti affectæ  
 applicand. sub tepide post horas tres amoveatur,  
 & usurpetur fons sequens per horæ quadrantem  
 cum coccineo panno vel lana ejusdem coloris;  
 ℥℥. Fol. salvia mis. rad. cicur. ℥vj. brion. ℥℥. fol.  
 ros. rub. p. ij. coq. in aq. font. in qua chalybs can-  
 dens sæpius extinctus fuerit ℥iv. Ad ℥ij. cola-  
 turæ add. sal. marin. mis. statim post usum fons  
 applicetur emplastr. diacalcit. cum ol. ros. malaxat.  
*Baconis hist. nat.*, In podagra unicum commen-  
 damus topicum ( inquit Dolens ) ; repellentia singula  
 vero in hoc affectu non magni facimus, quia  
 inde plus damni quam commodi experti su-  
 mus. Sequens vero pro arcano hic in solatium  
 podagricorum communicare volumus, quod  
 nunquam te frustrabit effectu, modo in tem-  
 pore adhibeas; mille enim experiētiis est com-  
 probatum, quod extrahat dolores podagricos  
 non repellendo eosdem, sed morbifidam ma-  
 teriam extrahendo, resolvendo, & discutiendo.  
 Quandoquidem primordia sunt ut plurimum  
 ab aciditate hostili, ad corporis ambitum de-  
 lata, & artus molestante; unde podagræ cha-  
 racter digestionem afficit. ℥℥. Confect. hamech.  
 ℥j. pulv. jalap. ℥℥. extract. trifol. fibrin. ℥ij. li-  
 tharg. aur. ℥vj. sapa antimon. ℥℥. sacchar. canth.  
 ℥vj. ol. olivar. q. s. cere & picis parum f. s. a. empla-  
 strum, quod imponatur artubus dolorificis quam-  
 vis inflammatis, & relinquant, donec dolores,  
 & humores evanuerint, quod mire præstat.

*Art. 1959.* Remedia sequentia interdum pro re  
 nata in usum adduci possunt; allium conditum, varia.  
 aq. omnium florum, aurum mosaicum, balsamum  
 Rhamelii; cinnab. antimonii, electuarium caryo-  
 costinum, empl. pleuriticum, empl. smecticum, epi-  
 thema saponaceum, expressio millepedum. Flores

*salis armoniaci martiati, fœtus podagricus, gum. guajac. mistura balsamica, rob. Sambuci fere specificum.*

## I S C H I A S :

*Cœlii Aureliani sententia.*

*Accurata morbi historia.*

*Art. 952.* Dolor Ischiadicus nunc ex manifestis, nunc ex occultis causis generatur, ut susceptione frigoris, terrena cubatione, casu aut repentino percussu, vel luxatione; venere immodica, vel morbo aliquo prægresso. Adest primo membri affecti gravedo, & difficilis motus cum levitopore ac fornicatione, in quibusdam cum vehementi, pungenti, ac fervido dolore, & ad sensum patientis tanquam serpentis convoluti motu; interdum etiam adest febris, ut se in lecto continere non valeant ægrotantes; dolor in vertebro sentitur, dehinc in articulationes partium vicinarum penetrans, ad poplitem pertingens atque suram, dehinc etiam ad talum, & pedis summitatem: progressu temporis fit cruris totius extenuatio cum debilitate, & ejusdem abbreviatio, & miserrima claudicatio; quidam ambulant, capitibus digitorum gradientes, alii antrosum, alii extrosum: &c. Loci principaliter affecti sunt periosteum, & musculorum capita sive insertiones; aliquando in abscessum tendit. Si quis velit, consulat authorem de curatione.

*Art. 1961.* „ Methodus medendi hunc morbum satis contumacem D. Cheynei ex suggestione præclari Pitcarnii sic se habet; Sumat æger pro virium sufficientia, & ventriculi tolerantia *spiritus æther. terebinth. a ℥j. ad ℥ij. vel ℥ss. cum triplici quantitate mellis purissimi*

„ quos



„ quotidie mane jejuno ventriculo ad 4. vel 6. vel  
 „ ad summum 8. vices Superbibendo haust. ij. vel  
 „ iij. ser. lact. cum vin. Canarin. alterati. Inter-  
 „ mitti potest ad diem unam aut alteram, si  
 „ nauseam pariat; diebus, quibus spiritum as-  
 „ sumperit, hora decubitus capiat dosin *Pil.*  
 „ *Matthai*. Spiritus *Ætherens* est ille, qui in  
 „ distillatione inter spiritum, & oleum prodit.  
 „ Hæc methodus doloris vehementiam ( inquit  
 „ author ) *infallibiliter* aufert manente solum-  
 „ modo artus quadam debilitate. Et ut reliquæ  
 „ penitus eliminentur exhibenda est dosis *florum*  
 „ *sulphuris* in lacte ad tempus bis in die.

*Medici Sententia.*

*Art. 1962.* Ex omnibus articulorum doloribus *Ischias*  
 sævissimus est, quem Græci *Ischiada* appellant, *post lon-*  
 quod coxas prehendit; eoque difficilior est; quod *gos mor-*  
 fere post longos morbos, vi pestifera huc se in- *bos.*  
 clinante, hanc partem corripit. Malum hoc,  
 ubi inveteravit, femur cum crure debilitat, &  
 æger claudicat; interdum etiam femoris caput  
 extra coxam elabitur, & femur ipsum protinus  
 contabescit.

*Art. 1963.* Non multum hic juvant cucurbi- *Reme-*  
 tulæ, aut vesicatoria parti imposita; alius enim *dia non-*  
 membranis, os circumcingentibus inflexus hæret *nulla*  
 molestus humor, quam ut his extrahi possit. *efficacie-*  
 Efficacius est Epithema volatile dictum: aut Em- *ra.*  
 plastrum ex Pice Burgundica addita Euphorbii  
 octava circiter parte, cum terebinthina Veneta  
 quantum satis erit, compositum.

Nihil autem tantum levamen affert in perti-  
 naci præsertim morbo; ac setaceum sub locum  
 affectum, ut materia inutilis evocetur, immis-  
 sum. Sin autem vulnus ejusmodi minus necessa-  
 rium

rium videatur, aut nimis acerbum; fonticulum saltem in femoris dolentis parte interna supra genu medicamento caustico inurere maxime ex usu erit; ita tamen ut ulcus id non sanetur, sed diu trahatur, donec id vitium, cui per hoc opitulatur, conquiescat. *Celsus* Hippocratis exemplum sequutus, candentibus ferramentis, tribus, aut quatuor locis super coxam, cutem exulcerare præcepit. Qua quidem medicina nulla foret efficacior; utcumque enim temeretur ignis aspectus, breviori cum dolore, quam infert medicamentum causticum, peragi posset.

Fricatione quoque utendum est, & eodem die sæpius, quo facilius ea, quæ coeundo nocuerunt, digerantur; ipsisque præcipue coxis, si fieri possit, adhibenda est. Aqua autem calida partem affectam fovere plerumque nocet; fibris enim illa relaxatis, augetur dolor.

*Remedia interna.* Art. 1964. Sed ad interna auxilia transeundum est. Horum præcipuum, detracto primum sanguine, est purgatio per alvum. Catharticonum potentissimum est, aut mercurius dulcis sexies sublimatus, aut Electuarium e scammonio; quod pro viribus sæpe repetere convenit. Diebus autem quibus non exinanitur corpus, per ea, quæ simul urinam cient, & alvum movent, morbi vis minuenda est. Ex his Tincturam guajacinam volatilem, vel balsamum Guajacinum omnibus præpono.

### Farrago sententiarum.

*Ischiadis ingressus.* Art. 1965. Ischiadis quidem a femore posterius, aut poplite, aut tibia initium est; Alias vero in coxæ cavo, ( *Cotylam* græci, latini acetabulum vocant ) dolor apparet, rursus in clunem, aut lumbos impetum facit, & omnia potius



ius esse videtur, quam coxendicis morbus. Ea-  
que vero parte æger plerumque claudus rema-  
net. *Aretæus*.

*Art. 1966.* Ad hunc morbum specialius con- *Clysteriæ*  
ferre consueverunt clysteres injecti ex decocto *utilitas.*  
centaurii minoris, ut *Fernelius* testatur, vel ex  
decocto bryoniæ, aut colocynthidis, nec non  
rutæ, salviæ, stæchados, betonicæ, hyperici,  
rorismarini, baccarum juniperi, lauri, ivæ ar-  
theticæ, meliloti, chamæmeli, itemque ex vino  
albo veteri, sapa, urina pueri, quousque sanguis  
cum mucosis excrementis egeratur.

*Art. 1967.* *Prosper Martianus* observat dolo- *Ischia-*  
res ad Ischium aliam exigere curationem, qui *dis mo-*  
huc illucque vagantur, aliam vero qui fixi sta- *bilis &*  
bilesque sunt. Hippocrates, ait, diversam in *fixa cu-*  
utrisque medendi rationem instituisse. Fixos enim *ratio.*  
dolores clysteribus acerrimis abigere conatur,  
emollientibus vero qui mobiles sunt; in illis  
item motum, ustionemque adhibet, at neutrum  
in his approbat.

*Art. 1968.* Si alia non proficiant, ad causti- *Causti-*  
cum deveniendum est; ipse uti soleo *foliis ra-*  
*nunculi* vel mixtura calcis vivæ & saponis liquidæ *cum.*  
quæ summopere confert. *Baglivus*. Folia ra-  
nunculi (inquit *Ettmullerus*) contusa & regio-  
ni lumbari applicata per 6. horas, donec vesicæ  
excitent, quæ discussæ pro more suo emittunt  
serum acre, Ischiadicum dolorem penitus tollunt  
& morbum subigunt, Applicatio foliorum ra-  
nunculi flammæ minoris facta fuit paulo infra  
genu a circumforaneo quodam, ut ipse observavi  
plusquam triginta abhinc annis cum successu mi-  
rabili: Ego quoque plus semel idem experimen-  
tum compertum habui.

*Art.* Radix Brion. alb. recens tusa & cum  
ol. sem. lini mixta, & loco dolenti tepide appli-  
cata

ſata mirum in modum dolorem pacat ; & renovandus eſt labor , donec tota materia morbifica tranſudetur . *Tachenius de morborum principiis* . Laudatur *emplaſtr. Poterii* . „ *Emplaſtrum ſequens in praxi expertus ſum. ꝯ. Pic. Burgund. q. ſ. malaxetur cum q. ſ. ol. ſem. ſinap. per* „ *expreſſionem. Emplaſtrum Iſchiat.* quoque applicari poteſt. “

*Colocynthis.*

*Art. 1969. Colocynthis clyſteribus indita privationem coxedicum doloribus prodeſt. Liſter. Interna eadem ac in podagra.*

## L U E S V E N E R E A :

*Etmulleri ſententia .*

*Lues Venerea.*

*Symptomata varia.*

*Art. 1970. Innotuit huic morbus Europæis non niſi circa annum 1494. Controvertitur , an veteribus cognitus fuerit ; necne . Primo poſt impurum coitum plerumque exoriuntur, inflammatio præputii & tumor, urinæ ardor, gonorrhœa, bubones in inguinibus, puſtulæ variæ in pene, & aliis partibus, atque hinc ulcera ſordida, & maligna, cancroſa & calloſa, progreſſu temporis etiam oſſa corrodentia, dolores atrociffimi noctu exacerbantes, nodi, tophi, calor in volis manuum, & plantis pedum, atque hinc fiſſuræ, & excoriationes, verrucæ, condylomata, &c. circa anum, pilorum deſluviū, maculæ rubefcentes, flaveſcentes, aut liveſcentes. Inflammatio teſtium, raucedo, uvulæ relaxatio & eroſio, palati ulcus, ozæna, tinnitus aurium, ſurditas, cæcita, ſcabies, tabes, &c. Sed hæc ſymptomata omnia non cuivis contingunt; non raro ſub larva ſcorbuti & arthritidis latitat. Ægri ut plurimum rem cum infectis ſe habuiſſe conſtanter negant.*

*Art.*



*Art. 1971.* Paulo post congressum impurum *Morbis*  
circa penem aut vulvam æstus exoritur, aut ar- *varie*  
dor urinæ, hinc inter biduum aut triduum go- *incipit.*  
norrhœa; interdum nulla succedit gonorrhœa,  
sed virus per cutem potius ad inguina fertur,  
& bubones excitat; contingunt etiam quandoque  
ulcera callosa in scroto ac perinæo; interdum  
ulcus cancrosum ac callosum inter præputium,  
& glandem; in quibusdam intumescunt testes.  
Sanguis missus in lue inveterata fere maculis li-  
vidis aut colore quasi cœrulescente in superficie  
conspici solet. „ In lue confirmata ( ut recte ob-  
„ servavit *Lommius*) erumpunt maculæ frequen- *Macula*  
„ tes, eæque more lentiginis exiguæ, alias ru- *ac pu-*  
„ bræ, alias flavæ; in fronte quoque & tempo- *stula.*  
„ ribus & pone aures, maxime circa radices  
„ capillorum, dein in capite, vel etiam universo  
„ corpore, malignæ pustulæ, tumoresque non  
„ unius coloris efflorescunt, quæ sponte sa-  
„ nantur, iterumque passim expullulant: pustulæ  
„ modo flavæ, modo rubræ sunt, rotundæ o-  
„ mnes, siccæ, puris expertes, & aridam cru-  
„ stam habent; ex his deinde in ambitum ser-  
„ pentibus pustulis, cutemque cavantibus, ulcus  
„ oritur virulentum & sordidum. “

*Art. 1972.* Galli facilius salivant, & citius cu- *Curatio*  
rantur quam Germani. Inter *sudorifera* eminent *genera-*  
*guajacum* & *sarsaparilla*, & regula semper ob- *lis.*  
servanda est in *frigidis* guajacum, *calidis* sar-  
saparilla; decoctis *sudoriferis* non incommode  
addatur *antimon. crud.* In inunctione mercuriali  
tutius procedunt, qui artuum flexuras, inguina &  
alas sufficienter fricant; abdomen, pectus, &  
caput non inungenda, aut rarissime.

*Art. 1973.* In gonorrhœa effluit humor cum *Gonorr-*  
acerbo dolore a locis circa penis radicem, ubi *rhœa.*  
sunt prostatae, primo *feminalis* aquosus liquor,  
qui

qui hinc successive flavescit, tum magis acrescit, tandem viridescit, aut cœrulescit, non raro graviter foetet; urina cum acerbo dolore mittitur; supervenit tumor præputii & glandis, & ulcus. *Curatio.* scula, interdum carunculæ in urethra. Præter cathartica mercurialia convenit privatim emulsio ex sem. cannabis viridis parata, os sepie, terebinthina, saccharum Saturni, &c. multum laudatur mercurius precipitatus viridis, & mercur. dulc. balsam. Saturni terebinthinatum, ex sacchar. Saturni & ol. terebinth. blando igne paratum, egregie conducit, ubi ardor nimius circa testes, & genitalia, ut & camphora; item infusum cantharidum in vino, quod expertum est remedium medici cujusdam Belgie. ℞. Pulv. cantharid. ℥j. infund. in vin. Rhenan. ℥iij. vel iv. infusum stet per aliquot dies in loco tepido, & postea filtretur liquor, usus tempore misceantur coch. vi. vij. vel viij. cum cantharo vini, &c. Resina ligni guajaci, balsam. de Copaibe, specificum habetur, antimonium diaphoretic. bezoardic. minerale, aqua simplex in qua argentum vivum incoctum fuerit. Injunctio. ℞. Aq. calc. viv. ℥iv. mercur. dulc. ℥β. sacchar. Saturni. ℥j. m. pro injectione. Usurpetur liquor per residuum depuratus.

### Digressio de Gonorrhœis non virulentis .

*Gonorrhœa vera non virulenta.* Art. 1974. Gonorrhœa vera est, in qua semen verum effluit. Succus citri, granator. limon. &c. sunt remedia optima, venerem extinguunt, præcipue si camph. & terebin. in usum adhibeantur, ut & emulsio cum sem. cannabin. sacch. Saturni. os sepie (specificum) cum ceruss. antimonii, balsam. copaiv. extract. rad. tormentil. vel ejus decoct. Lenis purgatio cum bolo mercuriali, & die seq. rhabar. externe foetus astringentes, &c.

Art.



*Art. 1975.* Gonorrhœa *notha, benigna dicta*, *Gonorrhœa.* non *virulenta*, est quando materia, non semen verum continuo effluit ex pene citra tentiginem aut pruritum venereum, diu durans sine multa virium prostratione, *fluori albo* mulierum respondens; gonorrhœa *catarrhalis* vocari solet. Partes affectæ sunt glandulæ prostaticæ, nimis laxæ vel exulceratæ.

*Art. 1976.* Cura debet institui generalis, *di-Curatio.* gestio rectificanda, stomachus roborandus, cruditas corrigenda, pars affecta astringentibus firmanda. Est affectus *catarrhalis* ideo rosmarinus, decoct. e lignis; acidulæ prosunt; interdum a scorbuto pendet. Non nimis cito supprimenda est hæc gonorrhœa. Ad maiorem cautelam aperiendus est *fonticulus* in crure.

*Art. 1977.* Ulcuscula glandis, & præputii curantur cum unguento *diapomphol.* & *mercurio dul-* *Ulcera*  
*ci*; si fuerint cancroso, & callosa in usum ve- *glandis,*  
nit solutio *mercur. sublim. corrosiv.* in *aq. plantag.* *&c.*  
Si præputium insigniter tumet, & inflammatur, applicetur solutio *sacchar. Saturn.* in *aq. calcis*, item *camphora* in *ol. amygd. dulc.* soluta.

*Art. 1978.* In mulieribus exulcerantur partes *Ulcera*  
internæ vaginæ, & saniem plorant plus minus *vaginæ.*  
purulentam ac lividam, cum insigni dolore ac molestia; nec multo diversam a virorum postulant medelam.

*Art. 1979.* Pro pustulis & tuberculis lac vir- *Pustula.*  
ginale.

*Art. 1980.* Ad ulcera sananda unguent. *basil.* *Ulcera.*  
cum *mercur. dulc.*

*Art. 1981.* Ulcera oris & palati curantur cum *Oris &*  
gargaris. ex decoct. *lign. cum melle ros.* & *pauco* *palati*  
*alumine.* *Ozæna* decoct. *emol. hord. alth. &c.* pri- *ulcera.*  
mo tractanda est ad removendam crustam, & *Ozæna.*  
postea decoct. e *lignis*, &c. tanquam palati ul-  
cera.

cera. Omnia hæc ulcera sub *litu mercuriali* spon-  
te evanescent, nec metuenda sunt ulcera oris;  
nam per *salivationem* citius sanantur.

*Bubones.* Art. 1982. Bubonum suppurationi, & apertio-  
ni pro elicienda virulentia, mature operanda  
est, interne *sudorifera* exhibenda sunt, externe  
*suppurantia*, quin & *cucurbitæ*, & si secundum  
votum haud succedant, aperiantur, *lanceola* pro-  
fundius intrusa.

*Quot modis contagiū propagatur.* Art. 1983. Lues venerea contagiosa est, ge-  
neratione, lactatione, contrectatione, saliva,  
sudore, liquido genitali, exhalatione; & qua  
parte contrahitur, primo se manifestare solet.  
*Boerhaave.*

### Sydenhami sententia.

*Methodus salivationem ab hydrargyro excitatam extirpari po-  
vandi.* Art. 1984. Lues confirmata non nisi per *sa-*  
*livationem* ab *hydrargyro* excitatam extirpari po-  
test; ad hanc autem recta licet procedere, sine  
ulla præcedente evacuatione aut corporis præpa-  
ratione. Unguentum præscribere soleo ex *axung.*  
*porcin.* ℥ij. *argenti vivi* ℥j. cum hujusce parte ter-  
tia brachia, crura, tibias ad tres noctes conti-  
nuas manibus suis ægrum perungere permitto;  
ita tamen ut ne axillas, neque inguina neque  
abdomen attingat usquam. Post tertiam inunctio-  
nem gingivæ ut plurimum intumescunt, & *pya-*  
*lismus* suboritur; si vero intra id tempus haud  
procedat, tum *turbith. mineral.* gr. viij. in *can-*  
*serv. ros. rub.* exhibeantur ægro, quod remedium  
vomitus ciet, & *pyralismus* suscitabit; & po-  
stea si salivatio jam incepta prius elanguescat,  
quam symptomata penitus disparuerint, extimu-  
landa est subinde cum dosi *mercur. dulc.* Dietam  
quod spectat, & reliquum ægri regimen, eadem  
prorsus, ac in catharsi, imperanda sunt.

Art.



*Art. 1985.* In quibusdam reperitur *idiosyncrasia* peculiaris tam salivationis respectu, quam <sup>agendæ</sup> purgationis, ita ut methodus laudata vix gingi- <sup>sit quan-</sup> varum exulcerationem queat efficere, multo mi- <sup>do pya-</sup> nus priyalissimum movere; in hujusmodi ægris <sup>lissimus</sup> cavendum est medico, ne importunius urgeat, <sup>excitandæ</sup> recalcitrante natura, & horrenda symptomata <sup>sit.</sup> accerscat; lente itaque festinet, & moras trahat *mercur. dulc.* ℞. semel in septimana exhibendo, & quantumvis salivatio ad plenum nunquam as- surgat, æger tamen copiosius quam pro more solito expuet, quousque fœtor justæ salivationis comes adfuerit: atque hac methodo morbus expugnabitur concesso debito temporis spatio: His rite peractis (etiamsi morbus penitus profligari videatur) quo minus recidivam postliminio patiatut æger, (utcunque bene se habeat) capiat *mercur. dulc.* ℞. semel in septimana ad 4. vel 6. vices. „ Un- „ guenta mercurialia minore quantitate, quam „ ad *excitandum priyalissimum* sufficiat, inuncta, „ & diutius continuata, univrsa Luis venereæ „ symptomata tollere, & morbum penitus era- „ dicare a quibusdam perhibetur.

### *Listeri sententia.*

*Art. 2986.* Lues venerea est morbus contagio- <sup>Origo</sup> sus ab humore aliquo venenato, fere in coitu <sup>Luis ve-</sup> contractus, ulceribus doloribusque se manifestans. <sup>nerea.</sup> Ab *insulis Americanis*, in quibus, ante *Hispa-* *norum* adventum, hic affectus populariter gras- satus est, illum per *Hispanos* in *Europam* allatum esse, nullus jam dubitat: Credibile est a serpentino genere vel morsu vel cibo assumpto illum ortum esse. A serpente aut scorpione percussos coitu levare produnt; verum fœminas venere ea ledi auctore *Plinio*, magnum argumen- *Allen. Pars II.* B b rum

tum originis Luis Venereæ ab aliquo infecto venenato. Ictus serpentum omnium malorum pessimum, ideo luis vener. comparandum. Quis adeo dubitet istam luem ex animalibus ortam esse : nam penis ab istis moribus venenatis vehementer intenditur; & *satyriasi*, id est, furore & libidine perciti nihil præter coitum anhelant. Ita quod vulneratis remedium, fœminis calamitas est; & a fœminis sic infectis invicem mares conflantur in posterorum diram perniciem. ( *de humoribus*, p. 417. )

*Curatio.* Art. 1987. Fœmina gravissimo urinæ ardore, & punctationibus ibidem, item condylomatis cancris in pudendi labiis, non sine vehemēti capitis dolore, afflcta est; illam *purgavi* 4. o quoque die *pilulis de duob.* quibus æqua pars *mercur. dulc.* adjecta est; apozema ex *guajaco*, &c. fuit pro potu ordinario, citra sudorem. Sumpsit etiam bis quotidie cochlear. tinct. seq. in decoct. *guajaci* ℥iv. ʒi. *Cochinel.* ℥iij. *canthar.* ℥j. *vin. Rhenan.* ℥vj. digere in B. M. & f. tinctur. Horum usu gonorrhœa admodum virulenta, fœtidum & sanguineovitide pus effundens, integre sublata est, & duobus plus minus mensibus sine ulla ope chirurgica etiam ulcera siccata sunt; dolorque capitis ex toto desit.

*Dolores nocturni.* Art. 1988. In doloribus nocturnis, præmissis universalibus pulvis sequens est maxime proficiuus; ʒj. *Cochin.* ʒj. *oss. sepia subtilissime levigat.* ʒss. m. dos. ʒij. 6. a. quaque hora cum decoct. *valid.* *Guajac.* *Guajacum hydrargyri*, ut *hydrargyrus veneni* in lue antidotum est.

### *Pitcarnii sententia.*

*Gonorrhœa duratio.* Art. 1989. In principio gonorrhœa virulentæ purgandum est, cum pilula laxante ex *sen. sal.*



*Sal. tart. & flor. melilot. & bibat æger serum lactis*; post tres quatuorve dies purgationi insumptos, si ardor urinæ, & fluxus sint minores, & color & consistentia meliores, bolum assumat ex *terebinth. & rheo* per 6. aut 7. dies, si alvum laxat, id fieri solet cum euphoria. Vitanda omnino sunt astringentia; gonorrhœa enim nunquam evadet in Luem Vener. nisi nimis intempestive sistatur. *Pitcarn. in MS.*

*Art. 1990. Methodus therapeutica Pitcarni* *Methodus* radicalis sic se habet; post vomitum bis aut ter *dusehe-* iteratum exhibeatur *mercurius* per aliquot dies, *rapenti-* bis in die; cum os inceperit dolore, abstineat *ca.* se a *mercurio* per tres aut quatuor dies, tum *purgetur* alternis diebus; oris dolore cessante, iteretur usus *mercurii*; & iteretur hæc methodus, donec symptomata cessarint.

*Art. 1991. Ad ulcera & eruptiones leprosas decoctum pro lotionem, unguentum, aqua cosmetica, & cerevisia guajacina, tanquam remedia maxime efficacia, ab autore laudantur.*

### *Harrisii sententia.*

*Art. 1992. Infantes a nutricibus lactantibus* *Infantes* infecti, quanquam maculis, pustulis, ulceribus. *quomo-* que scatent, quandoque & nocturnis illis doloribus erunt excruciatii, facillime omnium resti- *do curantur.* tuuntur. *Farina sarsaparilla* fere insipida; saltem nullo gusto ingrato, panatellis aut pulticulis suis, ut par est, commista, addito etiam; ventriculi gratia, *santali citrini* polline, *cathartici* debitis intercalatis, tenerrimæ ætati, ut læte nonnunquam observavi, salutem perfectam reddidit.

## Blegnei sententia.

Ulceras  
penis &  
præputii.

Art. 1993. Pro ulceribus penis, & præputii curandis apprime valet sequens lotio; ℥. Vitriol. alb. ℥ij. auripigment. alumin. nitr. ana ℥j. comburantur in crucibulo, ut in lapidem coeant; ℥. Pul. prædicti ℥j. aq. calc. vin. albi ana ℔j. f. solutio, &c. Egregie etiam conducit lotio sequens Lanfranci, maxime in ulceribus glandis & præputii; ℥. Vin. alb. ℔j. aq. ros. plantag. ana ℥iij. auripigment. ℥ij. aris. virid. ℥j. myrrh. alce ana ℥j. misce. Ulceribus satis deterfis medicamentum affusa aqua lenius fieri debet pro futuro; & postremo cura cum lact. virgin. vel aqua divina Fernelii ℥. Alumin. rupei ℥iv. coq. in aq. font. ℔ij. ad tertias; tum. ℥. Lithar. auri ℔℔. vin. alb. ℔℔℔. decoquantur ad ℔j. colentur, ambæque aquæ commisceantur, & agitentur, donec albescant ) perficienda est. Si vero ulcera fuerint diuturniora, adeo ut callosa & cancrofa evaserint, vulgo Shankers appellata, applicanda sunt remedia valde penetrantia, qualia mercur. præcip. rub. lapis infernalis, aq. phagedenica. Notandum tamen cum primum ex usu horum crustæ inducantur, statim amovenda esse escharotica, & suppurantia ac digestiva adhibenda, quibus crusta sublata, ulcera tandem cum unguent. Vigonis sananda esse (vid. etiam, p. 102. internis remediis interim non neglectis.

Ulceras  
callosa.

Tumores Art. 1994. Accidunt interdum tumores genii  
œdema- talium œdematosi sive crystallini: remedia exter-  
rosi geni- na hoc in casu debent esse exsiccantia, discutien-  
tialium. tia, & aliquatenus astringentia; talia sunt spirit.  
vin. camphor. aq. calc. cum sal. armoniac. sp. vin. cum  
sapone nigro, pauco pipere, zinzib. & alum. ust. si  
adsint simul ulcera cancrofa, & tumores duri, præcavenda est zangrana. Art.



Art. 1995. De phimosi, paraphimosi, & amputatione penis consulatur, author, p. 112. &c. *Phimosis, &c.*

Art. 1996. Cura rationalis gonorrhœæ inchoanda est cum leni cathartico, alternis diebus ex cassia decoct. scann. & crystal. mineral. in fero lact. decoct. tamarind. & alth. & rhabarb. (gonorrhœa prope occlusa) interim exhibenda sunt quoque diaretica maxime terebinthinata, & postremo leviter astringentia, aq. minerales, croc. mart. astring. in aq. simplici coct. tindt. rosar. tindt. coral. in coch. syr. ejusdem vel cydon. Piyalismus nunquam tollit gonorrhœam. (Pil. de creta Palmarum. Tinctura cantharid.) *Gonorrhœa.*

Art. 1997. Ardor urinæ emulsionibus & ptisana seq. ℥. Rad. alth. ℥vj. malv. ℥j. fol. acetos. p.β. herb. mundat. sem. papav. alb. ana ℥ij. coq. in aq. font. ℔x. ad tertias, sub finem addendo glycyrrhiz. ras. ℥j. f. ptisana mihi in frequenti usu, mitigari & tolli potest: interdum in graviore casu venesectionis est necessaria, ut in urinæ suppressione, semicupium; ℥. Rad. & fol. alth. rad. & fol. malv. rad. fœnicul. apii, petroselin. eryng. marin ana ℥ij. (rad. raparum ℔ij.) herb. parietar. violar. veronic. flor. cham. melilot. genist. sambuc. ana ℔j. sem. fœnugr. lin. ana ℥j. petroselin. anis. fœnic. genist. ana ℥ij. coq. in q. s. aq. font pro semicupio. *Ardor urinæ.*

Art. 1998. In tumoribus inflammatoriis testiculorum, & scroti convenit venesectionis; topica testiculorum discutientia, & dolorem mitigantia sunt usurpanda. *Tumores testiculorum.*

Art. 1999. Carunculae in urethra sunt curatæ difficillimæ: remedium sequens optimum perhibetur; ℥. Pulv. alumin. ust. ℥j. præcipit. rub. auripigment. aris virid. ana ℥β. unguent. desicc. rub. ℥j. coq. ad consistentiam mediam inter unguent. & empl. hujus portiuncula cereoli summitati apponatur, & in urethram intrudatur, &c. de *Caruncula in urethra.*

consumendis carunculis vide locum p. 177. &c.  
& consulantur alii scriptores Chirurgici.

*Bubones.* Art. 2000. Bubones quoquo pacto sunt suppu-  
randi, interne conducunt *cardiaca*, *alexiphar-*  
*maca*, *victus* & *potus generosus*; externe *suppuran-*  
*tia potentiora*, *emplastra*, vel potius *cataplasmata*;  
cum *cucurbita* semel vel bis in die attrahendi  
sunt, & cum sint satis maturi cum caustico ape-  
riri debent, potiusquam *lanceola*, & aperti diu-  
tius sunt servandi. (1982.) Ex erudito & eleganti  
tractatu Chirurghi Gallici D. Blegny.

### Chiraci sententia.

*Recentis* Art. 2001. Quando Gonorrhœa virulenta re-  
*gonor.* cens est, ejus curatio exordienda a clystere ve-  
*rhœa cu-* spere injiciendo, qui sequenti ferme ratione con-  
*ratio.* cinnatur. *℥. Fol. Cichor. sylv. lactuc. Malv. violar.*  
*parietar. ana. man. sem. Hord. integr. pug. ij. Semin.*  
*frig. maj. ℥j. Aq. commun. lib. vj. coq. ad diminit.*  
*Glystva.* *medietatis pro tribus clysmatib. in quorum singulo*  
*dissolve Mel. rosat. unc. ij. Terebinth. ovi vitell. so-*  
*lut. unc. sem.*

Postridie vena brachii tundatur, & si æger sit  
plethoricus phlebotomia reiteretur, præcipue quan-  
do dolores vehementius urgent. Interea pro potu  
ordinario sequens Ptisana instituitur. *℥. Rad.*  
*Ptisana* *Alth. Petersil. Ononid. Agrifol. min. Cardui, Gra-*  
*aperiti-* *minis ana man. j. fol. parietar. man. j. sem. Fruct.*  
*va.* *Alkekeng. unc. sem. Semin. anis. pug. ij. Glycyrrh.*  
*unc. sem. Aq. commun. lib. xv. coq. ad remanent.*  
*lib. x. de qua hauriat æger quotidie lib. v. tan-*  
*diu continuando donec consuetus dolor inter-*  
*mingendum molestus omnino conquiescat, quod*  
*intra octo, decem, duodecim vel ad summum*  
*quindecim dies ut plurimum evenit. Tunc se-*  
*Bolus* *quenti ratione alvus primum purgabitur. ℥. Cass.*  
*purgans.* *mund.*



*mund. recent. unc. j. Cremor. tart. ℥j. f. bol. xij. mane ingerendi.*

Deinde rubescente, vel viridescente fluxus materia ut album colorem sibi vindicet ulloque dolore penis munera turbet validior purgatio instituti potest puta: *℥. Cass. mund. recent. Confect. Bolus Hamech. ana unc. sem. Mercur. dulc. gr. xv. m. f. alter. bol. xij. mane sumendi*; quibus habita ratione circumstantiarum addere licet Rhabarb. Sarsaparill. nonnulla grana Camphoræ, vel Sal. Saturn. vel Absynth. vel Corall. pp.

Finitis hujusmodi purgationibus ut virus funditus extirpari possit Mercuriales pillulæ adhibentur. *℥. Hydrarg. ℥ij. saliv. vel rosarum succo extinguerendi, Aloes ℥j. Rhabarb. Agaric. Trochisc. ana ℥. sem. Santal. citrin. pulv. ℥j. Nuc. Myrist. 3 sem. Terebinth. aq. scab. lotæ unc. ij. m. f. pillul. quarum dosis est ℥j. vel ubi quotidie usurpantur ad ℥. sem. Vel ℥. Aloes purgatæ Scammon. pp. Trochisc. Albandal ana ℥j. Gumm. Gutt. 3. sem. Mercur. dulc. ℥ij. Syrup. ros. pallid. q. s. m. f. pillul. quarum usus aliquandiu continuatur.*

Ne vero ulla dubitatio remaneat de reditu valetudinis, pillulis adstringentibus laxitas vasorum, & ex diuturno effluxu debilitas roboratur. *℥. Rhabarb. torref. Rad. Tormentill. ana ℥j. Mastic. ℥ij. Vitriol. calcin. 3. sem. Syrup. cydonior. q. s. m. f. pillulæ quarum dosis ad 3. sem.*

His non obstantibus medicamentis si fluxus adhuc perennet, ad injectiones confugiendum est habitas cum fero lactis, aq. hordei, plantag. Ros. rubr. vel Absynth., vel quavis alia exsiccante, & deterfiva.

Nulla equidem gonorrhœa datur, quæ, dum incipit, hac tractata methodo prædictorum remedium virtuti non cedat, modo prudenter

administrentur, & æger præceptis rite obtemperando suæmet valetudini consulat.

Si dum gonorrhœa curatur mejendi difficultas ut sæpissime accidit superveniat, vel materia effluens a doloris vehementia supprimatur, tunc satis quidem non est semel brachii venam secare; sed ea quoque pedis secanda est, maxime si dolores renum quoque regionem exerceant; atque dandum cochleare juris chamæmeli, cum aliquot sp. terebinth. guttulis, vel alio quovis simili aperitivo.

Si ægri temperamentum biliosum calidumque fuerit, vel melancholicum, tunc loco supra scriptæ Ptisanæ, altera magis refrigerans jubebitur ut: 2℥. Rad. Frag. Nenuph. fol. Lactuc. Pimpinell. Capill. ven. ana man. sem. fol. Violar. Borrag. Bugloss. ana man. j. Polypod. Glycyrrh. ana unc. ij. Aq. commun. lib. xv. coq. ad consumpt. tertiæ partis, de qua bibat æger quotidie lib. v. cavendo ne diutius in ejus usu insistendo stomachus præ nimia refrigeratione debilitetur.

Observandum est, quod in prædictis Ptisanis componendis plurimæ plantæ aliæ, pro recensitis majori aut minori numero substitui possunt, quin imo mihi interdum in usu fuit parietaria dumtaxat cum glycyrrh. interdum etiam sola Altheæ rad. Mane quoque, & vespere Emulsionem pro Ptisanis usurpare licet, quæ sequenti ratione præparari possunt. ℥. Amygdal. dulc. excortic. num. viij. vel viij. Quatuor sem. frig. maj. unc. j. Semin. lini Papav. alb. ana ℥j. Decoct. Hord. lib. ij. f. Emulsio in tres, vel quatuor partes dividenda, quarum singulis add. Syrup. Nymph. vel Violar. unc. j. Sal Prunell. ℥. sem.

Gonorrhœa in-  
veterata  
curatio.

Art. 2002. Quando Gonorrhœa principio neglecta, vel male curata roboratur, & prædicta me-



methodo non cedit, ad singulatia quædam alia remedia confugere oportet, quæ morbi pertinaciam evertere valeant. Quamobrem diligenter observandum est, si fluxus copia excedit, ejusque color albescit, si quemdam inter menjendum vel dum sedere vult, vel etiam in erectione penis æger experitur dolorem ad renes, vel in ipso pene molestum; nam ubi nihil horum adest con-jicere licet pertinaciam effluxus a sanguinis copia nimia foveri, quæ læsas debilesque partes gravando eam lymphæ quantitatem secernit, a qua gonorrhœa petennatur, id autem cum eveniat ob congruam sanguinis educationem principio neglectam evidens est hujus morbi atrociam, & inde iminentem maciem, & atrophiam evitari nulla melior ratione posse, quam tandem phlebotomias reiterando, quousque ægri vires, morbi que insistentia exigere videntur. Quidam profecto usque ad duodecimam vicem phlebotomiam passi, nullo alio præterea auxilio hoc morbo feliciter convalescere. Quandiu vero phlebotomiæ exercitium continuat propinari debet ægro Ptisana ex Bursa Pastoris, polygono, glycyrrhiza, eademque ejus renes, & genitalia foveri, nec non per virgam haberi injectiones addendo in singulo ejus cyatho Vitrioli albi ℥j. Syrup. ros. rub. vel absynth. unc. j. Tali pacto æger octo, vel decem dierum tempore sanabitur; at si quod per virgam effluit pauca sit quantitate, vel instar serositatis tantum, cum dolore aut pruritu ad virgæ apicem, vel circa ejus medium: tunc præscribenda erit Ptisana ex fol. Menth. sylv. Marhub. alb. cum glycyrrh. jubendaque injectio ex mucilagine seminum psylli, & Aq. plantag. cui si lubet admisceri poterit Trochisc. alb. Rhasis tantillum, ut inde erosio leniatur ab acredine effluentis serositatis in interiore urethra producta.

Quod si

Quodsi Gonorrhœa perseveret utut omnia præscripta remedia adhibeantur, & materia effluens non tam albicans sit, sed lutea aut viridescens, unaque labor, & dolor in erectione membri adsit, cum evidentissimum sit virulentiam quandam adhuc consistere, quantum par est a consuetis remediis non subactam, ad pillulas mercuriales supra memoratas confugiendum erit, ut inde ad usum Terebinthinæ transire liceat, vel ad pillularum hujusmodi. *℞. Terebinth. Venetæ sæpe in*

*Pillula  
terebin-  
thinata.*

*pariet. aq. lot. & cum aq. ros. ad ignem coct. atque indurat. lib. sem. Pulv. glycyrrh. q. s. f. pillul. ad dosim ℥ij. & ultra mane, & vespere ingerendæ.*

Quibus per aliquot dies usurpatis æger inde purgabitur, postea ptisanam ex fol. Vincæ pervincæ, & Veronicæ potabit, simulque pillulis adstringentibus superius descriptis fruetur.

Quando Gonorrhœa fulva est, vel rubescens sed pauca quantitate, cum urinæ pruritu atque ad virgæ radicem obtuso dolore pillulæ Terebinthinatæ ut supra, & Ptisana ex rad. consolid. maj. fol. Virgæ aureæ, & Vincæ pervincæ conveniunt.

*Injunctio-  
nes.*

Injectiones quoque adhiberi possunt per virgam ex decoctione Aristolochiæ long. vel rotund. in qua dissolutum sit Aloes hepatic. Sacchari candi, & vitrioli albi tantillum, vel nonnihil Syrup. pap. alb. Pro hac mixtura injectiones haberi possunt cum aqua ferrea repurgata, vel cum lacte tepido vel hordei decocto, vel cum Aqua minerali dicta *de Forges*.

Cæterum corrosivas injectiones a plurimis adhibitas nullatenus approbo ut sunt, quæ Aq. calc. viv. vel infusione sal. armoniac., nitri, salis saturni, Alumin. ust. Mercur. dulc., præcipit. rub. similibusque instituuntur, quia vel ulceta, vel graviora quædam alia mala facile producant.

Ne-



Neque itidem nimium adstringentes injectio-  
nes laudo, quæ ut plurimum decoctione fiunt.  
fol. polygon. Tormentil. Nuc. gall. vel Cupress.  
Cort. granat. ros. rubr. Vino rubr. facta, quia  
materiæ fluxu inhibito, eodemque in scrotum re-  
cidente, testiculorum inflammatio supervenit.

*Art. 2003.* Si unquam fiat, gonorrhœam viru-  
lentam cum ulceribus glandis, & præputii vel  
cum bubone ad Inguina, vel testiculorum scro-  
tique inflammatione conjungi, tunc curationis  
methodus a graviore magisque molesto morbo  
subigendo exordienda est. Quare si cum gonor-  
rhœa ulcera ad glandem prodeant sequenti bolo  
æger primum purgabitur: 2j. *Confect. Flamech.*  
2j. *Mercur. dulc. gr. xv. Sal. Polychrest. 3. sem. Cam-*  
*phor. gr. viij. Misce fiat bolus mane cum pane azy-*  
*mo ingerendus.* Postridie utatur ptisana aperiti-  
va, tum sæpe eodem bolo, deinde pillulis mer-  
curilibus purgetur, atque glandis præputii que ul-  
cucula lapide infernali, vel præcipitato rubro, si  
phymosis aut Paraphymosis abest, absumuntur; se-  
cus vero salibus lixivialibus cum Sabinæ pulvere  
mixtis, cujus itidem pulveris virtus ad clavos ve-  
nereos excellit, qui numquam satis rescinduntur,  
ex eo quia pluries resecti facile renovantur.

Gonorr-  
hœa  
compli-  
cata cu-  
ratio.

Bolus  
purgans.

*Art. 2004.* Si una cum gonorrhœa virulenta,  
& glandis vel præputii ulceribus bubo ad ingui-  
na prodeat, iminuta duorum præcedentium ma-  
lorum curatione diligenter incumbendum; est ut,  
quo citius fieri potest, bubonis suppuratio expe-  
diatur. Quare si bubo diutius ab impuro coitu  
proruperit, cum tali pacto ad suppurationem ægre  
pervenire soleat, eo modo tractandus erit, quo in-  
cipiens lues venerea curatur; si vero mox a coitu  
prodierit, Emplastro Dyachilo ad suppurationem  
perducetur, idem biduo vel triduo applicatum re-  
linquendo, nullo simul observato vitæ regimi-  
ne,

Bubonis  
venerei  
curatio.

ne, & vix ac ex augmento humoris perspectum erit suppurationem instare, tunc hoc aliud Emplastrum remoto priore admovebitur: *℞. Rad. Alth. Lil. alb. quinq. herb. emoll. ana man. semis Flor. Camemel. Melilot. ana pug. ij. Coq. in Aq. commun. f. q. dein in mortario contus. add. Cera sub cineribus cocta num. j. Demum trajectione facta per setaceum cum farina tritici & semin. lin. f. Cataplasma.* Hujus ope si bubo ad suppurationem optime perveniat, quod ex ejus fluctuatione discernitur, phlebotomo aperitur, indeque phlegmonis ad instar tractatur; si vero suppuratio imperfectior sit, nec nisi mollior tantum tumor evadat, potenciali cauterio aperiendus est, nec perfectiorem suppurationem attendere licet, metu, ne materia noxia intus revertatur, ut ex nimia dilatione sæpissime evenit. Eschara excussa incidendus est locus decussatim phlebotomo, & plumaceolus imponendus, cum unguento suppurativo pulveres catherecticos subinde addendo, ut durities frequentius occurrens facilius dissolvatur, cui scopo faciunt etiam Diachylon cum gummatibus, Emplastrum manus Dei, vel illud de Vigo cum Mercurio. Statim vero ab aperto bubone præscribi debet in potum ordinarium Priscana ex Guajaco cum tantillo cinnamomi, vel ex Sarsaparilla, & China, ut viro prohibeatur, ne ad internas partes invadendas ruat.

Aliquandiu a suppuratione æger purgabitur bolo ex Cass. mundat. unc. semis Confect. Hamech tantumdem Mercurii dulc. gr. v. vel vj. eademque finita iterum pillulis Mercurialibus purgabitur ad aliquot vices, ut sic omnis virulentia suspicio removeatur. Quod si a suppuratione quædam durities remanserit, necesse erit diutius adhibere Emplastrum de Vigo cum quadruplicato Mercurio, atque etiam ægrum prædicto bolo, pillulisque mercuria-



curialibus sæpe numero purgare. His vero non obstantibus si adhuc durities perseveret, & circa bubonem rubores quidam & pustulæ erumpant, tunc per hebdomadam vel decem dies diætæ sudoriferæ æger relegabitur.

Quando bubones, ulcerisque glandis, & præputii probe curata iterum revertuntur, vel gonorrhœa perrinacius insistit, ad diætam sudoriferam confugere oportet, utpote quæ primas obtinet in lue venerea recenti curanda, ut paulo infra videbimus.

*Art. 2005.* Quia gonorrhœa male curata, *Testiculorum* vel incaute suppressa, vel ob debitas omittas *inflammationis* principio phlebotomias, vel demum ob prisanæ *curatio.* aperitivæ neglectum usum, facile testiculorum inflammatio supervenit cum tumore & insigni dolore, quolibet tempore id ipsum evenierit, mox vena brachii tundere opus erit, ut in cæteris inflammationibus ex usu est, atque loco affecto Cataplasma imponere ex Mica panis, ovi vitello, ol. rosat. unguento Populeo, propinando ægro Aq. Parietariæ cyathum dimidium cum ol. amygdal. dulc. unc. ij. & Essent. Terebinth. gutt. vj., & frequentes clysteres injiciendo. Utile erit ut Cataplasma subinde renovetur, & ubi dolor vehementius urgeat, ut potio supra descripta reiteretur. Contra vero dolore imminuto Cataplasma admovebitur ex quatuor farinis, cum ol. sem. lini; eodemque quiescente Emplastrum simplex de Vigo juvabit. Denique cum inflammatio discedat eo modo quo Gonorrhœa intenditur, utile erit Prisanae aperitivæ usum ægro imperare.

*Art. 2006* Quantum vero ad urethræ ulcera *Urethræ ulcerum curatio.* hoc sane commodi a praxi obtinetur, ut remedia candellæ ope inferri possint, quibus proinde facilius sanantur. Præmissis itaque injectionibus ex Aq. hordei, Mele rosat. Hydromel., candel-

læ

læ ingeruntur ex anseris penna molli cera obducta & proportionaliter crassa, quarum apex unguento quodam exsiccante instruitur: ut eo Pompholigis, & Tutia. Deinde candella per urethram immittitur, ejusque usus continuatur, donec ulcus omnino exsicceatur.

Quidam solent cum prædictis Unguentis misere Salem Saturni, vel Mercurium præcipitatum rubrum vel dulcem, vel Tabaci cineres, aut Vitriolum album; præstat autem solum unguentum absque alia mixtione usurpare.

Plurimum fallunt, qui Urethræ ulcera vel Gonorrhœam salivatione curare fatagunt; nam quamvis hinc materiæ purulentæ fluxus imminuatur; tamen satis copiosus remanet, indeque difficilior sistitur. Quamobrem salivationi æger minime subjiciendus erit, ubi hisce morbis laboret, etiamsi Lues Venereæ signa proruperint; sed sudoriferis tractabitur, ut prior methodus eandem luem curandi exigit.

*Lues Venerea incipientis curatio.*

*Art. 2007.* Quando Gonorrhœa virulenta in vitis remediis omnibus adhuc persistit, ejusque viri pars quædam intro ad inficiendos corporis humores conversa est, tunc morbus curandus est ut lues Venerea, non autem ut Gonorrhœa, nimirum dicta sudorifera, quæ ut nunc minus quam salivatio adhibeatur, quia a recidivæ periculo non præservat, præcipue quando lues plurimum inveteravit, magis tamen convenit in morbo recentiori, & ex repressa Gonorrhœa acquisito minorique incommoditate & periculo quam salivatio usurpatur. Necessarium igitur erit sequenti ratione ad hanc diætam ineundam ægrum præparare.

*Clyster.*

Vespere dabitur ei Clyster ex decoctione emolliente additis Pulpæ Cassiæ unc. j. & Mellis communis despumati unc. iiij.

*Bolus purgans.*

Postridie mane bolus purgabitur ex Diaphœnic. 3. ij.



3.ij Confect. Hamech tantumdem Præcipit. alb. gr. vj.

Die sequenti vena brachii pertusa sequens apo- Apoze-  
zema vel decoctum ei propinabitur. *℞. Rad. Fœ-* ma pur-  
*nicul. Aspar. Petersil. Gramin. ana unc. j. Sarsapa-* gas.  
*rill. Chin. Cortic. Citr. ana. unc. sem. Fol. agrimon.*  
*Betonic. Meliss. Cetrach ana man. sem. Flor. Bugloss.*  
*Violar. ana pug. ij. Summit. Centaur. min. pug. iij.*  
*Semin. Card. Benedict. Cardamom. ana ʒiij. sena*  
*mundat. unc. sem. Agar. trochisc. ʒij. Aq. com. lib.*  
*v. coq. ad dimid. consumpt. & in colat. dissol. Crystall.*  
*miner. unc. sem. cujus quantæ parti adde syrup. Rosar.*  
*Cichor. cum Rhab. ana unc. sem. pro unica dosi quoti-*  
*die mane per tres alias vires repetenda, quæ si*  
*quantum par est non pargetur add., singulis Con-*  
*fect. Hamech vel Diaphoenic. ʒij.*

Alimentis vescatur æger quousque tali modo Regimen  
purgabitur euchymis ex pullis junioribus, Ver-  
vece, ovis, & similibus nec nimis frequenter  
jacula hauriet, nisi una vel altera hora ab as-  
sumpto Apozemate.

Post dicti Apozematis usum sequens præscri- Ptisana  
benda erit decoctio, ut ejus ope sudor ex anti- sudori.  
quorum methodo inferius tradenda eliciatur. fera.  
*℞. Ras. ligni Guajac. gummos. unc. ij. sem. Cor-*  
*tic. ejusd. unc. j. Salsaparil. Chin. an. unc. j. sem.*  
*Flor. Card. Bened. unc. sem. Aq. commun. lib. ji.*  
*sem. infund. per hor. 12. dein coq. usque ad dimi-*  
*dium. versus finem. addend. Vini alb. opt. unc.*  
*viiij. & post si' trat. liquor servetur usui. ℞. Aq.*  
*commun. lib. viij. quibus remanentie prioris decoct.*  
*affuse ebull. usque ad dimidium & colat. sit in po-*  
*tu communi, qui Bochetus dicitur.*

Ut sudor provocetur cyathus prioris decoctio-  
nis calefactæ ægro propinabitur, qui in lecto  
probe obtectus, stragulisque onustus statim de-  
cumbat. Circa ejus caput arcus locabitur cum cor-  
rina,

rina, & ad lecti pedes testa igni tis carbonibus plena, ut facilius sudet. Postquam hora integra tali pacto sudavit, remoto arcu arido lino abstergetur, & paulo post e lecto surgat, atque hoc ipsum per quindecim dies quotidie repetatur. Hoc vero tempore nisi assatis carnibus & biscocto pane vescatur, & pro potu posterioris decoctionis reliquis omnibus jusculis interdictis utatur, atque simul danda opera quovis biduo medianibus clysteribus ut ejus venter lubricus continuo fervetur.

Si ægri temperamentum nimis siccum sit, biliosumque, vel adeo extenuatum ut continuo tempore quindecim dierum ægre sudores proferre possit, hoc casu iisdem per tres vel quatuor dies interceptis bolum ex pulp. Cass. unc. j. & Cremor. Tartar. ʒj. devorabit, ut inde sudoribus ut antea subjiaciatur, tandiu continuando donec convalescat.

Cæterum circa medietatem sudoriferæ Diætæ quilibet æger prædicto bolo purgabitur, cui si opus præcipitati albi gr. jv. vel v. addere licebit, & versus finem iterum simili modo purgabitur, atque etiam deinceps cum pillulis ex Aloe, Scammon. pp. Trochisc. Alhandal, & Mercur. dulc.

Si ab hujusmodi remediis incalescentiam aut exsiccationem nimiam eger susceperit, præscriptis ad quintum vel sextum diem balneis, & ante eorum ingressum & post ægressum jusculo, apozemate superius descripto ter purgabitur, indeque aliquandiu mercuriales pillulas identidem usurpabit.

Hac ipsa sudorifera diæta uti quandoque præstat, antequam in quibusdam humidis & cacochymis corporibus salivatio exorietur, ut inde aliquantulum exsiccatis tutius mercurius administrari possit omni metu procul, ne ob humorum turgescientiam vel suffocatio, vel aliud grave damnum impendat.



*Art. 2008.* Quando lues venerea Tophis, ulceribusque depascentibus stipatur, tunc profecto sudorifera diæta minus efficax est, quam quod opus sit ad morbi magnitudinem subigendam, atque proinde ad salivationem confugere oportet, quæ cum periculo & damno cedere potest, ni necessariæ quædam præcautiones in administrando mercurio religiose observentur.

*Luis venerea in veteratâ curatio.*

Multiplikes sunt modi, quibus hydrargiri ope salivatio excitatur: videlicet frictione, suffumigio, Cataplasmate, & Pillulis, nulla autem tutior ea, quæ frictione absolvitur, quæ nihilominus si debitis cautionibus non celebretur, periculum est salivationem non consequi, pro qua molesta quædam symptomata superveniunt.

Confricato Ægro obducitur lineo aliquantulum absumpto, quo utendum in subsequentibus etiam frictionibus, nec permutari aut renovari debent vestes, subucula, & lecti integumenta, nisi curatione prorsus absoluta.

Si una alterave celebrata Frictione os inflammatur desistendum est: metu, ne pyalismus nimium redundet, aut ulcera ad Pharyngem usque extendantur, aut ad œsophagum, quod impedita deglutitione mortem inferret.

Præcæteris diligenter observandum est: an ulcera, quæ in ore excitantur nigricante quodam colore imbuantur, quo casu protinus desisti debet ab unctione, cum huiusmodi symptoma omnium gravius sit, & periculosius eorum, quæ in Salivatione occurrere possint. Sæpissime enim mortem prænotat, quia dispositionem humorum ad gangrænam, & sphacelum ostendit.

Quando Pyalismus nimis redundat mutatis indumentis, & aere cubiculi refrigerato sequentis Ptisanæ uno alterove cyatho purgabitur.

*Ptisana Laxativa.*

*℞. Senn. mundat. unc. sem. Glycyrrh. Zij. semin.*

*Allen. Pars II.*

C c

Co.

*Coriand.* ℥ij. *Aq. commun.* lib. j. *sem. infund. frigid.* additis *Citr. in frusta concis.* num. j. *Crem. tartar. pulv.* ℥ij. & filtrato liquore bini agro cyathi exhibeantur, unus post alterum horæ intervallo hauriendi, ut inde bihorio ab ultimo cyatho jus carniū propinet.

Quando leves frictiones adhibentur, bis quotidie renovari possunt, mane scilicet & vespere, modo facile ab ægro perferantur; quod si fortiores ministrantur adhibita nempe unguenti mercurialis uncia, quæ ℥ij. & sem. hydrargiri saltem importat, semel in die operationem renovare satis est.

*Quomodo salivatio-  
nis sympto-  
mata tractan-  
da.*

*Art. 2009.* Symptomata salivatione provenientia ita tractari debent ac si ab hydrargiro nullatenus proficiscerentur, phlebotomia nempe instituta, si febris urgeat, alvo laxata, si saliva nimis abundet, si lingua inflammatur, si ulcera latiora evadant, ut inde major h. drargiri actio per inferiora egrediatur, atque demum ulceribus mundificatis Melle rosat. cum sp. vitriol. vel sal. vel sulph. si eadem livescendo gangrænæ periculum minitentur.

*Nota bene.*

*Art. 2010.* Si salivatio quinto, vel sexto die usque ab institutis frictionibus non prodeat, eisdem insistendum quidem minime est; sed sollicitabitur Mercurio dulci ad grana xv. vel xx. cum Confect. de Hyacinth. ℥j. sub forma pillular. devorando. Id ipsum quoque juberi poterit si incepta salivatio quantum par est non abundaverit, aut si citius se se cohibuerit. Quidam mane ad balneum ablegare ægrum, & vespere fricare consuecunt, ubi salivatio votis non respondeat, quod non laudamus, nisi pro quibus semel incepta sponte sua defecit, vel in iis qui perperam curati fuerunt, nec rite inunctio fuit ministrata.

*Art.*



*Art. 2011.* Ut salivatio rite procedat, adeo copiosa fieri debet, ut 24. horarum tempore ad lib. iv. ascendat, atque etiam copiosior laudatur, modo nihil mali ægris impendat. Necessarium est jugi effluxu eandem profluere, & viscosam densam, spissamque per quindecim dies eodem tempore continuare. Totum salivationis tempus pro debilioribus ad dies 20. vel 30. extendi debet, quibus convenit frictiones pedetentim celebrare, duobus videlicet interjectis diebus a singula frictione renovanda, aut longiori interposito tempore, prout æquius judicabitur, quo casu diutius totum salivationis tempus extendi debebit. In robustioribus autem, & in quibus lues jam inveterata adest, ad septem hebdomadas extendendum erit, vel adhuc magis si necessarium videatur. Hoc item casu vehementiam salivationis habito respectu ejus durationis imminuere licebit.

*Caracte-  
res rite  
procedē-  
tis saliv-  
ationis*

*Art. 2012.* Salivatione itaque aliquantulum provecta levem Guajaci, Chinæ, & Sarsaparillæ decoctionem ægro præscribere juvat, cui, si febris adsit, aut nimis emaciatus sit simplex Prusiana ex Rad. graminis, & glycyrrhiz. propinabitur.

*Methodi  
cōtinua-  
tio.*

Cum alimentis duriusculis vesci nequeat, quovis bihorio, vel trihorio propinabuntur ei juscula consumptarum carniū vitulli, & pullorum, interjectis subinde aliarum carniū gelatinis; osque suum sæpe abluet Prusiana superius descripta, vel hordei decocto, vel lacte tepido. Nec vino nec saccharatis fruatur; & ubi juscula stomachetur, lacte cocto cum ovi luteo utatur. Hoc vero casu alvum laxantia crebrius ac citius propinabuntur. Juvabit etiam clysteribus alvum solutam servare.

Utrumque de vigiliis ægri conquerantur cavendum est a Narcoticis, quippe hujusmodi me-

dicamenta cum facile salivationem inhi-  
beant, hydrargiri impedita actio, graviora quidem ma-  
la invehere posset.

Diutius quam par est salivatione protrahente  
necessarium erit purgationes reiterare, indumenta  
renovare, ab uno in aliud cubile ægrum trans-  
ferre, atque etiam in aliud cubiculum, debitis  
tamen cautionibus, & tutelis observatis.

Si æger tumentes glandulas ad inguina habue-  
rit ob suppressum Bubonem, vel in pene condy-  
lomata aut ulcera cancroidea absoluta salivatio-  
ne etiam permanentia, hæc ipsa loca unguento  
mercuriali fricare oportebit, quo non obstante  
duris adhuc glandulis persistentibus, & perseve-  
rantibus nodis id sane nihil detrahit, quin per-  
fecte curatus non fuerit æger, quamvis suspicari  
possit omnino non convaluisse. Sed adhuc ma-  
gis de integritate curationis hesitare poterit, ubi  
quosdam dolores per artus sibi reliquos esse per-  
ceperit, quemadmodum absoluta salivationis cura  
sæpenumero accidit, quod tamen nisi a valida  
humorum dissolutione provenit hydrargiri actio-  
ne parata, cui satis diæta sudorifera per heb-  
domadam continuata medetur.

*Finita  
curatio-  
ne quid  
prestan-  
dum.*

*Art. 2013.* Finita Curatione ægri ut plurimum  
a vehementi ciborum appetitu, & inextinguibili quasi  
fame exercentur, quod ab insigni passa humo-  
rum evacuatione provenit, quare temperantia  
eisdem iubenda erunt, & ut a nimia ingurgitatio-  
ne se abstineant imperandum; quia naturali ca-  
lore deficiente stomachus iners est ingentem edu-  
liorum copiam sustinendi, unde alvi fluxu haud  
ægræ accedente, ex virium languore prægressa  
curatione absumptarum, gulæ expletio in perni-  
ciem valetudinis cederet.

Quamobrem pro omni victu contenti sint ægri  
panatellis cum ovi luteo conditis, horiza, &

hor-



hordeo, similibusque carniū jure incoctis, despectis aliquandiu carnibus, & solidioribus alimentis, quæ profecto minus apti essent dentibus ab hydrargiro infirmatis, & gingivis extenuatis rite conterendi, quæ tamen manducare tunc securius poterunt, quando partibus satis roboratis ad necessariam masticationem absolvendam consuetam aptitudinem recuperaverint.

*Vanſvieten ſententia.*

Art. 2014. Cl. Viri D. Van Svieten S. C. R. M. *Remed*  
 Archiatri Epistolæ excerptæ ex Opere cujus titulus : *diu*  
*Commentarii de rebus in ſcientia, & Medicina ſingula*  
*gestis Lips. 1756.* *re.*

Mercurii usum magni facio, sed multa hic opus prudentia est in primis dum crudus datur, vel affricatur cuti. Non omnibus bene cessisse hæc tentamina ſcio. Si mercurius sublimatus corrosivus solvatur in spiritu frumenti rectificato hac lege : ut in singulis unciis spiritus hæreat medium granum, & deinde hujus detur mane ac vespere cochlear adultis, vel ad summum duo cochlearia, potando simul largam copiam decocti hordei, vel alterius cujuscunque emollientis, mira efficacia observatur in lue venerea, & aliis morbis difficillimis.

Trecentos lue laborantes in Nosocomium collegii præterito anno, & absque salivatione omnes exiverunt sani, hoc solo remedio usi. Parum argenti vivi, sed efficacissimi reddit, ex multa liquidi copia diluti, vidi profuisse quam maxime.

*Ex altera.*

Ufus illius remedii tamdiu protrahitur, quamdiu aliquid de luis symptomatibus superest: tuto sumitur etiam diu. Cancrosum in lingua ulcus curatum vidi, dum per novem menses hoc remedio uteretur puella, & absque noxa ulla.

A pinguibus sale, vel fumo induratis, lardo in primis abstinendum jubeo; juscula, olera mollia, carnes paucas concedo facile. Pisanam hordei cum quarta parte lactis copiosam do, vel aliud quodcumque decoctum emolliens. In Nosocomiis cubiculi ambitu continentur; plures curavi, qui quotidie per urbem vagabantur, in primis verno, & æstivo tempore.

Præterito mense ducenti e Nosocomio exiverunt curati hac methodo; post paucos dies trecenti alii ingredientur. Credo, & apud vos similem successum sperari posse, cum in Hispania per decem annos inveteratam luem sic curaverit Archiater Reginae Viduæ, cui indicaveram hoc remedium &c.





## CAPUT X.

*Sive Fasciculus Morborum decimus.*

## PLICA POLONICA.

*Boneti sententia.*

Art. 2015. **P**Lica capillorum morbus est, Po- *Plica in*  
*lonis* plerumque *endemi-* tam  
 maribus quam foeminis, imo pueris & infanti- *Polonia*  
 bus, ut in *Helvetia*, *Alsatia*, & *Belgii parte* *ende-*  
 ad *Rhenum*, ac in *Hungaria* cognitus, est non *mia, &*  
 tam frequens. In *Hungaria* interdum animalia *alibi co-*  
 hoc morbo infestari, praesertim equos, testatur *gnita.*  
*Sennertus.*

Art. 2016. Est autem plica affectus capillorum *Morbus*  
 gravis, malignus, & periculosus, in quo capilli *gravissi-*  
 capitis indissolubili implicatione, & agglutina- *mus.*  
 tione, seu inviscatione contorquentur, cum gra-  
 vissima totius corporis artuumque tam superio-  
 rum, quam inferiorum, capitisque laesione, ante-  
 quam capilli compliceantur, magno dolore, su-  
 dore plerumque concomitante.

Art. 2017. Praecisio capillorum intempestiva in *Incurra-*  
 sic affectis est admodum periculosa. „ Nulla *bilis.*  
 „ certa & appropriata remedia hujus morbi ha-  
 „ ctenus inventa sunt, quae illum perfecte sana-  
 „ re vel penitus extirpare valent; & quoniam  
 „ in his regionibus nusquam invenitur, super-  
 „ vacuum erit de illo diutius exspatiari.]

*Farrago sententiarum.*

Art. 2018. Cognoscitur Plica ex capillorum *Diagno-*  
 cirrhis, doloribus artus, & ossa infestantibus, *sis.*

convulsionibus, pediculorum copia. Ungues in pollicibus pedum sunt scabri, nigri, instar cornu hirci.

*Curatio.* Curatio est bonæ spei si nulli dolores adsunt, nam excrementitia materia in capillos deponitur. Purgantibus & venæ sectione morbus exasperatur. Quidam caput decocto brancæ ursinæ ablunt. *Jonstonus.*

*Quædã  
scitu di-  
gnæ*

*D. Connor* Medius Anglus hoc morbo diligenter perquisito fatetur, ejus causam longe cognitum difficilem fore, sed omne quod de ea effari potest illud est, quod pro Arthritidis specie capillos obsidente habeatur. Affirmat insuper plurimum errare, qui hujus morbi genesin negligentia Poliorum sibi capillos raro, vel numquam pectentium tribuunt, siquidem quousque eadem attingat, effectum alibi adeo inconspicuum numquam certe tam brevi tempore producere posset, cum intra noctis spatium interdum plica generetur. Fabulosum itidem esse, ait, quod narratur de effluxu sanguinis a capillis quando plica abscinditur, plurimos enim in Polonia novit, qui impune capillos sibi absciderunt, inter quos nonnulli quidem testati sunt, visum sibi a sectione turbatum fuisse, doloresque per artus, & membrorum contorsiones supervenisse.

## T I N E A.

### *Turneri sententia.*

*Tinea.* *Art. 2019.* Sahafati seu tinea; Angli sonant a *Scall'd Head*. Hujus affectus tres species ab authoribus numerantur, viz. *tinea sicca*, *humida*, & *lupinesa*, quæ revera sunt tantum varii gra-

*Defini-  
tio mor-  
bi.* dus ejusdem affectus; sed prætermisiss hisce divisionibus minus necessariis morbus definiri potest;



test ; ulcuscula manantia capitibus infantum exor-  
 ta a vitioso , corrosivo , aut salino humore ,  
 glandulas cutaneas exedente , quæ tractu tempo-  
 ris texturam earum destruunt , & deprædantur .  
 In primo gradu velamine albido , sicco , furfu- *Ejusdē*  
 raceo , aut squamoso caput obducitur . In secun- *gradus*  
 do gradu caro subjacens granulata apparet , ad *varii* .  
 instar seminum in ficibus transversim sectis .  
 Gradus tertius est ulcerosus , sicut *achores* & *fa-* *Ratione-*  
*vi* . Nomen desumitur a *vermiculo tinea* ob si- *minis* .  
 militudinem foraminum , quæ ab isto animali in  
 chartis , & vestimentis effodiuntur .

*Art. 2020.* Ad amovendam incrustationem fo- *Curatio.*  
 tus , & unguentum sequens ab *Ambrosio Paræo*  
 laudantur ; *℞. Rad. alth. lapath. acut. acetos. ana*  
*q. s. coque in lixivio tenni* , cui addatur modicum  
*acetî* pro fotu bis in die usurpand. unguentum con-  
 ficitur ex *foliis nasturtii hortensis* cum *axungia*  
*porcina* contusis vel frixis , quod 24. horis opus  
 absolvat ; ad radicalem autem curam hujusce mali  
 conrumacissimi recte perficiendam consulatur au-  
 thor , qui de eo pulchre scripsit , & optima re-  
 media ex probatissimis scriptoribus , cum judicio  
 accumulavit . „ Sed negotium adhuc abbreviare  
 „ possumus : Experientia etenim edoctus sum  
 „ hunc affectum sola *Pisselæi Indicî* inunctione  
 „ ( amota prius incrustatione , ut ante dictum fuit )  
 „ tuto accito sanari posse .

### *Farrago sententiarum :*

*Art. 2021.* Tinea sicca perinde est ac *Porrigō* , *Hujus*  
 quam *Ptyriasis* Græci dicunt , & fit quando te- *morb*  
 nues ac furfuraceæ squamulæ ex capitis , & reli- *synoni-*  
 qui corporis superficie nulla relictâ exulceratione *ma* .  
 decidunt .

Tinea humida perinde est ac *Psudrasia* , aut exan-  
 the-

themata capitis ubi exiles sunt in capite excre-  
scentiæ, pustulis similes, quæ summam cutis su-  
perficiem exasperant. Exanthemata vero ex *Paulo*  
*Ægineta* summæ cutis pustulæ sunt, & exulce-  
rationes subrubræ, ac salebrosæ.

Tinea demum lupinosa favos, seu Græcorum  
achoras constituit, ubi ulcera tenuissimis forami-  
nibus cutem perforant, e quibus viscida sanies  
excernitur. Haud sane dispar huic figura, & as-  
pectu malum est, quod *Cerion* h. e. favum dici-  
tur, quoniam foraminibus amplioribus terebra-  
tum mellis instar humiditas perinde ac in apum  
favis continetur. *Ægineta*.

*Prognosis.*

*Art. 2022.* Acores infantum seu crusta lactea  
nihil periculi involvunt; sibi enim relictæ sponte  
 tandem evanescunt, id quod per vulgus notum  
 est. Quando autem unguinosi, vel aliis incon-  
 gruis topicis retropelluntur, tunc infesta damna  
 succedunt. Quod adeo pervulgatum est, ut ipsi  
 parentes hinc externa auxilia plerumque reji-  
 ciant.

Achores autem maligni seu Tinea lupinosa,  
 cum indiciis imperiginis altioris sunt considera-  
 tionis. Licet autem recens malum congruæ me-  
 dicationi facilius cedat, inveteratum tamen per-  
 tinacissimum est.

*Curatio.*

*Art. 2023.* Tineam rubicundam per hyrudi-  
 num suctionem sanatam vidisse testatur *Rhases*  
 *lib. 36. tr. tract. 3. cap. 2.* Siccam nulla indigere  
 medella evidentissimum est, humidam pulveres  
 absorbentes cum antimonio diaphoretico, & mo-  
 mento flor. sulph. interne, ol. ovorum, vel un-  
 guento ex ol. hyperici, & momento ceræ citrinæ  
 parato subigitur.

Achores maligni curantur depuratis primo hu-  
 moribus per laxantia potissimum serosa, per di-  
luentia, & absorbentia. Externe vero radices cap-  
 pillo-



pillorum extirpentur emplastro glutinante e pice ,  
colophonio , & resina parato, deinde succurratur  
unguento quodam mundificante, & maturante .  
Ad mundificandum ol. laterinum optimos effectus  
edit. Ulcuscula ad suppurationem reducuntur at-  
trahentibus , & maturantibus e cera , & resina  
paratis . In ambitu autem Emplastrum juvat de  
spermate ranarum camphoratum. *Junckerus* .

## TRACTATUS DE OCULORUM MORBIS cognoscendis & curandis.

*Art. 2024.* Oculum nobilissimum totius cor- *Subjecti*  
poris organon ( quod emphasi quadam *lux corpo-*  
*ris* appellatur ) curam medicorum præcipuam me-  
reri damnum illud ingens , quod a cæcitate pa-  
timur , testatur .

Series Morborum Ocularium ( primariorum  
saltem, quibus reliqui referri possunt ) a scriptori-  
bus passim recensitorum in ordinem redacta.

### *Nomenclatura Morborum.*

Morbi vel vitia palpebra. N. XVI.	Emphysema, Tumor flatulentus.	2025.
	Pladorosis, Tuberculum lividum.	2026.
	Acrochordon, verruca.	2027.
	Pforophthalmia, lippitudo pruriginosa.	2029.
	Xerophthalmia, lippitudo arida.	2033.
	Sclerophthalmia, lippitudo dura.	2037.
	Scleriasis, lippitudo schirrhosa, livida.	2039.
	Tracoma, asperitas interna.	2040.
	Trichiasis, pilorum vitium.	2042.
	Madorosis, defluvium pilorum.	2044.
	Ancyloblepharon, coalescentia palpebrarum.	2045.
		La-

Morbi  
Tunica-  
rum &  
Humo-  
rum N.  
XV.

Morbi ac  
vitia reli-  
qua in  
prioribus  
classibus  
minus

- Lagophthalmia, superior palpebra ju-  
sto brevior. 2049.  
Atonia ton Blepharon, defectus quoad  
motum. 2054.  
Hippos, oculi nictatio. 2055.  
Ectropium, inversio palpebræ inferio-  
ris. 2056.  
Phthiriasis, pediculatio. 2060.  
Ophthalmia, inflammatio oculi. 2062.  
Oedema, tumor œdematosus. 2078.  
Hydrophthalmia. 2081.  
Hypopyon, sanies sub cornea. 2083.  
Phlyctænæ, pustulæ miliares. 2087.  
Anthraxis, carbunculus oculi. 2089.  
Synchysis, humorum confusio. 2080.  
Pterigium, unguis oculi. 2093.  
Proptosis, ruptura corneæ. 2092.  
Rhexis, ruptura tunicarum cum hu-  
morum effluxu. 2106.  
Oule, cicatrix, leucoma, &c. 2108.  
Hyposphagma, Suggillatio. 2107.  
Hypochoyma, suffusio, vel catara-  
cta. 2111.  
Glaucoma, mutatio humoris chrystal-  
lini in glaucum colorem. 2129.  
Epiphora, catarrhus oculi. 2132.  
Proptosis, exitus oculi fere ex orbi-  
ta. 2144.  
Atrophia, tabes oculi. 2157.  
Medriasis, pupillæ dilatatio. 2158.  
Meiopsis, pupillæ angustia. 2159.  
Plege, oculorum vulnera & contusio-  
nes. 2150.  
Elcos, ulcus oculi. 2165.  
Paralysis, musculorum resolutio. 2169.  
Strabismus, oculorum distortio. 2160.  
Encanthis, excrecentia carnea. 2172.



CAP. X.	<i>morbis cognoscend. &amp;c.</i>	513
compre-	Anchilops, ægilops, & fistula lacryma-	
hensa. N.	lis.	2178.
XV.	Amblyopia, hebetudo visus.	2185.
	Amaurosis, gutta serena.	2188.
	Myopia, propinqua visio.	2196.
	Presbytia, affectus priori contra-	
	rius.	2197.
	Nyctalopia, vitium duplex infra vi-	
	dendum.	2198.

### *Emphysema.*

*Art. 2025. Emphysema sive oculi inflatio est* *Emphy-*  
*Tumor flatulentus palpebrarum citra coloris mu-* *sema.*  
*tationem subito accidens: in corporibus cachecti-*  
*cis & scorbuticis est affectus levioris momenti.*  
*( vid. Emphysema 2528. )*

### *Pladorosis.*

*Art. 2026. Pladorosis, sarcomatis quodammo-* *Plado-*  
*do species, morum ob similitudinem vocata, est* *rosis.*  
*tuberculum lividum in palpebris nascens, non in*  
*marginē, sed frequentius in medio cili superioris,*  
*doloris expers; est Tumor in cista conten-*  
*tus, sicut Atheroma, steatoma, & melliceris,*  
*quæ in palpebris etiam quandoque accidunt. Hi*  
*Tumores extirpati haud difficiles sunt. ( vid. Art.*  
*2534. )*

### *Acrochordon.*

*Art. 2027. Acrochordon, sive verruca oculi* *Acro-*  
*latiori sensu pro excrecentia præternaturali ac-* *chordon.*  
*cepta, est vitium multifarium, viz. 1. Hydatidis* *Hydatidis*  
*in superiori palpebra quæ est excrecentia sub-*  
*stantiæ pinguis, infantibus maxime familiaris,*  
*quæ*

quæ in majorem molem quam reliquæ, accrescere solet, unde tota palpebra quandoque œdemotosa fit; si sit recens, & parva, sæpe sponte evanescit; vel medicamentis facile curatur; 2.

*Crithe.* *Crithe seu Hordeolum*, quod est tuberculum in summa palpebra ortum, prope cilia, quod *grando hordei* simile est, unde nomen mutuatur. Foveatur cera alba, vel adipe Gallinæ, vel saliva jejuni, vel corpore musci abjecto capite fricetur, vel sanguine columbæ vel perdicis. Si omnia

*Grando.* frustra, sectione opus est. 3. *Chalazion*, seu *Grando*, quæ ab Hordeolo parum aut nihil differt; nisi forma externa, & forsân quod sit ali-

*Tophus.* quanto durior. 4. *Lithiasis. sive Tophus*, cum materia vesica contenta ad cretæ lapidis substantiam accedat.

*Curatio.* *Art. 2028.* Hæc omnia Tubercula in cistis continentur, & ut plurimum operatione manuali extirpanda sunt: nihilominus vero recordandum est, has operationes, utcunque leviores videantur, non *sine cautela, nec temere* suscipiendas esse.

### *Psorophthalmia.*

*Psorophthalmia.* *Art. 2029.* „ *Psorophthalmia sive Lippitudo pruriginosa* est morbus palpebrarum *Psores* in „ reliquo corpore non multum absimilis, ab acri „ & mordaci humore proveniens, palpebrarum „ margines leviter inflammans, quandoque in „ tuberculis minimis erumpens; alias farinacea „ vel pruriginosa scabie incrustatus.

*Curatio.* *Art. 2030.* Est malum contumacissimum, & curatu difficillimum, præcipue si fuerit inveteratum. „ Ut curatio regularis instituat, impri- „ mis mittendus est sanguis, & deinde exhiben- „ dæ sunt doses aliquot calomelanos alternis „ vel tertiis noctibus; & bibendæ sunt aquæ mi-

„ ne.



„ nerales cathartica singulis aurotis, quales sunt  
 „ *Ebshamenses* & nostrates *Alfordenses*, *Lid-*  
 „ *fordenses* vel *Hortenses*. „ Interim foveantur  
 oculi quotidie fotu sequent. ℥. Fol. ros. rub. samb.  
 buc. ana Mj. sem. lin. fœnugr. ana ℥ij. carui ℥j. coq.  
 in q. s. aq. & vin. alb. ad ℥j. pro fotubis vel ter in  
 die usurpand. Inflammatione, & humorum acrimonia  
 in hunc modum sublatis, vel lenitis demum palpebræ  
 liniment. sequent. illinantur. ℥. Ung. Pom. ℥j. flor. Sulpur. ℥ss. Camphor. ℥j. ol.  
 ros. q. s. m. vel cum Infus. sequent. humectentur  
 bis terve in die. ℥. Fol. Nicotian. opt. ℥j. flor. ro-  
 rismarin. P. i. superaffund. aq. calcis bullient. ℥ss.  
 infund. per hor. quadrant. & coletur. Valere po-  
 test etiam unguentum *Ophthalmicum Pharm. Lond-*  
*inens.*

### *Ægineta sententia.*

*Art. 2031.* Psorophthalmia pruriginosa palpe- *Diagno-*  
 brarum scabies est, ex falso humore ducens ori- *sis.*  
 ginem, quod (ait *Platnerus* maxime in angulis,  
 & palpebris esse consuevit) anguli cum multa  
 prurigine rubent. Humor enim exit paucus, sal-  
 sus, acer, qui omnia exasperat. Enascitur, si ex  
 variis causis lacrymæ calidæ acres factæ sunt.

*Art. 2032.* Expedit sic affectis ex posca, len-  
 ticulæ decocto, & rosarum fomentatio tum, illud  
 hygrocollyrium. ℥. Aeris ℥vj. misyos combusti, *Alia re-*  
 myrrha ana ℥ij. Croci ℥j. sem. Piperis ℥j. *media.*  
*Chii*, & passi Cretici ana cyath. j. & semis, co-  
 quito ad mellis usque spissitudinem. Hoc est me-  
 dicamen Erasistrati *Panchryson* appellatum, quod  
 valet etiam ad Anginam, oris ulcera, verendo-  
 rumque, & aurium dolores. Illinantur autem,  
 & oleo genæ sub somnum; vitentur vero acida,  
 salsa, & acria.

*Xerophthalmia.*

*Xerophthalmia.* *Art. 2033.* Est etiam genus *arida Lippitudinis*, quod *Ξηροφθαλμία* Græci appellant. Sub hoc neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam fere levi, ac prurigine graves sunt, & palpebræ citra duritiem ullam noctu prægravi pituita inhærescunt.

*Curatio.* *Art. 2034.* „ Quoad curam præmissis præmit-  
 „ tendis, quemadmodum in quibusdam simili-  
 „ bus oculorum morbis, *Celsus* commendat *vi-*  
 „ *pan* oculis noctu apponendam; nec video quid  
 „ panis tostis oleo appropriato aliove liquore ido-  
 „ neo imbuti applicationem prohibet; focus emol-  
 „ liens in *Articulo de Psorophthalmia* memora-  
 „ tus hic etiam locum habet.

*Platneri sententia.*

*Morbi causa.* *Art. 2035.* Frequens esse solet iis, qui æstatæ anni flagrantissima, vel apricantur, vel per pulverulentas vias iter faciunt.

*Art. 2036.* Xerophthalmia laborantibus oculis succurritur etiam vapore ex herba meliloti, malvæ, floribus verbasci, Chamomillæ, semine lini, additis absinthio, ac ruta, qui vapores non alia ratione quam expressa sponsia oculo subinde admoventur. Intus dari debent lenia, & quæ humida diluunt; prisana cui cornu cervi raspatum adjici potest, juscula, lac, amygdalæ ac papaveris semen cum aqua contusum aquæ minerales Selteranæ vel solæ, vel cum lacte.



*Sclerophthalmia ?*

*Art. 2037. Sclerophthalmia est Lippitudo dura, Scler-  
 ficca, dolorosa, callositatem crassam in palpebris ophthalmia.  
 efficiens, earumque motum valde impediens. Ad  
 effectus alterutriusque priorum fere semper quoad  
 medendi rationem referenda est.*

*Ægineta sententia .*

*Art. 2038. Xerophthalmia pruritui similis ocu- Diagn-  
 lorum est sine fluxione dispositio . Medendum huic: sis &  
 lavacris , inunctionibus , & boni succi nutri- curatio.  
 catu .*

Sclerophthalmia, durities ac difficilis est com-  
 motio cum dolore ac rubedine absque humore.  
 Quocirca spongiis aqua calida imbutis oculos  
 identidem fovere, & palpebris, somnum initu-  
 ro, ovum cum rosaceo, aut adipem anserinam  
 imponere convenit, fugiendo frigida, quæque  
 duritiem conciliant. Caput velari & pinguedine  
 oblini, alvusque subduci debet.

Utrisque præsidio communiter fuerunt medi-  
 camenta tam acra ut lacrymas eliciant, per quæ  
 durities remittitur, & ariditas humescit. Huc  
 facit etiam Erasistrati panchrysas supra descri-  
 ptus.

*Scleriasis ?*

*Art. 2039. Scleriasis vel scleroma oculi, est Scler-  
 durities palpebrarum scirrhusa; vix a sclerophthal- riasis.  
 mia differt nisi gradu, unde prorsus malam in-  
 curabile evadit.*

*Tracoma.*

*Tracoma.* Art. 2040. Tracoma est internæ palpebrarum partis asperitas, cum pruritu & rubore, sæpe & pustulis semen milii referentibus, ab humore acri. Gradus ejus sunt *sycosis*, & *tylosis*.

*Curatio.* Art. 2041. Præter generalia, *revellentia*, *intercipientia*, *topica* sint *mollientia*, postea *refrigerantia*, ultimo *detergentia*. *Paraus* seq. instar omnium esse scribit, si parum *vitrioli* in multa *aq. ros.* solvas.

*Trichiasis.*

*Trichiasis.* Art. 2042. Trichiasis, vel Phalangosis est vitium pilorum in ciliis duplici ordine crescentium, vel saltem introrsum spectantium, atque ita oculum lædentium. Ophthalmiam non raro inducit. Forcipe avellendi sunt hi pili nocentes, si fieri possit, secus cura non est expectanda.

*Heisteri sententia.*

*Curandi ratio.* Art. 2043. Neque vero curari facile malum istiusmodi poterit, nisi oculum infestantes pili non solum, ut dictum est, prorsus extirpentur, verum etiam, & ne redeant impediuntur. Quam vero difficilis pilorum ejusmodi extirpatio sit, dudum, nisi ego fallor, animadversum a medicinæ professoribus est. Tamen si enim aliqui pilos istos resecuerunt, parum tamen, atque adeo nihil profecerunt. Namque succrescentes pilorum trunci utpote duri, & rigidi, longe gravius, quam pili ipsi, oculum irritarunt. Alii ab emplastris petere curationis auxilia maluerunt; dum scilicet palpebræ superioris pilos fronti, reliquos autem



autem, qui in palpebra inferiori insunt, genis firmiter adglutinarunt, atque ita sensim ipsos extrorsum inflectere tentarunt, quamquam irritò semper conatu. Itaque aliam curandi viam ingressi sunt postea Medici; sed præstantior est, quod protinus post pilum evulsum radici sive foraminulo medicamentum aliquid erodens, infernalis præcipue lapis illiniatur, sed providissime tamen, ne scilicet ipse oculus graviter afficiatur. Nobilissimæ quoque hic virtutis sunt sp. sal. armoniaci, nec non sp. vin. rectificatis. Namque ubi palpebræ post extractos pilos, adhibito tenui penicillo, iisdem inunguntur, ut plurimum mox foraminula coalescunt, nullique postmodum pili denuo succrescunt.

Quod si per integram palpebræ oram pili ejusmodi perniciosi succreverunt, nec sustinere tamen extractionem, atque adustionem etiam per intervalla factam ægri volunt aut possunt, miserum, sed unicum auxilium est, ipsam palpebræ oram, ne cœcitatæ periculum inducat, cum pilis inde prominentibus rescindere.

### *Madarosis.*

*Art. 2044. Madarosis, sive Ptilosis est deflu-* *Madarosis.*  
*vium pilorum vel palpebrarum glabrities ex vehe-*  
*mentia alicujus morborum trium supra recensito-*  
*rum plerumque oritur, viz. Psorophthalmiæ, Xe-*  
*rophthalmiæ vel Sclerophthalmiæ.*

### *Ancyloblepharon.*

*Art. 2045. Ancyloblepharum est palpebrarum* *Ancylo-*  
*inter se invicem, vel inter ipsas, & tunicam* *blepha-*  
*conjunctivam coagmentatio vel potius coalescen-* *ron.*  
*tia. Interdum (ut ajunt) est vitium infantibus*

connatum, sed frequentius ob incuriam in curandis ulceribus, vel aliis quibusdam oculorum morbis provenit. Coalescentiæ præternaturales manu chirurgica cum cautela separandæ sunt; & oculus tanquam in vulneribus & ulceribus topiciis appropriatis tractandus.

*Platneri sententia.*

*Si ab  
exulce-  
ratione  
curatio  
mitior.*

*Art. 2046.* Si Palpebræ in Ophthalmia humida, & erysipelatode, nec non in variolis solo pure inter se cohærent, in iis diducendis nimia festinatio nocet: si vero a vulnere, vel ulcere, media cicatrice inter se coalescunt, oportet eas protinus diducere. Hoc si non nimis valenter sibi inhærent, quandoque specillo fieri potest, quod inter eas, & oculum inseritur. Experiri etiam oportet filum sericum, unguento de tutia illitum, quod mediante acu incurva, obtusa vel averfa, eadem ratione demittitur. Hoc commode a partenarium fit, cum in majori, & interno angulo plerumque relictum foramen sit, & palpebræ aliquantum inter se recedere soleant. Educitur illa lino sequente e parte temporum. Huic filo inferius gleba plumbea innectitur, quæ sic appensa, & subinde commota, adducit valentius filum, quo tandem palpebræ inter se dividuntur.

*Curatio  
validior.*

*Art. 2047.* Ubi autem hac ratione oculus aperiri non potuit, inferendum est specillum minus, sulcum in longum ductum habens, super quod demittitur scalpellum tenuatum, parumque falcatum, quo sic palpebræ secantur; & dividuntur. Id etiam minori forfice incurva fieri potest. Post hæc autem medicamentum inducatur idoneum. Optimum est unguentum de tutia, cui parum balsami de Mecha adjici debet. Ne vero dum



oculus devincitur, palpebræ faucciatae cum cornea, vel albo oculi cohærescant, in oculum demitti debet vesica eodem medicamento illita, inter palpebras vero poni possunt exigua linamenta, donec illarum exulceratio finita est.

*Art. 2048.* Si vero palpebra qua parte cum oculi albo, vel cum cornea cohæret, etiam diduci debet, fit hoc commode alio minori scalpello incurvo, cujus mucro obtusus est, & globulo munitus. Hoc temperata manu, inter oculum, & palpebras ita subsecatur, ut neque ex palpebra, neque ex oculo, quidquam abscindatur, atque si necesse est, aliquid ex albo oculi potius, quam ex palpebra superiori; quippe per quam minores ductus lacrymas ferentes descendunt. Si autem palpebra superior cum cornea cohæret, huic ante omnia parcendum est. Diducta sic palpebra, curatio non alia sequitur quam qualem mox præcepi. Vitandum enim semper est, ne iterum palpebræ inter se glutinentur, neque iterum oculo inhærescant.

*Bulbo oculi adhærentis palpebrae curatio.*

### *Lagophthalmia.*

*Art. 2049.* Lagophthalmia est cum superior palpebra justo est brevior: vel nativa est, vel a cicatrice, vel convulsione, vel cum infantes in cunis sursum vel retro semper spectant.

*Art. 2050.* Curatur *mollientibus*. Si a cicatrice, sectio fit supra eam figura *falcatae lune*, in plagam *litus* injiciendus est. „ Sed revera estimandum ut plurimum prorsus insanabile.

*Lagophthalmia quid?*

*Curatio.*

### *Heisteri sententia.*

*Art. 2051.* Lagophthalmum appellant, quando superior palpebra non inversa, sed solum ad speciem oculi leporis, ob quamcumque causam ita

*Nota bene.*

sursum retracta, sive adstricta est, ut oculum contegere recte nequeat. Attamen simile vitium quoque in inferiori palpebra haud raro observavi, sine palpebræ inversione, licet pauci de eo sint locuti; hinc quoque haud immerito prospectie ectropii haberi potest.

*Curatio  
per me-  
dicamen-  
tum.*

*Art. 2052.* Itaque si nondum inveteratum malum sit, longe optimum est palpebras earumque cicatrices simul, atque ipsæ se contrahere occipiunt, vapore lactis, vel aquæ calidæ, vel amygdalarum, aut olivarum oleo, vel seminis cydoniorum mucilagine, pinguedine leporina, unguento dialthææ, similive alio unguento, & emplastro molliente solerter fovere, insimul autem palpebram male affectam, si superior est, sæpe deorsum versus trahere, si inferior est sursum versus attollere. Quin imo haud alienum erit, palpebram utramque noctu præsertim, per injecta emplastra in contrarium sensum trahentia, ac parva splenia in eundem scopum agentia, ita tandiu diligenter deligare, donec in pristinum suum statum ipsæ fuerint restitutæ. Quod si autem medicamenta ejusmodi nihil proficiunt ad sequentem operationem confugiendum est.

*Per ope-  
rationem  
chirurgi-  
cam.*

*Art. 2053.* Scilicet mox sub tarso paululum incidenda palpebrarum cutis exterior est lunata forma, cornibus plagæ in superiori palpebra deorsum, in inferiori autem sursum spectantibus, sic ut hujus beneficio cutis elongari queat. Ubi parum palpebra ad naturalem amplitudinem deest, unica quandoque plaga ad diducendam cutim sufficit; ubi vero multum deest binas, vel ternas plagas lunatas, easdemque parallelas filique crassioris amplitudine ab invicem distantes facere convenit. Tum cute quantum satis est diducta, linamentis carptis paucis, iisque contortis, & primum aridis impleri plagæ debent, splenijs, atque fa-



fasciis rite superinjectis, in sequentibus vero deligationibus linamenta carpta immittenda unguento vulnerario imbuenda. Sic enim non novæ solum cutis coalitio prohibetur, sed caro quoque in medio excitatur, per quam cutis hians sensim adimpletur, atque sic ea extenditur sive prolongatur. Denique ut promptior curatio fiat, angusta emplastra imponenda sunt, quibus & sursum attolli inferior, & deorsum protrahi superior palpebra queat. Continuari autem modo præscriptum curationis negotium tantisper debet, donec & nova carne impletum vultus, & quantum satis est, ampliaram palpebram deprehendimus.

*Atonia ton Blepharon.*

*Art. 2054.* Atonia ton Blepharon est affectus palpebræ superioris ex impotentia musculi attol-  
 lentis ortus, hinc motus ejusdem superne in totum amissus provenire post a *paralyfi*; (novi quosdam a *nativitate* sic affectos) a vulnere vel contusione gravi, discissis scilicet istius musculi fibris: hujus rei documentum habemus satis notabile ac æque deplorandum in insigni quodam *Baronetto Anglicolis* fere omnibus noto ex ictu infelici calcis equinæ. Fœmina quædam a *fistula lacrymali*, qua aliquandiu afficiebatur, ope chirurgica sanata, hunc defectum in supercilio contraxit, &, quod mirum videatur, idem in *ne-  
 potem* traductus est, nimirum virium imaginationis impressione: filia etenim, cum prægnans esset, cum matre prædicta cohabitans, & intuitu ac consuetudine quotidie utens, filium peperit similiter oculo affectum, & insanabilem mansurum. Et fatendum est quidem Atonia ton Blepharon a quacunque causa oriundum esse prorsus

*Atonia  
 ton Ble-  
 pharon.*

incurabile; neque curatio sectione, ut nonnulli suadent, temere tentanda est, ne gravius malum, nempe *Lagophthalmia* accerscatur.

*Hippos.*

*Hippos.* Art. 2055. *Hippos* est instabilitas palpebrarum, cum palpebræ inordinato motu continuo clauduntur, & aperiuntur, huiusmodi nictatio ut plurimum est hæreditaria, interdum vero ex mala consuetudine comparatur, vel a gravi aliquo affectu, ut terrore, ira, vel timore accedit: sub curam medicam proprie dictam nunquam cadit.

*Ectropium.*

*Ectropium.* Art. 2056. *Ectropium* est affectus inferioris palpebræ, quæ invertitur, & deorsum trahitur, ut interna pars cum deformitate videatur, & instar rubræ carnis appareat; neque enim superiori committitur, sed pendet ac hiat. A paralyssi, convulsione, vel vulnere male curato plerumque oritur.

Art. 2057. Hoc curant *astringentia* ( inquit *Forestus* ) in aqua ros. in qua ferrum ignitum sit extinctum; seq. sæpe expertus est, ℞. Butyr. rec. diligenter lot. in aq. commun. & postea in aq. plantag. vel ros. ℥ij℥. turæ præp. & in aq. ros. lot. aloe in aq. plantag. lot. sieff alb. cum opio ana ℥i℥. camphor. lot. ℥j. f. ung. quo vesperi inunge & aq. calida ablue. De operatione Chirurgica vide Celsum.



*Heisteri sententia.*

*Art. 2058.* Ectropium seu palpebræ præsertim <sup>Si ab in-</sup> inferioris conversio si ab inflammatione quadam <sup>flamma-</sup> graviore, carneque intus luxuriante provenierit, <sup>tione aut</sup> tum institui curatio melius haud potest, quam <sup>sarcoma-</sup> ubi primo inflammationem convenientibus medi- <sup>te cura-</sup> camentis delinimus, mox autem circumspicte o- <sup>tio.</sup> culo probe defenso, adhibito identidem lapide infernali carnem luxuriantem, atque noxiam sensim consumimus, atque extirpamus. Si ab encanthide, hyperfarcosi, sarcomate sive excrescentia carnea malum oriaur sequenti modo vitii causæ auferendæ sunt.

*Art. 2059.* Si nimium distortæ, & adstrictæ <sup>Quo ca-</sup> palpebræ fuerint, aut ab ipsa inde nativitate no- <sup>su in-</sup> xam suam habuerint, vix ulla ipsas restituere cu- <sup>curabilis.</sup> ratio valet. Nonnumquam vitium in inferiori palpebra e musculi orbicularis debilitate, sive laxitate, præsertim in senibus, nascitur, atque sine omni cicatrice. Quod ipsum quoties forte evenit, inanis ista esse operatio solet. Si quidem salutis in his expectandum est, ea tantum curatio proficit, quæ per liquores, sive spiritus confor- rantes atque balsama, sive unguenta roborantia instituitur. Quo magis autem inveteratum malum est, hoc difficilius inde per operationem, atque medicamenta vincitur.

*Phthiriasis.*

*Art. 2060.* Phthiriasis sive palpebrarum pedicu- <sup>Curatio.</sup> latio est vitium, in quo pediculi inter pilos nascuntur. Malum est ( inquit Sennertus ) minime contemnendum: acres enim fluxiones concitat, & oculi tandem ab iis valde læduntur; idem va-  
ria

ria medicamenta enumerat, sed non opus est, ut hic recenseantur; nam sola inunctione saponis nigri pediculi cujuscunque generis facili negotio necandi sunt. (vid. *Art.* 3067.)

### *Celsi sententia.*

*Pregno-  
sis.*

*Remedia  
varia.*

*Art.* 2061. Genus quoque vitii est, qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. Id *phthyrasin* Græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat; raro non ultra procedit. Sed fere tempore interposito, pituitæ cursus acerrimus sequitur, exulceratisque vehementer oculis, aciem quoque ipsam corrumpit. His alvus ducenda, caput ad cutem tondendum, diuque quotidie jejunis perfricandum. His ambulationibus, aliisque exercitationibus diligenter utendum, gargarizandumque ex mulso, in quo nepeta, & pinguis ficus decocta sit; sæpe in balneo multa calida aqua fovendum caput. Vitandi acres cibi; lacte, vinoque pingui utendum, bibendumque liberalius, quam edendum est. Medicamenta vero intus lenia quidem danda sunt, ne acriorem pituitam concitent. Super ipsos vero pediculos alia, quæ necare eos, & prohibere, ne similes nascantur, possint. Ad id ipsum ℥. Spumæ nitri partem j. Sandaracæ tantumdem, uvæ taminia itidem tantum, simul teruntur, adjiciturque vetus oleum pari portione, atque acetum, donec ei mellis crassitudo sit.

### Ophthalmia

### *Tralliani sententia.*

*Ophthalmia san-  
guinea  
diagnos.*

*Art.* 2062. Sanguineum itaque humorem influxisse ac inflammationem oculorum seu (Ophthalmia)



thalmiam ) concitasse , ex forma ipsius tibi constabit . Omnia namque rubra , & sanguinea sunt , facies rubens , & tumidior , venæ latiores , gravitatis sensus , pigritia ad consuetas actiones . Quod si præter hæc nec lacrymarodens , & acris appareat , adhuc etiam magis sanguinem influxus causam esse , & inflammationem peperisse putato .

*Art. 2063.* An vero dolor ex bilioso , & acri humore provenerit , clarum tibi ex multis evad- *Diagnosis bilio-*  
det , primum sane inde quod totum corpus ple- *sa .*  
thoricum non apparet , sed potius vitioso etiam humorem præditum , ad hæc quod non solum anguli , sed etiam malæ vehementer ex influxu rodantur , quæ videantur uri , exiliantque ægri ro-  
sionem non tolerantes . Cum igitur morbum ex his , atque illis , quæ præcesserunt , internoveris ( nam tristitia plurimum , curæ , insolatus , ira , & acrium efus præcedunt ) cum fiducia curationem aggredere , licebit enim celerrime vel sine collyriis affectui mederi .

*Art. 2064.* Si igitur sanguinis causa inflam- *Curatio.*  
mationis effectrix esse apparuerit , venam secare *sanguinea .*  
humoralem oportet . Sin biliosi & acres humores cum sanguine , etiam purgationem paulo post sanguinem dimissum adhibeto , ac medicamentis uritor intus quidem iis , quæ non rodunt , & lenissimis , extrinsecus autem illis , quæ conco-  
quere inflammationem possunt . Lac enim muliebre cum vitellis ovorum , & rosaceum superimpositum mirifice lenit , inflammationesque oculorum admodum ferrentes concoquit , similia præstant etiam violæ folia . Ad maximas autem inflammationes , tumidioreque bene facit , crocus cum mica panis , luteisque ovorum , ac rosaceo . Hæc omnia cataplasmatibus forma extrinsecus adhibentur , quæ vero illini , & instillari de-  
bent

bent hæc sunt . ℥. Cadmiæ unc. v. Cerusæ ℥iv. pompholygis unc. ij. opii unc. j. tragacanthi unc. iij. Aqua pluvialis ad excipienda adjicitur . Hoc inflammationes admodum ardentes , & dolorificas citra rofionem mitigare plurimis constat experimentis . Celeriter item mitigat oculorum cruciatus Collyrium quod Spongiarium dicitur ; Hoc ita se habet . ℥. Amyli Cerusæ ana ℥iv. Opii obolum , gummi ℥ij. Aq. pluvialis adjicitur ; & usus ex lacte est . Reliqua vide in Auctore .

*Curatio  
biliosa .*

*Art. 2065.* Si biliosa humorum pravitas in toto corpore superare videatur , iis , quæ totum corpus purgant , liberantque recrementis , utitor , si autem recrementa acris non in toto redundant corpore , sed qualitate potius , quam quantitate peccare videantur , solis balneis dulcis aquæ , & temperatis ægrum citra dolorem liberabis . Quod si obediens æger fuerit cibo quoque lenissimo , mitissimoque , & crasso utatur ; si vero inobediens , tunc collyriis uti necesse est , atque ex eorum numero , quæ non rodant , sed acrimoniam queant obtundere , ex quibus primum est , quod ex pompholyge paratur . ℥. Pompholyg. lotæ , piperis , cerusæ lotæ , plumbi cremati , & eloti , amyli ana ℥xxv. gummi albi ℥xl. Aqua pluviali excipiuntur . Licet autem , si usus requirat , non nihil ex repellentibus sæpe admiscere , aut ex mitigantibus , quarum quis affectui infestanti convenire putaverit .

### *Riverii sententia .*

*Morbi  
definitio,  
& divi  
sio .*

*Art. 2066.* Ophthalmia sive Lippitudo est oculi inflammatio cum tumore , rubore , & dolore ; levis inflammatio *phlogosis* dicitur ; *chemosis* appellatur , quando utraque palpebra inversa sit , ut vix ab iis oculi contegantur , rubrumque magna



gna ex parte iridem occupet . Alia est ophthalmia *sicca*, alia *periodica*. Elegantem hujus affectionis descriptionem habemus apud *Lommium*; *Ejusdem descriptio.*

„ Vehemens oculos urget inflammatio cum multo dolore, & tensione, & tumore & ardore & rubedine; interdum etiam tanta cum puntione, ut oculi tanquam ab infixa acu aut spina stimulari videantur; fervente humore implentur, sequiturque pituita modo paucior, modo uberior; sed & sordes quædam majoribus angulis inhærescunt; & ubi gravius est malum, vicina etiam loca ad malas usque attoluntur, circum circa arteriæ vehementer pulsant; vasa sanguifera tenuia turgent, conspicuaque redduntur, quæ per sanitatem in albo fuerant obscura.

*Art. 2067. Venesectio* docente *Avicenna* usque *Curatio.* ad lipothymiam celebranda est; cucurbitula scapulis & spinæ dorsi affigendæ, catharsis lenientibus instituenda. Remedium sequens inflammationem sedat, & fluxionem cohibet. *℞. Alb. ovi unius*, agitetur cum frusto *aluminis* satis magno, donec unguenti, consistentiam adeptum sit, quod extendatur super linteum, & oculo tepide applicetur, post horas 2. vel 3. auferendum est, ne humores nimis astringat. Unguentum fieri potest ex *butyro* & succo *nicotianæ* simul coctis maxime efficax. In declinatione collyria magis *resolventia* usurpanda sunt, ut *℞. Sarcocol. nutrit.* (i. e. per plures dies in lacte macerat.) *tutia præparat. ana ℥i℥. aloe ℥j. myrrh. ℥℥. mucilag. sem. fœnugr. ℥℥. aq. fœnic. euphras. ana ℥i℥. m. f. collyr.* In ophthalmiis inveteratis, cum alia remedia non sufficiant, ad *mercurialia* tanquam ad sacram anchoram confugiendum est. In graviore casu convenit *Setaceum*; aliquando etiam *masticatoria*, & decoctum *elignis* profunt.

## Covvardi sententia.

*Ophthalmia humida & sicca.* Art. 2068. Ophthalmia est inflammatio tuni-  
cæ adnatæ cum dolore, & ardore torquens. Optime dividitur in *humidam* & *siccam*, prout  
scilicet cum majore, vel minore humoris pro-  
fluvio stipatur. In *ξεροφθαλμία* vel ophthalmia *sic-  
ca* oculus quidem intumescit cum dolore quo-  
dam, leni rubedine, & pruritu, & gravitate,  
& cum levi etiam humoris fluxione per vices  
saltem, non enim datur ophthalmia absolute  
*sicca*.

*Prognosis.* Art. 2069. Copiosiores lacrymarum effusiones  
ut ut mordaces, ophthalmiam non diutius dura-  
turam indicant. Ophthalmiæ laborantem alvi  
profluvio corripere bonum est, inquit *Hippocrates*.

*Curatio.* Art. 2070. Ut recte instituatur ophthalmiæ cu-  
racum *venesectione* incipiendum est; conveniunt  
etiam *cathartica* mitiora; privatim *aquæ minera-  
les purgantes*, val *sal mirabile* in aqua communi  
solut. Quoad *topica* considerandus est præ omni-  
bus morbi status: In principio factis debitis *eva-  
cuationibus*; ℞. Aq. euphrag. fœnic. dulc. ana ℥j.  
morbi tut. prepar. ℥ss. trochis. alb. Rhas. ℥j f. mistura.  
stadiorū. ℞. Lact. fœminin. ℥j. succ. fœnicul. dulc. ℥ss. cam-  
In prin- phor. ℥j. album ovi unius, probe conquassando mi-  
cipio sceantur, & redigantur in pulvem forma cataplas-  
matis applicand. Huic usui quoque inserviunt mu-  
cilagines *seminum cydon. psyl. papav. &c.* quæ sæ-  
pius renovandæ sunt, ne acorem contrahant. In

aug-  
mento. ℞. Aq. Plantag. rosar. pallidarum ana  
℥i℥. sacchar. saturn. vel cernus. lot. ℥j. sp. sal. armon.  
℥ss. f. f. a. mistura. ℞. Aq. solari ℥ij. succ. sedi ℥ss.  
opii thebaici gr. ij. album ovi q. s. conquassando  
probe f. mistura ophthalmica. Si comitetur epi-  
phora, sine vitriolatis commixtis incassum labo-  
ramus.



ramus. In statu *resolventia* remedia *repellentia* *In statu.*  
*bus* prævalere debent, inquit *Riverius*, præcipue  
 fofus e flor. *sambuci* parat. discutiendi gratia, sed  
 mallem ego sequens adhibere, ℥. Fol. *euphrag.*  
*fœnic.* ana Mj. *femin.* *fœnugr.* aloes lot. ana ℥ij. aq.  
*font.* pauco aceto *acescentis* ( ita ut gustu leviter  
 deprehendi possit ) ℔j. coquantur simul ad di-  
 mid. consumpt. colatura fervetur ad usum. In de- *In decli-*  
 clinatione sola *sarcocolla*, uti suadet *Sennertus*, *natione.*  
 maxime conandum est, si ophthalmia sordes re-  
 liquit, quod priusquam aliquod applicueris medi-  
 camentum ophthalmicum, penitus eluantur seu  
 detergantur.

Art. 2071. In ophthalmia sicca *emollientia* & *Ophthal-*  
*lenientia* perpetuo intermiscenda sunt, ne discus- *miã sic-*  
*tientium* & *exsiccantium* medicamentorum usu *ca.*  
 inflammatio asperior & intensior reddatur.

*Pitcarnii.*

Art. 2072. Ophthalmia externa diligenter di- *Ophthal-*  
 stingui debet ab ea, quæ simul est & externa & *miã in-*  
 interna; interna est inflammatio retinæ, quam *terna.*  
 nemo ( quantum scio ) descripsit; dabo itaque si-  
 gnum pathognomonicum, & in praxi utilissimum;  
 nam si signa *externæ* ophthalmiæ adsint, viz. ru-  
 bor, calor, dolorque, & nihil aliud visui se  
 offerat, est solum ophthalmia *externa*; at si præ-  
 ter illa *externæ* signa videantur ophthalmico ocu-  
 lis suis obversari muscæ in aere volitantes, pul-  
 visve quilibet obscurus vagare, aliarumve rerum  
 incerta simulacra, tum erit ophthalmia *interna*  
*externæ conjuncta.*

Art. 2073. Nullus est morbus, qui natura sua *V. S. co-*  
*venas* sectionem sæpius postulet, quam ophthalmia. *piosa.*

„ Et ex observatione quorundam Chirurgorum  
 „ Gallicorum constat, unam Arteriæ Temporalis

„ Se-

„ Sectionem plus valere ad inflammationem minuendam, quam duas vel tres iteratas venæsectiones.

*Farrago sententiarum.*

*Epide-* *Art. 2074.* Interdum ophthalmia est *epidemica* & *contagiosa* ex aere inclementiori. In curanda ophthalmia aliquando apprime convenit *venæsectio* in pede ob maiorem revulsionem. Ubi humores sunt acriores, & corrosivi collyriis addenda sunt remedia *fixa metallica*, viz, *tutia preparata*, *lapis calaminaris*, *cerussa*, *sacchar. saturni*, imprimis *flores Zynci*, & *flores Jovis*, quos *Barbette* insigniter commendat. In levi inflammatione frustum *carnis vitulina*, vel *bovine* applicatum morbum discutit. *Etmullerus*.

*Progn-* *Art. 3075.* Ophthalmia ab uno oculo ad alterum facillime, ac citissime frequenter transit. Tumor, sicut aliarum partium *Phlegmones*, vel medicamentis discutitur, vel ad suppurationem, & disruptionem vergit, & exinde ulcera *confectaria*, vel denique, quod pessimum est, *intempestivo* & *imprudenti* frigidorum Topicorum ac revellentium usu *gangrenescit*. Medici præstantiores uno ore monent; ne topica in principio ophthalmiæ applicemus; multi enim cæci facti sunt medicamentorum copia.

*Ophthalmia scrophulosa.* *Art. 2076.* „ Ophthalmia frequentissime est *scrophulosa*; quo in casu præter *evacuantiare-* media *mercurialia* & *specifica* exhibenda sunt, „ item *millepedes* & *herb. euphras.* in *cerevisia* infus. pro usu communi per longum tempus; sed „ præ omnibus, quotcunque mihi hætenus innotescunt, *aque minerales cathartica*, quales „ sunt *Ebeshamenses* & nostræ *Alfordenses*, *Lid-* „ *for-*



„ *fordenses, Holtenses, &c.* diutius epotæ mor-  
 „ bum hunc pertinacissimum subigunt, aut sal-  
 „ tem inducias paciscuntur, ut aliquoties ob-  
 „ servavi. Pro usu externo collyrium sequens.  
 „ ℞. *Mercur. dulc.* ℥ij. teratur in mortario lapi-  
 „ deo affundendo *aq. ros.* ℥ij. per 4. vices, &  
 „ agitetur pistillo ferreo candenti toties calefa-  
 „ cto. Prodest interdum *cataplasma de pomis Ful-*  
 „ *leri*, & etiam fons sequens *Boyleanus*, ℞. *Flor.*  
 „ *melilot. sambuc. calend. ana* Mj. *sem. lin. fœnugr.*  
 „ *cymín. psyl. cydon. ana* ℥ss. *hord. perlat.* ℥ss. coq.  
 „ in aq. fon. & vin. canariens. ana p. æ. ad ℔j. pro  
 „ fectu in doloribus magnis.

*Art. 2077.* D. Cheyne in Tractatu suo de Ar- *Virtus*  
 chritide testatur *Æthiopem mineralem* larga dosi *Æthio-*  
 bis in die sumptum diuque continuatum spem *pis mi-*  
 Medici nunquam destituere in cura Ophthalmiæ *neralis*  
 inveteratæ, immo etiam si *Scrophularis* sit.

Cataplasma sequens Etmulleri in gravissimis  
 inflammationibus dolorem sedare solet; ℞. *Pulp.*  
*pom. dulc. assat.* q. v. *alb. ovi unius cum sacchar. cry-*  
*stal.* bene conquassat. *camphor.* gr. xij. misce.]

Stercus vaccinum more Cataplasmatidis tepidum  
 animali oculo appositum Ophthalmiæ mederi di-  
 citur. Ex Ephemer. Leopoldin.

### Oedema.

*Art. 2078.* Oedema oculi est inflatio, sive Tu- *Oedema.*  
 mor Oedematofus in albo oculi, i. e. in tunica  
 conjunctiva sine coloris mutatione, valde pro-  
 minens; est malum satis conspicuum. Cum pru-  
 ritu mordaci plerumque incipit, tanquam locus  
 ictus esset *spiculo apis vel culicis morfu*; frequen-  
 tius in æstate quam hyeme accidit. *Banister.*

*Art. 2079.* „ Est etiam alia species Oedematis  
 „ oculi minus recte a quibusdam authoribus sic

„ vocati, quod nihil aliud est quam Emphysema  
 „ in palpebris contingens: horum posterius fre-  
 „ quentissime vidi, & etiam prius semel vel bis  
 „ conspexi; sed hoc ad alium Articulum perti-  
 „ net. *Art. 2025.*)

*Curatio.* *Art. 2080.* Ad hujus curationem, ut recte fiat; præter alias appropriatas evacuationes *cucurbitulæ* cum scarificatione humeris sunt affigendæ; topica quod attinet, *fotus* ex discutientibus Vino & Aqua incoctis sunt proficui, ut etiam *Mucilag. sem. lin. & fœnugr. cum solutione Myrrh. & aloë in aq. rosar.*

### Hydrophthalmia.

#### De Gorter sententia.

*Species alia.* *Art. 2081.* Si loci sub oculis, aut ipsæ palpebræ intumescunt hydrophthalmion vocatur; ipsius autem oculi excrescentiam ab augmento humoris aquei hydrophthalmiam vocant, quæ epithemate, & collyrio adstringente curanda.

#### Platneri sententia.

*Hydrophthalmia diagnofis, & curatio.* *Art. 2082.* Hydrophthalmia oritur, si in oculo venulæ limpidium humorem absorbentes obturatæ sunt. Oculus intumescit cum aliquo etiam dolore, adeo, ut is palpebris operiri nequeat. Id vero ex variis causis fieri potest, plerumque vero ex graviori ictu, & si medicamenta reprimentia diu superhabita fuerunt. Perforandus est oculus acu, scalpello ancipiti, vel alio ferramento, quod fistulam habet ei similem, per quam hydropicis aqua ex ventre emittitur. Illud vero ferramentum, quod scleroticam, uveamque transire debet, ei loco admovendum, demitendum,  
 que





adhibenda sunt, ne materia ad pterygii, genesin remaneat. Faciunt hoc testæ ovorum, conchæ calcinatæ, tutia, pompholyx, nihil album, os sapiæ præparatum, crocus metallorum, aquæ ophthalmicæ cum modo dictis pulverulentis mixtæ ex. gr. rosar. flor. cyan. Euphras. Saccharum in vase cupreo ad cæruleum fere colorem tinctum, ope succi chelidonii, vel aquæ hyssopi.

*Ejus  
perfora-  
tio.*

*Art. 2085.* Quando autem remedia non sufficiunt, tum operatio est instituenda: videlicet tunica cornea, extra iridem in parte sui inferiore lanceola pertunditur, ut materia ibidem collecta cum humore aqueo profluere possit. Promovetur ejus exitus, si necessarium fuerit per blandam bulbi compressionem; deinde collyrium applicatur, ut vulnusculum corneæ inflictum, consolidetur. Plerique parant hoc collyrium ex aqua plantaginis, cum albumine ovorum conquassata, & momento croci, ac sanguinis draconis.

*Cautele  
& moni-  
tus.*

*Art. 2086.* Humorem aqueum post operationem restaurari observatum est. Quando vero cicatrix oculum reddit deformem aliud collyrium subiungitur, nempe ex aq. plantag. partibus viij. sacchar. cand. alb. part. ij. tut. præp. parte j. lapid. calamin. parte semis.

Cavendum ne incisio nimis profunda fiat. Ad hoc evitandum *Meckren* peculiarem lanceolam parari curavit. Sufficere autem potest ordinaria lanceola, si emplastro quodam obex ponatur.

### Phlyctænæ.

#### *Covvardi sententia.*

*Art. 2087.* Phlyctænæ sunt ulcera nunc in ad-na quid. nata, nunc in tunica cornea emergentia, velut tot minimæ vesicæ aqua repletæ, quales solent aquæ



aquæ ferventis in aliquas corporis partes affusione excitari, vulgo apud *Anglos Blysters in the Eyes* appellantur, & instar granorum milii apparent, & cum usitatus ab acri, & corrodente humore producantur, vehementem dolorem & lancinationem pariunt. „ Hæ pustulæ in tunica „ cornea *albide* sunt, in adnata rubescentes.

*Art. 2088.* Præmissis rite evacuantibus; *dis-* *Indica-*  
*scatientia* & *exsiccantia* conveniunt, quæ varian- *tiones*  
da sunt, prout morbus sit in augmento, statu, *curati-*  
vel declinatione. „ Detergendæ sunt Phlyctænæ *va.*  
cum melle rosar. addito pauxillo unguent. *Ægyptiac.*  
vel cum pulvere nicotianæ (cum cautela usurpato.)  
Post deterfionem sanandæ, & exsiccandæ sunt  
cum Collyrio ex *Aq. plantag. & Trochisc, Alb. Ras.*  
*Kennedy.*

### *Anthracosis.*

*Art. 2089.* Anthracosis sive Carbunculus oculi *Anthra-*  
est Tuberculum gravissimum in oculo ex inflam- *cosis.*  
matione nascens, & ad Ophthalmiam referri po-  
test.

### *Synchysis*

### *Celsi sententia.*

*Art. 2090.* Solent etiam carbunculi ex inflam- *Curatio*  
matione enasci, nonnumquam in ipsis oculis, *carbun-*  
nonnumquam in palpebris: & in ipsis oculis *culi in*  
modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc *bulbo o-*  
casu alvus ducenda est, cibis minuendus, lac *culi.*  
potui dandum, ut acria quæ læserunt, leniantur.  
Quod ad cataplasmata, & medicamenta perti-  
net, his utendum, quæ adversus inflammationes  
valent. Atque hic quoque Nilei collyrium opti-

mum est, quod habet nardi Indici, papaveris lacrymæ ana part. j. gummi part. j. Croci part. ij. fol. ros. recentium part. iv. quæ vel aqua pluviali vel vino austero coguntur.

Curatio  
carbun-  
culi in  
palpe-  
bris.

Art. 2091. Si tamen carbunculus in exteriorē palpebræ parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum: aut, si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

Synchy-  
sis.

Art. 2092. Synchysis est humorum oculi confusa admixtio ab ictu, vulnere, vel contusione violenta, vid. vulnus seu contus. oculi.

Pterygium.

Ettmulleri sententia.

Morbi  
descri-  
ptio.

Art. 2093. Pterygium, vel Latinis Unguis, seu oculi pannus, est tunica quædam præternaturalis ab uno oculi angulo, frequentius interiori, enata, quæ successive accrescendo tandem ad pupillam pervenit; interdum est tenuis, albidâ, interdum crassior, & carnosior, aspera, dolorosa, imo cancrosa, quæ non est attingenda.

Curatio.

Art. 2094. Commendatur ablutio oculorum, cum proprio lotio matutino, usurpanda sunt remedia *abstergentia*, ut *saccharum cand. os sepiæ*, *crocus*, *vitrum*, vel *butyrum Antimonii*, succus *chelidon. maj. vitriol. alb.* In malo pertinaciori tuto confugiendum est ad *Mercur. sublimat.* item *succus formicarum rub. express.* & cum aq. ophthalmica appropriata permistus commendatur.

Differen-  
tia.

Art. 2095. Ungulam oculi distinguere solent in *membranosam*, *varicosam* & *adiposam*; membranosa, alias panniculus appellata, est excrementitia carnosa ac nervosa, quæ operationem valde dubiam, & incertam admittit; nec tractabilior est secunda specie cultro tentanda, pro-

pter



pter insignem venarum dilatationem & turgentiam; ultimam adiposam scilicet coloris albicantis, & substantiæ quodammodo pinguis, reliquis duobus benigniorem tuto extirpare licet, de operatione consulatur *Author*, ut etiam *Celsus*.

*Art. 2096.* Si Pterygium sit recens, *erugine*, *Curatio*  
*alumine usto*, *sacchar. cand.* &c. absumi potest, & *Pro-*  
*gnosis.*  
*gnosis.*  
 fel animalium fere omnium valde commenda-  
 tur. Pterygium revera est malum periculosum,  
 & curatu difficillimum; est etiam frequenter con-  
 tagiosum ab uno oculo in alium transiens, &  
 fere semper metus est, ne cancrosum evadat.

*Platneri sententia.*

*Art. 2097.* [Pterygium membranula tenuis, *Morbi*  
 nervosa, colore parum a cornea differens, etiam *acurata*  
 aliquantum pellucida incipit plerumque a narium *descri-*  
 parte, & caruncula lacrymali, rarius a parte *ptio.*  
 temporum, crescendo vero pervenit ad corneam,  
 quam etiam contegit; major item ei crassitudo  
 accedit, & quando multo crassior, etiam plura  
 vasa habet sanguine rubro conferta, unde panniculus  
 potius quam pterygium dicitur.

*Art. 2098.* Hæ membranæ penitus ad oculum *In recen-*  
 hærent, &, si inveteraverunt, medicamentis *ti morbo*  
 haud discutiuntur, scalpello difficiliter tolluntur. *remedia.*  
 Experimenta tamen prius medicamenta, quæ non  
 alia sunt, quam quæ in extenuandis cicatricibus  
 adhibentur, videlicet mel cum formicis, lapis  
 divinus aqua solutus, vel aqua Hartmanni me-  
 diante penicillo, admovenda, quibus postea mel  
 super datur. Quod si vero hæc vitia his non ces-  
 serint, ea scalpelli operam postulant, ad quam  
 vero non temere properandum est, cum res in  
 ipsa curatione aliquod tormentum habeat, & raro

ad sanitatem, instaurandamque oculorum aciem satis proficiat. Supervenire etiam solet magna inflammatio: quare etiam numquam hæc chirurgia satis tuta est, nisi ophthalmia omnis prius fuerit discussa. Ea etiam Vere esse debet, aut medio Autumno, fractis jam æstibus, nondum vero ortis frigoribus.

*Ante  
chirurgi-  
cam ope-  
rationem  
observa-  
tio.*

*Art. 2099.* Ubi autem illam curationem experiri statutum est, ante aliquot diebus chirurgus sedulo oculum, qui curandus est, contueri debet, ægrum vero jubere, ut is interea eum huc illuc volvat. Videndum enim est, num sub his motionibus in pterygio, vel panniculo, qua parte ruga fiat, quæ significat, eo loco id vitium oculi non ita adhærere. Nam ibi in ipsa curatione primum membranulæ apprehendendæ sunt.

*Chirurgica ope-  
rationis  
descri-  
ptio.*

*Art. 2100.* Si vero id quod supercrevit excidendum est, æger supinus in lectulo debet collocari, & a ministris contineri. Acus incurva minor linum ceratum trahens per illam panni, & pterygii rugam trajicitur. Posita acu lini capita apprehenduntur, & per ea membranula erigitur. Oculus immobilis præstandus est instrumento, quod speculum oculi vocant, & quod alius minister admoveere debet. Quia hoc, sic dictum, speculum impedimento esse potest, fere melius est, si minister diducit superiorem palpebram, chirurgus vero inferiorem, inter quæ æger monendus, ut stabili, & irretorto oculo sit. Levanda post membrana est, vel lino, vel mediante hamulo acuto, vel alio composito a *Woolhousio* *arachnopodion*, Gallice *Patte d' Aragnee*, Italice *pie de di Ragno* dicto. Necesse vero est, ut hoc temperata manu fiat, ne aliquid ex oculo sece- tur. Præstat enim aliquid relinquere, quod post medicamentis resolvi potest, quam oculi tunicas ledere, quæ difficilem curationem recipiunt.

Ca.



Cavendum est ne ex angulo caruncula abscindatur, neve illa, dum vehementius id, quod exciditur, ducitur, sequatur ac decidat. Si enim abscissa, vel abulsa est, patefit in angulo foramen, per quod postea semper humor descendit, quod vitium *Dyas* dicitur.

*Art. 2101.* Exciso vero panniculo, vel pterygio, sanguis statim multus fluere solet, maxime, si prior exsectus fuit. Eam vero nequam coarcere oportet, sed interea oculum calida eluere, ac fovere. Si vero, id quod plerumque accidit, majoris inflammationis timor est, ad illam avertendam omne medentis consilium dirigi debet, & adhiberi omne auxilium, quod vel maxime adversus ea potest. Noctu oculus devinciri potest, ita tamen ut aliquid intereum sit & palpebras, ne cum his cicatrice concre-scat. Ab initio idonea sunt grana hormini, post vero unguentum *VVoolhousii*, quod componitur ex flore aris loto, & levissimo, quod butyro sine sale, vel teneriori axurgia, excipitur, & cum hac conteritur. Quo etiam cornea purior ac pellucidior fiat, conducit collyrium, cui crocus metallorum admixtus est; nec inutile est saccharum in stanneo vase contritum.

*Quid post sectionem faciendum.*

### *Proptosis.*

*Art. 2102.* Proptosis seu Straphyloma est re-  
vera *Hernia oculi* & isto nomine designari debet: disrupta etenim tunica cornea quocunque accidente uvea seipsam protrudit, tumorem vel *Ramicem* faciens, qui a similitudine aliquali rerum quarundam varia apud Græcos sortita est nomina, uti *Straphyloma*, *Melon*, *Elelos*, *Myoccephale*, &c. (Vid. *Art. 2154.*)

*Proptosis.*

*Art. 2103.* Quoad curam in principio haud in-  
con-

*Curatio.*

congruum erit experiri, quid valeant *Collyria astringentia*, si ex horum usu spes frustretur, ad chirurgicam operationem accedendum est, nimirum ad evacuationem humoris aquei per *paracentesin*, quæ periculo vacat; iste enim humor de novo supplebitur, & vulnusculum curatu non est difficile.

*Ruesii sententia.*

Morbo  
integram  
corneam  
non oc-  
cupante.

*Art. 2104.* Si nondum integram corneam *staphyloma* occuparit per ejus medium acuta, & curva acus cum annexo filo sericeo transmittatur, tum dempta protinus acu, duo filii sericei capita paululum contorta sinistrae manus digitis apprehendantur, & scalpello aut phlebotomo deinceps paulatim sub filo tumore resoluta forficis adjumento tandem penitus rescindatur. Deinde spiritus vini aqua dilutus, perinde ut post cataractæ operationem fieri solet, super oculum ægrum imponatur. Sic enim non ipsum modo *staphyloma* tollitur, sed cornea quoque aut penitus glutinetur, aut non nisi exiguum foraminulum in medio vulnere remanet, unde humor aqueus ea proportionem, qua intus in oculo excernitur, continuo equidem profluit, sed sine ulla fere ægotantium molestia, quia una cum lacrymis leniter ad nares per vias lacrymales defluit.

Morbo  
totâ cor-  
neâ oc-  
cupante.

*Art. 2105.* Ubi vero totam corneam *staphyloma* tenet, ea est hujus Auctoris curandi methodus, qua non ipsa tantum cornea, sed iris quoque, & uvea cum albuginæ proximæ annulo ad latitudinem lineæ circiter excinduntur. Tunc enim humores omnes ex oculo profluunt, oculus in formam minoris oculi contrahitur, ipsumque deinde vulnus clauditur. Quibus ita confectis oculus artificialis immittitur; atque is qui-  
dem



dem non alteri tantum oculo quam maxime similis esse debet; sed ipsi quoque parti afflictæ, quam exactissime adaptatus. Sic enim hic oculus artificialis ad instar oculi naturalis, huc atque illuc moveri per musculos oculi consuevit, ut a multis pro oculo artificiali non agnoscat, sed pro sano ac vero oculo habeatur.

### *Rhexis.*

*Art. 2106. Rhexis est Tunicarum oculi ruptura Rhexis.*  
*cum humorum effluxu a vulnere*, contusione violenta, vel ingenti exulceratione orta, cœcitatem perpetuam inducit, si humores omnes emanarunt. Nihilominus vero Globus oculi in hoc casu quandoque humore aquoso replebitur, utcunque tamen haud usque ad dimensionem naturalem: in hoc statu oculo artificiali vitreo deformitas eleganter resarcitur. Si solus humor aqueus reliquis in oculo manentibus effluerit, natura frequenter hunc denuo suppeditat, & oculi pulchritudo ac visio conservantur.

*Art. 2107. In hisce gravissimis oculorum læ-* *Curatio.*  
*tionibus* semper convenit *venesectio* quam ocissima, item *enematum* injectiones, & in vulnus vino rubro cum exiguo melle prius ablutum, instillandus est *sanguis columbinus* ex animali vivo, vel mixtura ex *melle rosarum vitell. ovor. & lacte muliebri* adhiberi potest, & superimponendæ sunt lintæ *albumine ovorum cum tantillo alumine bene agitato imbutæ*. Post hujusmodi Medicationem aliquandiu continuatam *Collyrium ex Myrrh. Aloe & Croc. in Aq. Rosar. usui erit.*

## Oule sive cicatrix

## Covvardi sententia.

*Albugo* *Art. 2108.* Albugo seu Leucoma est macula  
*quid? Va-* corneæ albescens; quo latior & crassior est, eo  
*rietas, &* magis visum obscurat, & quo magis corneæ su-  
*progno-* perificiei incumbit, eo magis albicat, & quo  
*sis.* propius ad nigredinem vergit, eo altius suas  
 egit radices, & vix curabilis existit. Quæ e ci-  
 catrice relicta exoritur difficillime dissipatur,  
 quæ *ophthalmiam* sequitur, frequenter sua sponte  
 facessit.

*Curatio.* *Art. 2109.* Totus curationis cardo in *emollien-*  
*tibus, resolventibus, seu discutientibus,* vertitur,  
 quæ tamen cum summa cautela sunt usurpanda.  
 Pro cicatricibus tollendis *topica* actiora, imo  
*cathartica* aliquando prudenti manu adhiberi  
 debent, & primo tentanda est via lenioribus,  
 & postea ad fortiora licet devenire. *℞. Rad. al-*  
*the. ℥j. folior. malv. euphrag. chelidon. maj. ana Mj.*  
*sem. lin. fœnugr. ana ℥iij. flor. melilot. p. j. coq. in*  
*aq. font. q. s. ad ℔ij.* hujus decocti vapor oculis  
 apertis calide excipiatur frequentissime. Mallem  
 ego in his oculorum medicamentis utendis for-  
 mam *fomentationis*, quam *vaporis* commenda-  
 re, præcipue si eidem decocto, dum caleseat,  
 pauculas *salis* seu *spiritus alicujus volatilis* gut-  
 tas instillaveris, quod tum forte prodesse pote-  
 rit, nisi nimiam affuderis spirituum quantita-  
 tem, quæ oculorum tunicas feriat, & irritet.  
 Alii utuntur *saccharo cand. in aq. fœnicul. seu*  
*euphrag. [solut. Succus fœnicul. vel chelidon. cum*  
*guttulis aliquot balsam. Peruv. potenter albugi-*  
*nem discutit, inquit Riverius. Sequens ex Ri-*  
*verio feliciter expertus sum; ℞. Aq. ros. ℥iv. dis-*  
 solve



solue in ea paulum *salis armoniac.* ita ut linguam feriat, deinde imponatur in vase aurichalceo, donec *caruleum* colorem acquirat. *Fella animalium* præcipue *lucii piscis*, succus *chelidon.* &c. sunt remedia calida & acria, ideoque convenit ea excipere mucilaginis *gum. tragacanth. sem. cydon. &c.* vel cum pulv. *Trochisc. alb. rhas.*

*Ettmullerz sententia.*

*Art. 2110.* Albugo seu Leucoma est cicatrix *Pro cicatrice in*  
 albida post variolas, vel alia ulcuscula in oculo. *oculo.*  
 Pro nubecula & albugine delenda conveniunt *Reme-*  
*dia ali-*  
*quot.*  
*Scarifi-*  
*catio O-*  
*culi.*  
*fel anguilla, ol. papyri, succ. chelidon. maj. aq. sa-*  
*phirin. mercurius sublimatus.* „ Solenne est apud  
 „ Chirurgos Gallicos ad vitium amovendum ope-  
 „ rationem instituere, quam vocant *scarificatio-*  
 „ *nem oculi.* Instrumentum ad hoc opus perfi-  
 „ ciendum, quod *Scarificatorem* nominant, fit  
 „ ex aristis hordeaceis. N. xx. vel xxv. puta, ad  
 „ instar penicilli colligatis; cum hujusmodi au-  
 „ tem scopis sive verriculis oculum abradunt;  
 „ quandoque usque ad effusionem exigui sangui-  
 „ nis, alternis vel tertiis forsan diebus idem re-  
 „ petendo ad quartam, quintam vel plures vi-  
 „ ces; finita in hunc modum singula scarifica-  
 „ tione oculus cum aqua tepida multoties ab-  
 „ luunt, imo fere continuo per totum diem,  
 „ & deinde noctu pulpam pomi assati applicant:  
 „ atque hæc est scarificationis methodus; accu-  
 „ ratiorem vero aliam operationis methodum,  
 „ non modo in hoc vitio, sed etiam in quibus-  
 „ dam aliis oculorum affectibus nos a laudabilio-  
 „ ribus mutuatam *Scriptoribus cuilibet titulo ad-*  
 „ jiciemus.

## Farrago sententiarum.

*Albugo  
a relicta  
cicatrice.*

*Art. 2111.* Ex ulceribus necesse est cicatricēs fieri, quæ si in cornea membrana perlucēte sunt, aciem hebetiorem reddunt, & si crassiores fiunt, omnem corrumpunt. Quare opera danda est, ut, quæ tolli nequeunt, extenuentur. Compertum vero est, minus altas, levesque cicatrices, si infantibus obtigerunt, pedetentim, adolescente ætate, sponte extenuari, id quod in adultis, nec operosa arte, obtineri potest. Hæc curatio longa esse solet & anceps, nec adhiberi potest, nisi prius omnis inflammatio conquieverit.

Si cicatrix recens est, & minime crassa, illam digerit, tollitque medicamentum, quod paratur ex melle. Hoc necesse est, ut excipiat plurimas formicas, cum quibus, vel solis vel elibani calore coquitur. *Platnerus.*

*Albugi-  
nis Cu-  
ratio va-  
ria est.*

*Art. 2112.* Si quis autem feliciter instituere albuginis curationem voluerit, is equidem ad ipsas morbi causas accomodare ipsam debet. Namque ubi forte ab intus intra corneæ laminas inspissatis, achærentibus humoribus maculæ provenerunt, neque nimis jam tum invaluerunt, longe optimum erit a sollicitata victus ratione atque internis præcipue medicamentis digerentibus, & cum primis infusis, vel decoctis sudoriferis diligenter atque largiter adhibitis, salutis præsidia petere. Sed simul tamen extrinsecus uti venæsectionibus, scarificationibus, emplastris veficatoriis ex cantharidibus, pediluviiisque frequentioribus oportebit. Super ipsum oculum ægrum sacculos digerentes ex hyssopo, rore marino, flor. chamomillæ, sem. fœniculi &c. atque vel in aqua, vel in vino coctos quam frequentissima super



super imponere; vel collyrium aliquod ex aqua fœniculi aut valerianæ admixta sp. vin. portioncula confectum identidem superimponere conveniet. Si quæ autem venæ tumentes e tunica albuginea ad maculas processerit, utilissimum erit per adhibitam acum curvam minorem utrinque acutam aut forcem, aut phlebotomum strenua sed probe tamen simul temperata manu easdem rescindere. Denique si plane inveteratum malum est, quidvis potius, quam sanationem expectare licet.

*Art. 2113.* Si ex abscessu quodam intra lamellas tunicæ corneæ, post præviam inflammationem aliquam suborto, maculæ proficiscuntur, atque materia contenta exteriorem corneæ tunicam instar margaritæ, aut perlæ, aut lentis elevat, unde morbus sæpe perlæ nomen assumpsit, emitti protinus post incisam corneam humor ille noxius debet, qui tunicam exteriorem expanderat. Namque maximum alias periculum est, ne nimis diu relicta intus materia noxia ipsam corneam paulatim erodat, insanabilemque proinde cœcitatem inducat. Ejici autem quam commodissime humor ille potest, si aut phlebotomus, aut acus quædam ocularia per tunicam corneam ad abscessum usque semel, atque iterum, vel pro renata, sæpius per intervalla etiam dimittitur adhibitis postmodum medicamentis adstringentibus, vel viperarum pinguedine instillata, quo nempe facilius plaga inflicta sive punctura purgetur, & glutinetur. Ita enim quandoque visus restituitur; verum ubi paulo altius, neque proxime super exteriores corneæ lamellas humor ille noxius delitescit, oculorum acies ut plurimum perit. *Heisterus.*

*Si macula ex abscessu proveniant.*

*Art. 2114.* Quod autem extrinsecus erosa, *Albugo*  
vel ab abscessu quodam atque inflammatione in- *ex erosio-*  
*festata* *ne corneæ.*

festata cornea deprehenditur, inflammatio ante omnia curetur, deinde aqua viridis Hartmanni in oculum ægrum sæpius instilletur. Admirabilis enim hujus aquæ virtus est in sanandis hujusmodi corneæ maculis.

Ex pu-  
stulis va-  
riolis &  
ambu-  
stionibus.

Art. 2115. Si demum pustulæ ardentes corneam infestant, quas *uritides* nonnulli vocant, atque margaritæ vel granuli millii instar super eadem prominent, vel pustula quædam in variolis, aperire ipsas acicula convenit, ut inde humorem contentum emittant, demptaque deinceps per adhibitam aciculam, phlebotomum, aut proprium aliquod ferramentum, relicta pellicula, quam diligentissime per dies singulos pulveris ex alumine, saccharo candido, atque ovorum testis præparati granulum lentem circiter adæquans, in oculum ægrum immittere, vel etiam linteoli combusti oleo eundem inungere. Sic enim quicquid forte superstes est de maculis sensim evanescit. Similis plane curandi ratio adhibenda est, quoties propter ambustionem aliquam pustulæ ex tunica cornea pronascuntur. *Tves.*

Albugo  
insana-  
bilis.

Art. 2116. Vix unquam profecto curationem eæ maculæ admittunt, quæ aut a vulneribus, & cicatriculis, aut ab abusu collyriorum vitriolicorum ortæ sunt: nec non illæ, quæ aut nimis jam tum invaluerunt, aut corneam prorsus opacam reddiderunt; aut denique ubi nativa oculi, vel corneæ tunicæ forma corrupta adest.

### *Hyposphagma.*

Hyposphagma. Art. 2117. Hyposphagma sive *suggillatio* oculi est sanguinis exitu vel lapsu, ruptis aut contusis vasis, vel alio modo apertis, in oculorum tunicis adnata, vel cornea, in eademque effusio; colore primum rubro, postea livido vel nigro.

Cui



Cui malo & hoc accidit, si corneam magis occupet, objecta omnia colorem ad rubrum vergentem præ se ferunt; nam & ad corneam venulæ porriguntur, ea parte, qua iridem spectat; & ex vicinis vasis sanguis in eam effundi potest.

*Art. 2118.* Si malum sit ingens, opus est venæsectione & purgatione, & topica debent esse discutientia. Galenus in initio fotum usurpat ex decocto *Foenugraci & Meliloti*, & postea astringentia. Sennertus ait in oculorum suggillationibus optimum esse sequens cataplasma. *℞. Rad. symphyt. maj. ℥vj. sigil. Salemon. ℥ij. flor. sambuc. ℥i℥. farin. fabar. ℥j. coq. in q. s. aq. font. Decoctum sit pro fotu, & ex radicibus, &c. f. cataplasma.*

*Junckeri sententia.*

*Art. 2119.* In Suggillatione: idest quando macula lata sanguinea in oculi albo a gravi contusione, vel ictu exoritur, propter vasculorum in tunica adnata ruptionem, & sanguinis hinc stagnationem, conducunt sacculi discutientes camphorati, vel sp. vin. camphor., leviter crocatus linteis applicatus.

*Gandolphi sententia.*

*Art. 2120.* Si sanguinis largior copia suggillationem fecerit, quam ut digeri absque coactione aliorumque incommodorum periculo possit, aperiri protinus cornea debet, ut inde cruore emisso naturalis videndi potentia, quantum fieri potest, vindicetur. Historiam lubet ex *Acad. Paris. Hist. Ann. 1709. pag. 16. edit. Amstel.* huc facientem in medium adducere. Postquam enim quidam gravem in oculo

plagam seu contusionem acceperat, ut propter nimiam cruoris intus effusi copiam nihil amplius cernere valeret, facto vulnere transverso cornea perforabatur, sanguineque ita feliciter emissio, ut non dolores tantum fere nullos æger senserit, nec noxia cicatrix remanserit, pristinam videndi potentiam sine detrimento recuperavit; ut ut ter propter copiam, & firmitus hærescentem cruorem tunicam corneam aperire necesse fuerit. Ad promovendam autem glutinationem spleniis in mixtura ex aquæ plantag. unc. iv. & aquæ vulnerariæ unc. ij. præparata tinctis per octiduum circiter opera impendebatur, quo quidem elapso tempore usque adeo feliciter absoluta curatio fuit, ut ab oculo sano atque integro is, qui plagam atque Medici ferrum expertus fuerat, plane non differret; nisi fortassis in eo, quod paulo ampliorem haberet pupillam: tamen hoc non tam ab operatione chirurgica, quam potius ab ipsius plagæ vehementia profectum esse videretur.

### Cataracta

#### Couvardi sententia.

*Definitio.* Art. 2121. Suffusio sive cataracta est pupillæ obstructio ab opaco aliquo interposito inducta, quæ visum minuit, aut extinguit. Causæ hujus

*Causa.* affectus sunt ut plurimum obscuræ, aliquando tamen evidentes, uti contusio, nimis assidua ad lucernam lectio, balneorum usus inordinatus, & in genere quicquid fluxionem ad oculos promovet; *epiphora* nonnunquam in *cataractam*

*Differentiæ.* transit. Differentiæ suffusionum sunt variæ, nempe 1. ratione crassitie, vel tenuitatis materiæ, ex qua pellicula constat. 2. ratione coloris, an alba



alba sit, vel nigra, citrina, vel viridis, aut subfusca, 3. a situ, num etenim uveæ, num corneæ propius adhæreat: Certum enim est cataractam semper inter *uveam* & tunicam *scleroticam* contineri, in quo nunc humore aqueo, instar syndonis, innatare & fluctuare videtur, nunc firmiter tunicis, præsertim uveæ, adhærescere.

*Art. 2122.* Suffusio in initio discuti potest, ut *Curatio-* multi fidei integerrimæ authores testantur, Suffusio nigra, nec medicamentis, nec acu curabilis est. Sequens est optima regula de cataractis, scilicet; *si quando videatur accrescere, & discutientium medicamentorum vires excedere, sufficienti temporis serie permittatur callescere, donec acui depositoryæ idonea naturaliter reddatur.* *Operatio.* Modus operationis perficiendæ unicus est; intrudendo, scilicet, acum depositoryam per adnatam, & corneam e minoribus oculorum angulis versus nasum, & cataractam eadem involvendo, tandemque ad oculi basin deponendo, ut ibidem resideat, seu leni manu figatur. Post hæc usitatum est, quietem per plures dies patienti imperare, vel in lecto, vel extra, & *stypticis* aliquibus seu medicamentis *agglutinantibus* oculum male affectum obducere.

*Art. 2123.* Statim post operationem simul ac *Post operationē* acus oculo evulsa fuerit, instillandæ sunt guttæ aliquot *sanguinis columbini* a vivo animalis, & toti oculo superimponentur lintæ duplicatæ *albumine ovorum cum frustulo aluminis* *conquasato & tantillo melle rosaceo bene irrigatæ.* *quid faciendū.*

*Art. 2124.* Suffusio, quæ a morbo aliquo *Prognosis.* graviore, a pertinaci cephalalgia, vel a contusione violenta ortum duxerit, est omnium longe pessimæ indolis. Suffusiones, quæ sunt

virides, vel cineritiæ, item quæ ferri rubiginosi, margaritarum, vel testudinis marinæ colorem referunt, acu curabiles sunt: e contra suffusiones nigræ, vel flavæ, item cretæ, plumbi, mali citrei colore similes, non attingendæ sunt. Præter colorem, ratio etiam habenda est substantiæ, & consistentiæ suffusionum, quæ a fricatione oculi palpebris apertis dignoscendæ sunt; frictio enim oculi cum digito suffusionem reddit latiore, & extensior cum vel sine disruptione; si autem pristinam figuram statim recuperat sine disruptione, operationem fausto eventu successuram esse sperare licet: sin vero ex frictione suffusio in partes, & frustra disiliat, operatio nullatenus molienda est, sed cunctandum est, donec suffusio firmior, & maturior evaserit.

*Nota* *Art. 2125.* De operandi modo alibi dictum *quædam.* est (*Art. 2122.*) sed in ipsa operatione quædam adnotanda occurrunt; ibidem minus memorata. In cataractis adhuc imperfectis interdum simul ac acus infigitur, statim oculus inundatione humoris lactei impleri videtur, quem ab ipsius cataractæ vesiculis acu sauciatis provenire credibile est. Quandoque oculus acu introducta cruore plenus conspicitur. Alias intromissa acu cataracta statim duplo grandior augeri videtur, tuberosis ostrearum testis (vel spermatis ranarum in paludibus) quodammodo similis. Hæc accidentia saltem ad tempus operationi impedimento esse solent. Cataractæ nonnullæ, utconque aspectu benignæ ac pulchræ ante operationem conspiciuntur, sunt tamen adeo tenaces ac rigide, ut acui depositoriæ obtemperare omnino respuant, & quoties infra detruduntur, toties iterum assurgunt. Aliæ etiam si septennes, vel octennes fuerint, sunt



„ sunt tamen *molles tanquam gelatina*, atque ita  
 „ vim acus eludunt. Aliæ *Uvæ* tam firmiter ad-  
 „ hærent, ut acu separari nequeant, atque hæ  
 „ sunt omnium pessimæ ab ictu, vel contusione  
 „ violenta ortum plerumque ducentes. Quod ad  
 „ accidentia antedicta, nimirum *humoris lacte-*  
 „ *scntis, cruoris, &c.* in operatione contingen-  
 „ tia, attinet, octiduo vel nondinuo plerum-  
 „ que sponte evanescere solent, reliquæ tamen  
 „ quædam aut fragmenta interdum manere pos-  
 „ sunt. Post operationem visio quandoque sta-  
 „ tim, sed frequentius circa nonum diem ali-  
 „ quatenus succedit, ast non perfecta, & fortis  
 „ ante duas, vel tres septimanas, vel forsitan tot  
 „ menses præteritos expectanda est: *Banister &*  
 „ *alii*.

*Pitcarnii Sententia.*

*Art. 2126.* Signum pathognomonicum a *Ri-* *Error*  
*Riverii,*  
*Plem-*  
*pili, &c.*  
*verio, Plempeio, &* aliis traditum suffusioni nul-  
 latenus convenit, nempe affirmant suffusionem  
 tum ingruere, cum varia simulacra ante oculos  
 volitant, pili, araneæ & similia, quæ apparitio-  
 nes ex omnium opinione, si perpetuo offeran-  
 tur, est vera & legitima suffusio: has apparitio-  
 nes ascribunt corpusculis humori aqueo inna-  
 tantibus, quæ cataractam efformant, verum na-  
 turam oculi ignorant: Nam corpuscula humori  
 aqueo innatantia nullum sensum in retina depin-  
 gunt; imo ea quæ corneæ exteriori adhærent,  
 nullam sui in retina picturam exprimunt, nec  
 cicatricis corneæ nulla est imago, neque obeam  
 vel eas (si plures sint) ullæ rerum obvolitan-  
 tium fiunt apparitiones: Ea enim est concavitas  
 retinæ, ut ad objectum in ea depingendum, hoc  
 est ad congregandos in uno ejus puncto omnes

radios, e quovis objecti puncto emissos, debeat objectum visibile removeri a retina ultra distanti-  
 am corneæ a fundo oculi : Hinc sequitur, si  
 incipienti cataractæ conjungantur etiam simula-  
 cra muscarum &c. tum oculi etiam *Gutta Serena*  
 laborant.

*Platneri sententia :*

*Quando  
 chirurgi-  
 ca ope-  
 ratio in-  
 stituen-  
 da.*

*Art. 2127.* Incassum tentata morbi discussionē  
 videndum est num manu curatio adhiberi pos-  
 sit. Hæc potissimum locum habet si non mul-  
 tum suffusio inveteraverit; nam ubi & lens, &  
 ejus velamentum, vitium contraxerunt curationi  
 non ita idonea est. Etiam supervacua, imo non  
 sine periculo est curatio per manum, si ea ad-  
 hibetur glaucomati, vel suffusioni, cui mydriasis  
 & Amaurosis accesserunt. Atque ipsius suffusionis  
 quædam maturitas est; Expectari igitur oportet,  
 donec suffusio dutitiem aliquam non nimiam  
 habere videatur, cujus rei indicium esse solet,  
 si homini lucis, & rerum, quæ oculis obversan-  
 tur, aliquis sensus relictus est; is vero, nec has,  
 nec colores satis discernere potest. Si tempus eli-  
 gere licet, curatio, vere, esse debet, vel autu-  
 mno, nondum ortis, vel jam fractis æstibus.  
 Etiam ratio servanda est menstruorum, & hæ-  
 morrhoidum, quarum venæ sanguinem fun-  
 dunt; curationem minus expectari debet, si hu-  
 mor in nares, fauces, vel pulmonem destillat,  
 & frequentes tusses, scretus, atque sternutamen-  
 ta, vel in capite dolorem, in corpore febrem,  
 movet. Necesse etiam est, ut eo die, quo æger  
 curabitur, cælum apertum sit, serenum, haud  
 nubilum, vel caliginosum. Et eum, qui curā-  
 turus est, recte valere oportet, cum ad hanc rem,  
 & oculorum acies clara atque acris, & manus  
 strenua ac stabilis requiratur.

*Art.*



*Art. 2128.* Ante curationem alvus aliquoties ducenda, & homo per aliquot dies modico, *Ante ea quid præstandum.* atque minus valenti cibo alendus est. Potioni vero præstanda est aqua vel pitana, aut alia ex potionum generibus imbecillissima. Quæ omnia plurimum ad avertendam inflammationem facere possunt, cujus quandoque metus esse potest. Eo ipso die ante curationem iterum alvus lotionem immissa solvi debet, ne desidendi necessitas ægrum surgere cogat.

*Art. 2129.* Acus res agenda est, non tamen *Quo in- Brumen- to.* nimis acuta, nec nimis tenui. Si enim nimis acuta est, lædi possunt minores arteriæ atque venæ in uvea, & processibus ciliaribus. Si autem nimis retusa est, ea ægrius, & non nisi premendo demittitur. Optima esse videtur cujus mucro paululum tenuatus, latior, non vero nimis acutus est. Habere debet manubriolum, & in hoc signum, ut si acus demissa fuerit, sciri possit, qua parte ea plana sit, qua tenuata. Fieri potest acusex ferro, satis duro, non vero fragili. Fere tamen melior est, quæ ex auto fit, quod crebrioribus mallei ictibus duratur. Si & ferro est, magnam curam, adhiberi oportet, ut omnis rubigo exteratur. Ob id illa, priusquam oculo admovetur, trajici potest per pannum laneum densum, qualis purpureus esse solet, & hujus frictione levigari. Etiam antequam demittitur, per labra, saliva madida, duci potest.

*Art. 2130.* Opus est medicamento ad coercendam inflammationem opportuno. Optimum est, *Cautela ad vevandam inflam- mationem.* quod componitur ex alumineusto, saccharo Saturni, vel æris flore, quem tutiam vulgo appellant. Hæc excipiuntur ovi albo, & adjecta aqua rosarum, spatula agitantur, miscenturque. Ex hoc autem liquore exprimitur panniculus,

qui protinus ante curationem superdatur alteri oculo, injectaque fascia adstringitur.

*Quomo-  
do locan-  
dus ager  
coram O-  
perario.*

*Art.* Locus lucidus esse debet ut chirurgus fer-ramentum in hominis oculo cernere possit; Nimia tamen lux, si oculo aliquis ejus sensus relictus est efficere potest, ut pupilla se nimium contrahat. Quare homo non lumine adverso feedeat, sed ut lux e latere in oculum, qui curabitur, admoveatur. Adverso sedili, paulo altiori, insideat chirurgus. Caput a ministro continendum, & immobile præstandum est. Etiamnum duo alii a lateribus objiciuntur, qui hominem labare non sinunt. Levi enim motu eripi acies in perpetuum potest. Linamentis igitur, & pennis super alterum oculum impositis, eo-que deligato, oculus, qui curationem ex manu postulat, digitis super palpebras collocatis, leniter perfricandus est, ut minores venæ, quæ aculædi non debent, inflentur, & se magis ostendant. Homo vero monendus est, ut oculum natum versus moveat, & immobilem faciat. Tum chirurgus altera manu palpebras diducit, altera acum admovet. Curari autem sinister oculus dextra manu, dexter sinistra, debet, acusque ea ratione demittis, ut digitu minimus, & alter, huic proximus, hominis temporis, & angulo oculi huic propiori innitatur.

*Quomo-  
do im-  
mittenda  
acus in  
oculum.*

*Art. 2132.* Demittenda est acus recta, per tunicas, loco fere medio inter corneam, & angulum temporis propiorem, ita ut nulla vena lædatur. Is locus opportunus est, qui a cornea spatium duarum linearum distat. Quamprimum acus in oculum penetravit, ea inclinanda ad ipsam suffusionem est, & vertendo alius imprimenda. Ubi ad suffusionem ventum est, ita inclinari debet manubrium, ut mucro acus, & ejus pars plana, supremæ suffusioni admoveatur. Hæc paulatim



latum deprimi, & infra regionem pupillæ deduci debet. Ubi hanc transit suffusio, ea paulo vehementius acu imprimi debet, ut inferiori parte sub humore vitreo infideat. Si hæsit, & homo ea, quæ ante oculum obversantur, videre potest, curatio expleta est. Protinus vero oculus obductis palpebris contegendus est, ne nova lux eum offendat. Acus educi debet, commissis prius palpebris. Omnia curiosius agenda sunt, ne interiores oculi partes lædantur.

*Art. 2133.* Post hæc linamenta ex supra dicta *Post operationem* mistura expressa imponi, & oculus devinciri debet. Primo die, tertia quaque hora, linamenta *regimen usque in septimū.* cum inaruerunt, iterum madefacienda sunt, ut inflammatio coerceatur. Si hujus major metus est, sanguinem mitti oportet. Numquam vero ante septimum diem palpebræ diduci debent, cum insueta lux oculum concitare possit, & efficere, ut suffusio redeat. Quiete opus est, & abstinencia. Homo supinus cubet, ita, ut caput excitatum sit. Cibus primis diebus non alius assumendus est, quam liquidus, ne maxillæ laborent. Ultimis diebus linamenta ex aqua tepida, cui parum spiritus ardentis admisceri potest, exprimi possunt, & super oculos dari.

*Art. 2134.* Septimo circiter die relevandus *Septima die quid faciendum.* est homo, resolvenda fascia, aperiendusque oculus in loco obscuro. Ubi is videt, necesse est, ut clausis fenestris, se in tenebris contineat, quo oculus pedetentim luci adsuescat; ob quam rem etiam oculus, panniculo quadrato, quod viridem, vel coeruleum colorem habet, commode contegitur, qui vero non fascia adstringitur, sed ita accommodatur, ut præ oculis pendeat.

## Farrago sententiarum :

Prognostica signa aliquot.

Art. 2135. Si suffusio sit profunda, & pupilla angusta appareat; intra sex menses plerumque confirmata evadit. Oculo digito compresso suffusio nonnihil diffuens & latior facta; postmodum ad pristinam magnitudinem revertens nondum matura est, si vero nullam patitur mutationem discuti potest. *Riverius*. Si oculus suffusione affectus soli obversus nullam possit lucem percipere; frustra est omnino operationis periculum facere; est etenim cataracta cum *Amaurosi* conjuncta, quod malum est incurabile. *Barbette*.

Opacitas humoris crystal.

Art. 2136. Cataractam revera ut plurimum nihil aliud esse quam opacitatem præternaturalem humoris *ChrySTALLINI* videre licet in *Transact. Philosoph. N. 373*. Et hanc fuisse opinionem plurimum Chirurgorum Gallicorum, viz. *Maitre Jean, Antoine, Brissan, Heister*, &c. ex horum authorum lectione plane constat: Cataractas autem membranosas rarissime occurrere fere omnes consentiunt. (vid. Artic. subseq.)

Acuum uncinnatam pro cataracta operatione inutilitatem.

Art. 2137. In Operatione manuali cataractæ Veteres usi sunt acu rotunda, & valde acuta. Chirurgorum nonnulli, qui præcipuam suffusionis causam a peculiari quadam tunica intus in oculo nata repetiverunt, ea præsertim instrumentorum genera adhibenda esse putarunt, quibus penitus extrahi ex oculo per vulnus acu inflictum membranacea cataracta posset. Verum enim vero frustraneum penitusque ineptum una cum instrumentis affabre cæteroquin constructis, hunc ipsorum conatum fuisse, non ex opinionis solum de membranula falsitate, saltem quatenus ordinaria cataractæ causa, sed etiam ex certæ experientiæ defectu apertissime innotescit.

Art.



*Art. 2138.* Novam dudum medendi cataractæ *Methodus nova Taylor.* rationem proposuit D. Taylor Anglus multis susceptis Itineribus celebris. Is enim mediante phlebotomo prius scleroticam incidit, viamque facit, per quam acum demittit, cujus forma latior est, habens mucronem altera parte gibbum, altera planum. Etiam utitur ferramento, quod speculum oculi vocant. Sed hac ratione vix prohiberi potest, quo minus per plagam hiantem, si oculus illo ferramento premitur, humor aqueus efferatur. Hoc vero si incidit, collabitur & cornea, & uvea, & vix sine noxa deduci potest suffusio. Quam item ob causam phlebotomo utatur, & non sola atque unica acu totam operationem perficiat, tum etiam cur longitudinalem, & non potius transversalem sive horizontalem faciat incisionem, rationem sane non dedit, neque etiam ullam idoneam perspicere licet.

### *Glaucoma.*

*Art. 2139.* Glaucoma est mutatio humoris crystallini in glaucum colorem humore cristallino *Glaucoma.* per exsiccationem condensato. *Oribasius in lib. viii. cap. 47.* dicit, Glaucomiam & suffusionem veteres unum eundemque morbum esse existimarunt. *Paulus Aegineta* idem asserit. Valde curiosæ sunt disquisitiones Gallorum de distinctione inter suffusionem & Glaucoma: *vid. Acad. Sci. Vol. XII. p. 47. item Vol. XXII. p. 36. &c.* Posteriores tamen *Græci* proprie Glaucoma saltem pro humoris crystallini in glaucum colorem mutatione accipiunt. Quod ubi fit, visio impeditur; nam humore isto pelluciditate spoliato species visibiles ad retinam perfecte transferri nequeunt. Cognoscitur hoc malum, quod citra pupillam insignis, & profunda appa-

apparet albedo, & omnia tanquam per fumum aut nebulam videntur. A cataracta ergo distinguitur, quod *albedo profundior* appareat ex cataracta *in ipsa pupilla & fere juxta corneam*. *Sennertus*. (vid. Art. præcedentem.)

*Farrago sententiarum.*

*Art. 2140.* Necesse est corrupto vitreo humore etiam lentem vitari *Platnerus*. Glaucoma inter initia per victus rationem, & medicamenta, quæ noxiam materiam digerunt, & in inferiora depellunt, discutitur. Si vero adolevit, nullam curationem recipit.

Glaucoma oritur ab exsiccatione, quæ fit vel ob ætatem, vel ob aliam causam *Jonstonus*. Hæc quidem frequentior causa est, unde oculus caligat, concavus fit, atque flaccidus, qui prementi nihil renititur, sed aliquando hoc idem vitium oritur, quia vitreus humor intumescit, corrumpitur, & obscurus evadit.

Glaucoma rarius suffusione occurrit, & pro insaniabili habetur. *Junkerus*, & *Taylorus* sub glaucomatis nomine nova prorsus ac inusitata significatione intelligit crystallini opacitatem, & incrementum, ita ut proxime oras pupillæ attingat, una cum capsula vitriata, sed hoc malum potius ob vitiatum ad pupillam situm pro quadam specie cataractæ habendum est.

*Situs Humoris Crystallini vitiatum.*

*Situs humoris Crystallini vitiatum.* *Art. 2141.* Est & aliud vitium humoris Crystallini, viz. *Situs naturalis mutatio*, ubi, scilicet, latiore sua parte, quæ lentis majoris instar compressa est, Pupillæ foramini non recta opponitur, sed vel sursum declinat, vel deorsum, vel ad



ad latera ; & quidem si Crystallinus humor situm mutet in uno oculo , in altero vero naturalem retineat ; vel si ambo difformiter situm mutant , ita ut alter sursum , alter deorsum , vel ad latera vergat , res geminatae apparent ; *mutatur enim planum* , ut loquuntur optici ; hic affectus , sicut antecedens , est omnino incurabilis . *Sennertus* .

### Epiphora :

#### Couvardi sententia :

*Art. 2142.* Epiphora est praeternaturalis oculorum defluxio , quae *Anglis* sonat a *Rheum in the Eyes* ; humore scilicet seroso acri fere continuo depluunt oculi genas excoriantes . *Epiphora quid.*

*Art. 2143.* Intentiones curativae sunt : 1. humoris peccantis alio derivatio per *venesectionem* , *cucurbitulas* , *vesicatoria* , *cathartica* , &c. 2. acrimoniae per remedia idonea correctio , quae prae-*Curatio.* rumque vino *chalybeato amaro* feliciter peragitur ; aliquando vinum simplex liberaliter epotum epiphoram sanat ( praecipue non assuetis idem bibere ) & postremo , praemissis recte praedictis evacuationibus , & alterantibus , *topica astringentia* adhibere licet .

#### Pitcarnii sententia :

*Art. 2144.* Epiphora est quasi species *catarrhi* in glandulis oculorum . Praemissis universalibus usurpandi sunt *fotus astringentes* , *linimenta* , & *collyria* , &c. Cataplasma sequens ex *Platereo* egregias habet vires , *℞. Pulp. pomorum acidorum* ( vulgo *vinos. dict.* ) in *aq. ros. macerat.* *℥ij. mucilag. sem. fœnugr. ℥ss. album. unius ovi. lapid. hematit.*

*Oculorum catarrhus. Eiusdem curatio.*

*Heisteri Sententia.*

*Differen-*      *Art. 2145.* Sunt equidem multi qui Epiphora  
*tia Epi-*      ram, cum fistula lacrymali confundunt, sed im-  
*phora a*      merito, quia in ita dictis fistulis lacrymalibus  
*fistula*      non purus lacrymalis humor, sed cum materia  
*lacryma-*      purulenta mixtus ex intus in sacco lacrymali ab-  
*li.*      sccondito ulcere profluit.

*Epipho-*      *Art. 2146.* Quicquid ex oculis per puncta la-  
*ra cause.*      crymalia ductumque nasalem in ipsas nares cur-  
sum impedit, illud ipsum quoque Epiphoram sive  
oculum lacrymantem concitat. Quare oculus la-  
crymans nascitur 1.; quoties tumor aliquis, aut  
tuberculum, ut encanthis canthum sive angulum  
majorem i.e. naso proximum, ipsaque simul pun-  
cta lacrymalia infestat, 2. quoties post palpebra-  
rum exulcerationem, ambustionem, noxamque  
aliam, puncta lacrymalia præcluduntur, 3. quo-  
ties ductus nasalis obstruitur, aut omnino con-  
crescit, sive glutinatur. Obstrui autem & præclu-  
di ductus nasalis consuevit, quoties materia qua-  
dam spissa, viscida, sive glutinosa impletur, vel  
quoties juxta nares paulo graviores inflammations  
sensit, qua facile glutinari potuit; 4. poly-  
pus sive caruncula, aut caro excreescens in na-  
so; siquidem is ductum lacrymalem nasalem oc-  
cludit, vel comprimit, 5. Fistula lacrymalis,  
6. palpebrarum inversio sive ectropium; 7. la-  
crymalis carunculæ erosio, aut defectus, & de-  
nique 8. ductum lacrymalium vulneratio eorum-  
que per malam cicatricem obduratio.

*Eadem*      *Art. 2147.* Epiphoræ causa facili negotio qui-  
*sape dif-*      dem dignosci nequit, quia aliæ aliis promptius  
*ficulter*      deteguntur, quædam nempe directo examine, &  
*cogno.*      inspe-  
*sceuntur.*



inspectu, aliæ per exclusionem cæterarum. Cæterum si a ductus nasalis obstructione, vel glutinatione vitium venit, puncta lacrymalia quidem aperta sunt, & lacrymæ per eam in sacculum lacrymale influunt, ubi colliguntur, ductumque eundem tumefaciunt in modum herniæ, unde tumor hic *hernia nasalis* nomen accepit, aut *sacci lacrymalis hydrops* cum D. Aelio vocatur. Hinc compresso tali tumore humor contentus, non ut debet, in nares, sed per puncta tantum lacrymalia in oculum exit.

Art. 2148. Si Epiphoræ causa a punctorum lacrymalium obstructione veniat, nulla fere curationis spes reliqua est, nisi ubi tenuis cuticula, ut aliquando fit, eadem puncta obtexerit, quo casu longe optimum erit, cuticulam istam tenui quadam acicula providissime perforare, deinde in foraminula ista setam suilla sive filum tenue argenteum oleo ovorum inunctum sæpe demittere, donec ipsorum ora satis indurata, novæque glutinationi non amplius obnoxia reperiantur. Quodsi naturaliter apertis existentibus prædictis punctis, solus ductus nasalis obstructus sit, & glutinosa materia nondum nimis inveterata aut indurata tunc resolventia medicamenta subinde per dies singulos ægro supino in canthum oculi majorem instillanda; tum exprimendus quoque diligenter est digito lacrymalis facius, ne qua forte inibi hærentes diutius humores acrimoniam aliquam contrahant, vias lacrymales erodant, & fistulam lacrymalem sensim denique excitent.

Art. 2149. Ad resolventia quidem medicamenta ista referri præcipue moerentur: essentia aloes, cum aqua ophthalmica parata, vel essentia e felle piscis mustellæ eodem fere modo parata, vel infusum tepidum herbæ hyssopi, aut

*Curatio  
ubi puncta  
lacryma-  
lia ob-  
structa  
sunt.*

*Curatio  
si ductus  
nasalis  
obstru-  
ctus.*

vero.

veronicæ, vel aquæ minerales VVisbadenses, nempe, Carolinæ, Ensenses, Selterenses, Seidlicenses, aliæve similes, vel aqua ophthalmica quæcumque, cum admixta salis mineralis ex fontibus ejusmodi confecti portiuncula. Præter hæc interdum naribus attrahi debet pulvis errhinus lenior ex majorana, liliis convallium, maro vero, similibusve aliis herbis præparatus; vel & spiritus Cornu cervi, vel salis armoniaci.

*Nova  
Metho-  
dus A-  
nelii.*

*Art. 2150.* His parum proficientibus nova Anelii curandi ratio juvabit, per specillum aliquod argenteum tenue per punctum lacrymale superius immissum, quod per sacculum, ductumque nasalem ad nares usque, manu strenua & stabili, mane & vespere quotidie demittitur, & paulo post siphunculo sive syringa tenuissima per punctum lacrymale inferius memoratorum liquorum medicatorum portiuncula injicitur, ut hac ratione viæ lacrymales probe expurgentur, ne tali pacto aperta via ad nares usque rursus præcludatur. Si hoc diu continuatur, malum sæpe sic tollitur; sin vero his non cedit in veram fistulam lacrymale degenerare solet, & ut talis tractanda postea est.

*Epiphora  
incura-  
bilis.*

*Art. 2151.* Tandem ubi ē carunculæ lacrymalis defectu vitium istud suboritur, omnis curatio est frustanea, quia hæc restitui nequit.

### *Farrago sententiarum.*

*Art. 2152.* Epiphora antiqua, & quæ senibus accidit, difficulter curatur, imo frequenter in fistulam lacrymalem degenerat. Remedia in principio debent esse blande astringentia & postea siccantia; lapis calaminaris est singularis. Aqua ophthalmica sequens ex Hoffmanno valet fere in omnibus oculorum affectibus usque ad miraculum.

*Aq. oph-  
thalmi-  
ca præ-  
cellens.*



CAP. X. *morbis cognoscendis &c.* 565  
lum  $\mathcal{V}$ . *Vin. rhenan. Aq. plantag. rosar. ana*  $\mathcal{Z}$ iiij.  
rut. *prap.*  $\mathcal{Z}$ ij. *myrrh. elect. pulv.*  $\mathcal{Z}$ iss. coq. ad tertiæ  
partis consumptionem sub finem in nodul. su-  
spend. pulv. *virid. aris*  $\mathcal{O}$ j. *camphor. gr.* viij. cola-  
tura sine expressione sit pro usu; utilissima quo-  
que est *aq. saphirina*, item *collyrium certum*.

*Art. 2153.* Huc pertinet, si non idem sit, *Rheuma oculi.*  
*Rheuma* sive *fluxus Oculi*, vel *delacrymatio*,  
quod est serosorum, vel tenuium humorum ab  
oculo profluvium, sine insigni inflammatione;  
a *Fistula lacrymali*, vel ab *ungula* male curata  
quandoque oritur, tunc prorsus incurabilis exi-  
stit; vulgo vocatur a *Weeping Eye*.

### *Proptosis.*

*Art. 2154.* Proptosis est exitus oculi fere ex *Propto-*  
orbita, ex contusione, &c. vid. contusionem *sis.*  
*Oculi & Vulnere* *Art. 1052. 1073.* huc referri po-  
test *bubulophthalmia*, magnus oculus, sive oculi  
valde prominentes, vulgo *Goggle Eyes*, a naturali  
conformatione oriundi. Quomodo ab alio mor-  
bo eodem nomine insignito differt. (vid. *Art.*  
*2102.*)

### *Platneri sententia.*

*Art. 2155.* Ubi autem inflammatio etiam in- *Hujus-*  
teriores oculi membranas, & præcipue choro- *modi*  
ideam occupat, phlegmone nomen est. Hoc ma- *Proptosis*  
lum pejus est ceteris Ophthalmiis; caput calet, *potentior*  
& dolor est fere intolerabilis cum febre, no- *causa.*  
cturna vigilia, & delirio. Hæc ingens inflam-  
matio, maxime si a subita causa orta sit, sæpe  
tanto impetu erumpit ut oculos e sua sede pro-  
pellat: id quod quia oculi procidunt, *Proptosis*  
Græci appellant.

*Ejus cu-  
ratio.*

*Art. 2156.* Si Phlegmone hoc oculus teneatur, & symptomata urgeant, mature rapienda cum aliqua temeritate sunt auxilia. Expediit proptinus sanguinem ex jugulari vena, & iterum ex talo, mittere; alvum ducere medicamentis idoneis; satis tamen valentibus, lotionibus etiam in alvum immixtis; cucurbitulas occipitio; atque tergo; concisa etiam cute; admoveere; pedes crebrius in calidam demittere, & fricare; palpebras vero iterum, atque iterum, & multum fricare, iisque vero imponere medicamenta discutientia, quæ adversus inflammationem sunt; & quæ diversis hujus temporibus accomodari debent. Si corpus plenum; laxumque est, cantharides etiam utiliter adhibentur. Sedulo oculi contra æra omnemque lumen custodiri debent. Sæpe tamen his omnibus averti nequit; quo minus oculus, orta suppuratione rumpatur.

### *Atrophia.*

*Atro-  
phia.*

*Art. 2157.* Atrophia oculi, sive imminutio; profunditas vel macies oculi, est quando omnes oculi partes imminuuntur & contabescunt. Nusquam hunc morbum, ut memini, tanquam *particularem* inveni; nisi a tabe universali proveniente; *Celsus* vero & alii hunc agnoscunt; adeo infrequenter, ut opinor, contingit; ut peculiarem medelam vix postulet. ad hanc classem pertinet *Microphthalmos*, sive parvus oculus, *The Pink Eye* or *the Pig. Eye* a naturali conformatione ortus.

### *Mydriasis.*

*Mydria-  
sis.*

*Art. 2158.* Mydriasis, sive *Pupilla Dilatatio*, est cum foramen illud, quo uvea tunica ad species



cies visibiles admittendas donata est; ita præter naturam versus iridis circulum ampliatur, ut visio hæc de causa lædatur. Objecta visibilia grandiora apparent, & minus distincta: alia est *nativa*, alia *adventitia*, prior est incurabilis; si a siccitate oriatur, humectantia indicantur. Interdum est *gutte serena* prodromus.

### *Mejopis.*

*Art. 2159.* Mejopis, sive *Pupilla Angustia*, est *Meiopsis* malum præcedenti contrarium; nimirum cum pupilla angustior est quam naturaliter esse debet. Hi affectus insanabiles sunt.

### *Plege.*

*Art. 2160.* Oculorum vulnera, sive a punctura, incisione, vel contusione sunt periculosissima. Omni arte fluxus humorum inhibendus est, viz. venæ sectione, hirudinibus, clysmatibus, vesicantibus, interceptantibus, &c. & febris suppressenda testaceis, emulsionibus, &c. Interim remedia externa sunt ante omnia *Sanguis columbinus e vivo animali in oculum vulneratum instillatus*; aq. hordei & mel rosar. pro collyrio, oxyrhodium i.e. acetum, in quo fol. ros. rubr. incocta fuerint cum albedine ovar. conquassat. pro defensivo. Sequens cataplasma habet *Turner. Art. Chirurg. p. 370. Vol. I.* ℞. Fol. ros. rubr. sambuc. ana Mj. coq. in q. s. lact. vaccini. colatur. ℞ ls. add. mic. panis alb. q. s. ut reducatur lenta coctione ad debitam consistentiam sub finem addendo vitellum unius ovi cum tantillo croci minutim scisso, f. cataplasma sub tepide applicand. illinendo prius palpebram tumefactam cum ung. sambucin. consulatur auctor loco citato.

*Heisteri sententia.*

*Palpe-  
brarum  
vulnera  
quomo-  
do curā-  
da.*

*Art. 2161.* Palpebrarum cum superiorum, tum inferiorum vulnera paulo graviora difficulter admodum glutinantur: idque non propter insignem modo partium ipsarum tenuitatem, sed vel maxime propter largiores istos, quibus oculi continuo humectantur liquores. Quo igitur felicius tractari eadem possint, foveri decocto quodam ex chamomilla, hyssopo, vel Euphrasia confecto tantisper oculus debet, donec & sanguis conquieverit, & expurgari diligenter ipsum vulnus transversim acu tenui in medio sui protinus debet, insperso dein pulvere ex sarcocolla, vel ex symphit. radice, grummi tragacanth. ac gummi Arab. præparato, illito etiam balsamo Copaivæ, de meccha, vel simili quodam alio; vel etiam ovotum oleo, supradato diapalmæ emplastro deligatisque oculis, ut pro faciliore glutinatione, moveri nequeant. Ubi vero secundum longitudinem, & quasi directum palpebrarum vulnus est, futuris frequentioribus glutinare illud ipsum oportet, eodemque prorsus modo tractari, quem antea delineavimus.

*Oculorū  
vulnera  
quomodo  
curāda.*

*Art. 2162.* Quodsi oculus ipse, sed ita tamen vulneratus est, ut tumoris vitrei crystallinique nihil adhuc dum effluerit, potens utique ad vulneris sanationem remedium esse consuevit, si unguentum alabastrinum, aut albumen ovi, aut mucilago seminum cydonior. & psylli aq. rosarum parata, bis aut ter quotidie plumulæ, vel penicilli subsidio illinitur, semperque dein spleniolum aliquod minutum, in subsequenti collyrio, probe prius agitato, tinctum ad contrahendas vulneris oras, firmiter supra deligatur.

*℞. Album. ovor. num. ij. Aq. rosar. ℥ij. sem. ol. ro-  
sar.*



far. unc. sem. Camphor. gr. iij. M. probe con-  
quassando.

*Art. 2163.* Simul atque vero humores, vitreus *Ubi pe-*  
nimirum, & crystallinus, prolapsi penitus ex *nitus*  
oculo reperiuntur, sane vix, ac ne vix quidem *prolapsi*  
abesse potest, quin & oculi figura, & visio pro *sunt hu-*  
tinus destruantur. Itaque principio splenia in vi- *mores.*  
no, sive spiritu vini calido tincta, postea vero  
balsamum vulnerarium supra deligare convenit,  
quo scilicet glutinari vultus, atque ad evitan-  
dam visus deformitatem pro naturali artificialis  
vitreus, vel argenteus oculus insinuari queat.

*Art. 2164.* Sed fieri tamen quandoque solet, *Visus*  
ut, quoties non nisi tunica albuginea, & scle- *tamen*  
rotica levius percussæ sunt, tunica cornea atque *subinde*  
uvea integris persistentibus oculus, effusus licet *restitu-*  
humoribus pristinis, cum vitreo tum crystallino, *tur.*  
denuo tamen a succrescentibus novis humoribus  
repleatur, ipsaque proinde visio restituatur.

### *Ulcera*

*Art. 2165.* Ulcera in tunica conjunctiva vel *Ulcera*  
cornea, a quacunque causa oriatur, a vulnere,  
inflammatione, a variolis vel combustionibus,  
&c. periculosa sunt, & aliquando curatu diffici-  
lia, & semper metuendum, ne opacam cicatri-  
cem post se riliquant.

*Art. 2166.* Quoad curam, materia ad oculum *Curatio.*  
fluens divertenda est & evacuanda, fordes deter-  
gendæ, dolor, si adsit, mitigandus, & nativa  
oculi temperies restituenda, & conservanda.  
Detergentia & exsiccantia sunt usurpanda, lenia  
tamen & temperata, sine asperitate & mordaci-  
tate. Ad ulcera detergenda ( inflammatione, si  
adsit, prius penitus sublata ) vix datur præstan-  
tius remedium quam *aq. ophthalmica sapphirin.*

*Bat. & deinde collyrium ex sarcocol. in cap. de ophthalmia laudatum, & postremo collyr. tum trochisc. alb. rhas. cum camphora, sacchar. saturn. vel lap. calamin. præp. &c. oleum ovorum valde commendatur.*

*Species  
varia.*

*Art. 2167. D. Banister a priscis medicinae scriptoribus octo vel decem species ulcerum in oculo accidentium enumeravit, ut ulcus rotundum, inustum, sordidum, depascens, cancriform, &c. Sed distinctio nimis subtilis videtur. Verum enimvero notatu dignum est ulcus illud, quod Græci Peribrosin nominant in Angulo oculi cum pruritu vix tolerabili conjunctum sequenti medicamento ab authore valde comprobato sanari. ℞. Macilag. sem. cydon. lin. in aq. plantag. & pavietar. extract. ana ℥j. vitriol. alb. in aq. rosar. solut. ℥ss. vitriolum album est antidotus ad pruriginem.*

### Covvardi sententia.

*Prognosis, & curatio ulcerum oculorum.*

*Art. 2168. Omnia oculorum ulcera sunt periculosa, & curatu difficillima. Totus curandi cardo in usu detergentium & exsiccantium vertitur, quibus tamen sæpissime addi debent lenientia sive anodyna. Non differt horum ulcerum ab aliorum curatione methodus tractandi, nisi quod ob teneritudinem, & insignem partium usum cura non vulgari suscipienda sint. Porro his in casibus conveniunt agglutinantia cum detergentibus mixta; inter quæ liquorem ex ovo cocto, & indurato sacchari cand. q. s. repleto in cella vinaria extillantem maxime commendat Riverius; quod medicamentum, si magis abstersivum desideres, addito myrrhæ pulverisatæ pauculo saccharo cand. supra præscripto, magis proficuum reddetur.*



*Paralysis.*

*Art. 2169.* Paralysis oculi est affectus musculorum ocularium paralyticus, ex quo motus vel *Paralysis.*  
penitus amittitur vel multum impeditur. Est ma-  
lum, uti credo, rarissime contingens; utcun-  
que nihil habet in se peculiare a paralyfi alia-  
rum partium diversum quoad theoricam vel the-  
rapiam.

*Strabismus.*

*Art. 2170.* Strabismus seu strabositas est ocu- *Strabis-*  
lorum distortio, sive *obtus transversus*, vulgo *mus.*  
*a Squinting.* Ex inæquali musculorum ocularium  
exercitio provenit. Infantes hunc affectum faci-  
le contrahunt; interdum ob incuriam nutricum,  
quæ malo situ ad fenestram cunabulum disponunt.  
Adolescentes quoque interdum in eum incidunt,  
vel a vitiosa oculorum praxi, vel a contagione,  
dum alios hoc morbo affectos intuentur.

*Art. 2171.* Strabismus difficillime curatur; si *Curatio.*  
a cunabulis perperam versus fenestram locatis or-  
tum duxerit, mutanda est horum situatio. *Paulus*  
*Ægineta* ad hoc vitium emendandum larvam ma-  
chinatus est, & faciei adaptavit, ita ut per duo  
foramina recta tantum antrorsum liceret prospici-  
cere. Ego ad adolescentulum quendam genero-  
sum strabismo affectum accersitus, statim ac in-  
tellexi unum tantum oculum affici, consului, ut  
*sanus subligaculis probe claudatur* per duas septi-  
manas, quo facto alter oculus omnimodorum  
motuum liberrimus protinus integre sanatus est, &  
in futurum cum altero motus sociales recte ser-  
vavit, & nunc elapsis aliquot annis sine recidi-  
vatione juvenem eleganti forma præditum in bo-  
num virum evasurum fore spero.

## [Encanthis :

Encan-  
this.

*Art. 2172.* Ex curatione unguis vitia nascuntur, quæ ab aliis quoque causis oriri solent. Interdum fit in Angulo parum ungue exciso, vel aliter, tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur: *ἐγκανθίς* græce nominatur. Excipi Hamulo, & circumcidi debet: hic quoque diligenter temperata manu, ne quid ex ipso Angulo abscindatur. Tum exiguum linamentum respergendum est vel cadmia, atramento futorio, &c. *Celsus.*

Curatio.

*Art. 2173.* Encanthis est excrescentia carnea, sive in majori oculi angulo carunculæ lacrymalis adhaerens; si mollis & laxa fuerit, *Alumine* assto & saccharo cand. deleri potest; si vero tumor sit durior, & grandis filo per medium transmissio detinendus est, & forcipe abscindendus, & vulnus tractura myrrhæ, & melle rosaceo fovendum. “*Kennedy.*” In operatione suscipienda cavendum est, ne glandula lacrymalis nimium lædatur, exinde enim fluxus oculi perpetuus continuo in genam depluens supervenire solet, quemadmodum in fistula lacrymalis male curata plerumque accidit. “*(Vid. Art. 2153.)*”

*Heisteri Sententia.*Encan-  
this dia-  
gnosis.

*Art. 2174.* Nonnunquam in angulo sive cantho majori tuberculum aliquod nascitur, idque vel a caruncula lacrymalis, vel etiam e cuticula rubida lunata carunculæ propinqua. Quandoque ita mirifice tumor iste increfcit, ut non puncta solum lacrymalia, sed maximam quoque pupillæ partem contegat. Quod ubi fit, lacrymæ continuo



tinuo super genas profluunt, ipsaque visio cum insigni deformitate atque oculorum inflammatione graviter impeditur. *Enchantis* græce nominatur. Cujus bina fere genera sunt: Namque mitior esse *enchantis* reputatur, quæ sine duritie, & doloribus est; pertinacior autem, atque maligna, quæ cum doloribus livet, atque ad ipsum cancerum quodammodo spectat.

*Art. 2175.* Si qua forte mitior *enchantis* oculum tenet, principio egregie ut plurimum ad curationem frequens ejus scarificatio vel incisio, nec non lenia quævis medicamenta rodentia proficiunt. Optimum vero medicamentum rodens, idemque lenissimum est pulvis ex quatuor sacchari Canariensis portionibus atque una vitrioli albi, sive aluminis usti parte quinta præparatus. Namque is identidem, & quam providissime super tumorem istum respergitur, paulo post oculus aqua egelida diligenter eluitur, donec prorsus extirpatum esse vitium reperiatur. Quod si hoc parum efficiat, lapide infernali subinde, sed quam cautissime, tangi potest. Ad tutiorem vero curationem fonticulis, setaceis, medicamentis denique alvum, & sanguinem expurgantibus opus est.

*Ejus cura  
ratio  
Pharmaceutica.*

*Art. 2176.* Si nihil omnia hæc, vel similia *Chirurgica* medicamenta proficiant, aut quæ exedentia sunt minus tuta, ut in malignioribus sunt, videantur, tunc excipi hamulo, aut vossella tuberculum istud oportet, vel ubi grandius est, filo cum acu transmissio, atque in ansam sive annulum constricto diligenter sustineri, & providissime temperata manu circumcidi. Maxime etenim hic necessaria cautio est, ne quid forte vel ex ipso oculo, vel etiam e carnuncula lacrymali abscindatur, qua abscissa Epiphora difficilis consequeretur. Præstat igitur carnis alienæ porciunculam in oculo  
relin-

relinquere, quam nimium excindere. Si quid enim remansit, illud omne postmodum, vel forficis, vel medicamentirodentiis adminiculo, magna cum moderatione potest removeri. Dempto hunc in modum tuberculo, siccantia, eademque glutinantia medicamenta, cujusmodi est collyrium e tertia, mirrha, atque aloe confectum, tantisper adhibenda sunt, donec glutinatum vulnus deprehenditur.

*Enchan-  
tis non  
curanda;  
nisi pro-  
phylacti-  
ca.*

*Art. 2177.* In enchantide pertinaciori, atque ad carcinoma seu cancerum jam vergente, satius ungue est, colyriis, vel unguentis siccantibus & refrigerantibus, atque lenientibus uti, quam operatione vel medicamentis adurentibus.

### Fistula Lacrymalis.

#### Couvardi sententia.

*Morbi  
nomina  
& de-  
scriptio.*

*Art. 2178.* Anchylops, Ægilops, & Fistula lacrymalis apud authores promiscue usurpantur; ægilops vero est tumor (vel potius ulcusculum) carunculae majoris ad internum oculi canthum; anchylops nominatur, cum adhuc nondum sit ulcerosus; fistula lacrymalis proprie appellatur, quando ulcus sinuosum ibidem efformatur; compressionem digiti liquor e cantho ovi vitello similis, & foetorem emittens extillat; humor corrosivus viam facit, aut invenit, unde meatus colatorii nimis patentes facti, perpetuo stillicidio vexantur; imo frequenter os ethmoidaeum penetrat, erodit, & ad *cariem* miserabilem deducit; in quo statu non nisi *canterio* actuali curabilis est, hujusmodi fistula frequenter cancroso evadit, & tunc *Riverius* monet remediis non esse attingendam.

*Curatio.*

*Art. 2179.* Cura est totaliter chirurgica, nisi quod.



quod intus dari possunt pauca *evacuantia* & re-  
 media quædam humorum acrimoniam *destruentia*,  
 præcipue *mercurialia*, & decoctum *e lignis*. In  
 initio si anchylops adhuc sit, *repellentia* maxi-  
 me proficua sunt, ut suppuratio præveniat; &  
 huic usui inserviunt *refrigerantia*, *astringentia*,  
 & *vitriolica*. Si vero nec refrigerantibus repelli  
 nec solventibus discuti poterit, quin ad suppu-  
 rationem vergat, aperiendus est abscessus, & *de-*  
*tergentibus*, *consolidantibus*, ac *cicatrizantibus*  
 secundum artem tractandus. Alii sunt, qui curam  
 ægilopis moliantur *instrumento chirurgico*, per  
 os nasi tramitem perforando, quo liquor perpe-  
 tuo extillans per nasum evacuetur. „ Sed gravi-  
 „ ter errant, qui existimant *perforationem* hoc  
 „ commodum præstare, ut materia per os ef-  
 „ fluat; foramen enim ossis a carne ex ipso pul-  
 „ lulante brevi obstruetur. Os non est perforan-  
 „ dum nisi præsentem maximam ipsius corruptionem,  
 „ quæ perveniat usque ad cavitatem internam  
 „ ipsius nasi; sola siquidem ejus superficie cor-  
 „ rupta sat fuerit partem læsam scalpro abrade-  
 „ re, euphorbium inspergere, &c. præmitti de-  
 „ bet *setaceum*, quod tanti est momenti, ut in-  
 „ veteratam fistulam lacrymalem sine hoc præ-  
 „ sidio vix curari posse in aliquibus observaverim.  
 „ *Hercules Saxon. & Hildanus.*

*Anelii sententia.*

*Art. 2180.* Egroti in sedili adversa luce, *Specillu*  
 quam aptissime constituto, diductaque per ma- *Anelia*  
 num alterutram, quantum satis est, superiori *ni usus.*  
 palpebra, per ejus lacrymale punctum superius,  
 quam mitissime fieri potest specillum satis tenue,  
 e filo argenteo instar arcus quodammodo infle-  
 xum in saccum lacrymale altera demittatur. Hoc  
 ipsum.

ipsum equidem eo promptius, atque commodius solet fieri, quo magis perspectam partium istarum figuram ac posituram ex anatomicorum doctioris Chirurgus habuerit. Tum eadem providentia versus nasum specillum insertum dirigitur: postea manubrium paulo elevatur, eo-que alterum ejus extremum, quod in sacco lacrymali hæret, hinc inde motitando blande deorsum, ac versus nasum, certa quadam dexteritate compellitur, præclususque ductus nasalis sic quam solertissime rursus deoperitur. Longe autem deoperiri ductus ille consuevit, sicuti non nisi per materiam, aut humorem aliquem glutinosum obturatus, quam si plane coactus, ceu fieri in fistulis inveteratis solet, idem advertitur. Namque hic major ut plurimum in premendo adhibenda violentia est, ita ut acutum, sed tamen non adeo gravem, aut intolerabilem dolorem ægrotantes sentiant, sanguinisque etiam tunc aliquid e naribus exeat. Ne qua forte autem ductus iste lacrymalis recens apertus denuo præcludatur, necessarium utique visum est Auctori non solum aliquoties quotidie, nempe circa matutinum semper, & vespertinum tempus, atque pro re nata, sæpius etiam per idoneum siphunculum aptum injicere liquorem; sed simul quoque dictum illud curationis negotium repetere, donec nihil amplius puris per puncta lacrymalia revertatur, unde ulcus mundatum, ac pristinae integritati ductus iste nasalis restitutus esse deprehenditur.

*Syringa* Art. 2181. Hoc ergo injectionis artificium  
*Anelias* parva fit syringa sive siphunculo ab ipso Ane-  
*lianus.* lio excogitato, vel quovis alio simili. Hujus enim pars anterior, sive tubulus tenuis setam suillam circiter crassitudine adæquans in inferioris palpebræ, ut minus mobilis, punctum la-

cry-



crimalem curiose inferitur, contentumque in ipsa purgans atque sanans collyrium in faccum lacrymalem diligenter injicitur, quod ejusmodi est. *M.* Essent. Aloes cum aqua ophthalmica parata, vel essent, e mustellæ piscis felle eodem fere modo parata, vel infusum tepidum Veronicæ, hyssopi, aut Aq. minerales abstersivæ &c. atque id ipsum repetitis vicibus instituitur, quo scilicet accuratius, & sordes eluantur, & ductus lacrymalis novus apertus servetur.

*Art. 2182.* Geminum hoc curationis negotium tantisper in dies singulos continuandum *Quid facien-* est, donec 1. sine specillo argenteo immisso, *dum po-* & quasi sponte sua liquor prædicta ratione in- *sta.* jectus ad nares penetret; 2. pituitæ vero purulentæ nihil quicquam amplius nec sponte sua, nec post compressum digitis sacculum, e cantho oculi majori prodeat. Tum enim feliciter confecta esse operatio conjicitur, quamquam in aliis citius, in aliis tardius absolvi curationis negotium consuevit. Nunc enim post quartum, octavum, decimum quartum, aut vigesimum diem fistulæ non adeo mali moris fane sunt; nunc magis amplum temporis spatium ad sanationem impendendum est. Interim nulla fere tam pertinax lacrymalis fistula deprehenditur, quæ extirpari hac ratione non possit dummodo caries & callus absit.

*Art. 2183.* Quoties fistula lacrymalis perfecta *Fistula* adeat, ubi scilicet cutis externa simul erosa est, *patens* longe utique facilius aperiri ductus nasalis præ- *quomo-* clusus poterit. Neque enim hic per punctum la- *do cu-* crymale, sed longe commodius per ipsam fi- *randa.* stulam externam per ductum nasalem recta deorsum transadigi in nares specillum illud parvum argenteum potest, & quidem crassiori extremo insignitum, Imo aliquando ad ductum nasa-

nasalem obstructum referandum in huiusmodi malo specillum adhuc ubique crassius confert. Cætera pro mundando ulcere eadem facienda sunt, quæ hactenus proposuimus: præterquam quod locoturundæ elinamentis, turunda plumbea aut cerea adhiberi aptius possit, ductusque nasalis lapide infernali, conuli inversi figuram habente, alternis diebus cautissime tangendus sit, donec satis obdurata glutinationique non amplius opportuna ductus istius nasalis latera inveniantur, ubi postea apertura ulceris externa glutinatur, injectionibus pro canali nasali aperto servando aliquandiu adhuc continuatis.

*Notabene.*

*Art. 2184.* Quando demum in his casibus os unguis vitiatum est, tunc ulceris foramen ampliati caries auferri, vel os perforari debet.

Sicubi fistula lacrymalis sine ductus nasalis obstructione incidit, utique non tam specillo argenteo, quam potius fræquentissima materiæ per injectum idoneum liquorem expurgatione opus est. Similiter ubi nimis relaxatus saccus advertitur confortantia in primis medicamenta, nec non instrumenta comprimantia admoveri debent.

### Visus Hebetudo.

#### Cowardi sententia.

*Hebetudo visus.*

*Art. 2185.* Hebetudo visus est caliginosus videndi modus, cum objecta visibilia nebula velut tenui obvoluta apparent; prius est hic status ingruentis mali peioris, nisi præveniatur, prodromus, & *cataractam* aliquando ob incuriam patientis, aut incitiam medici inductam præcurrit. A statu sanguinis viscido, & pituitoso oriri potest, vel a spirituum animalium penuria,



nuria, vel ab humoris in oculo defectu, vel ex mala partium conformatione.

*Art. 2186.* Ad hanc oculorum hebetudinem *Curatio.* discutiendam indicantur remedia; quæ sanguinis lentorem tollunt; & quæ spirituum animalium penuriæ occurrunt. Quandoque convenit *venesectione*, & deinde *catharticum cum calomel.* exhibere. *Millepedes* inter specifica recensentur: *Salia volatilia & deobstruentia* in sanguinis lentore mira præstant; salivationem per *masticatoria*; potius quam *tabaci* fumo; excitatam prædesse autumo; *cerevisia oxydorica pharmac. Bat.* propinari potest; *collyria vitriolata & astringentia* sunt vitanda; convenit *aqua ophthalmica saphirina Bat.* In genere duæ regulæ ad visum utilissimæ, licet non usquequaque sufficientes statuuntur. 1. Ut mane quolibet, nullo habito ad tempestatem respectu; *frigida* caput; *tem-gula ad* pora; & pone aures alluamus. 2. Ut a *calidis visum* & *piperatis edulizis*; nec non *potulentis spirituo-* *prolongandū.* *sis*, quantum fieri possit, abstineamus.

*Art. 2187.* „ Euphrasia quoquo modo sum- *Euphrasia vi-*  
 „ pta; seu in pulverem redacta; & cum vino *res.*  
 „ albo pota; seu per se sola masticata & deglu-  
 „ tita; seu in vino vel cerevisia infusa; seu in  
 „ aqua ad modum theæ; seu succus ejus expres-  
 „ sus, *videndi facultatem mirifice roborat &*  
 „ *adaugnet, debilem aut amissam reparat & resti-*  
 „ *tuit. Arnoldus de villa nova & alii.*

Gutta Serena.

*Covvardi sententia.*

*Art. 2188.* Gutta serena seu Amaurosis est *Defini-*  
 visus abolitio; sine ullo sensibili vitio in oculis *tio.*  
 apparente, ab obstructione *nervi optici* orta;  
 influxum spirituum animalium prohibente.

Quæ

Quæ a causa quacunque subitanea exoritur facilius curatur, quam cui deplorabile illud infortunium obrepit. In vera amaurosi pupilla nigrior, & amplior solito apparet, sed non semper, & gravitas supercilia premit.

*Curatio.* Art. 2189. Quoad therapiam post universalia (ubi indicantur) medicamentis *volatilibus, antiscorbuticis, chalybeatis, mercurialibus, cephalicis, & nervinis* cura tentanda est; vix aliquid sperandum est a *topicis*; si aliquibus utamur, debent esse *discutientia*.

### *Pitcarnii Sententia.*

*Signum pathognomonicum.* Art. 2190. Si nullis ophthalmiæ signis apparentibus, muscæ aut aranæ, & similia oculis abversari videntur, signum est *pathognomonicum* guttæ serenæ nascentis.

Art. 2191. Curatio hujus affectus medicamentis *mercurialibus* tentanda est, imo *salivatione* & decocto *guajacæ*.

*Curatio.* Art. 2192. „Tutiora sunt *purgantia* (inquit *Ettmullerus*) quam *vomitória*; conveniunt *sudorifera*, maxime *sassafras* & *euphrasia*, *juniper*, *rosmarin*, *millepedes*, *masticatoria*, &c.

### *Platneri Sententia.*

*Curatio Amaurosis ab hæmorrhagia vel concubitu.* Art. 2193. Si Amaurosis post magnam sanguinis profusionem orta fuit, vel post concubitum, qui frequentior, vel numero, vel natura, ratione ætatis, & corporis, fuit, optimæ præsidia sunt, quæ a victus ratione petuntur. Dari debent jura carniû, in potu aqua, eaque, nisi aliud quid hoc impediat, paulo frigidior cum modico cibo; etiam prodest gelatina, & potio, quæ nucleis cacaï paratur. Dari potest



potest nitrum, quod in primis utile est, ubi arteriæ celeriores sunt. Proficiunt etiam lotiones ex lactis sero, & nitro, si frigidiusculæ in alvum immittuntur. Aliena sint medicamenta adstringentia, si ore sumuntur. Nam ad sistendum sanguinis profluvium parum valent, & non raro, si imbecillis dantur, visceribus labem afferunt. Quandoque etiam averti potest sanguis alia parte ex vulnere erumpens, si, alia incisa vena, emittitur. Circumcidenda est omnis negotiosa actio, omnisque cura. Æger conquiescere debet in conclavi obscuro, & quod clausis fenestris ab omni strepitu remotum est. Cæterum magistutum est, si adversa parte cucurbitula admovetur, & illuc sanguinis cursus revocatur. Post venerem, & post sanguinis profluvium, si verendum non est, ne sanguis iterum erumpat, dari potest etiam vinum meracius. Extrinsecus caput, & hujus futuræ, omne etiam corpus, linteis asperioribus assidue, & frequente perfricari debent. Proficiunt etiam Theriæ vel naturales, vel arte compositæ, si ex alto in caput destillant.

Interdum iis, qui ex hac imbecillitate caligare solent, nulla pituita ex naribus fertur. His proficit, si subinde vapor aquæ calidæ, ex qua etiam herba majorana commode coquitur, naribus subjicitur. Tenacior pituita sternutamentis alidi debet.

*Art. 2194.* At enim si id ex malis ulceribus, si herpes, porrigo, scabies, aliaque ulcerum genera, extrinsecus admotis reprimentibus prohibita fuere, proficere possunt curationes, quibus humida purgantur, & sudor etiam evocatur. Alii qui ex morbo venereo lumen amiserant, illud receperunt concitato per mercurium salivæ profluvio. Hoc fieri potest, si ossa in posteriorioribus.

bitæ parte, vel horum membrana, ex vitio intus orto, intumuerunt; quod vitium illa curatione dissipatur.

Ex supercilio-  
rum la-  
sione.

Art. 2195. Hippocrates dixit, ex vulneribus; quæ superciliis inferuntur, lumen amitti. Et Valsalva aliquando mederi potuit oculo, qui a rostro galli Indici, eo loco percussus, & protinus occæcatus fuerat. Perfricuit supercilium eâ parte, ubi ex orbita nervus, qui ramus apris ophthalmici est, educitur.

### Myopia.

Myopia.

Art. 2196. Myopia, sive luscitio, est propinqua visio, quam nos Angli vocamus *Purblindness*; a naturali conformatione oritur; qui autem oculos ita formatos habent, nunquam cæcutiunt; neque conspiciendorum in extrema fenestrate indigent.

### Presbytia.

Presby-  
tia.

Art. 2197. Presbytia est affectus myopiæ contrarius; e longinquo melior est visio, quam propinqua; senibus præcipue accidit; & est malum prorsus incurabile: conspiciendi vero egregio sunt adjumento.

### Nyctalopia.

Nyctalo-  
pia.

Art. 2198. Nyctalopia est malum duplex, cujus species duæ sunt sibi invicem contrariæ. In prima specie visio noctu, vel in locis obscuris est præstantior, in clara luce valde diminuta & fere nulla. In altera specie nisi clara & splendida luce nihil omnino cernitur. Hæc sunt vitia a mala constructione oculi orta, ideoque incurabilia.



## DE NARIUM MORBIS.

## Sydenhami sententia.

Art. 2199. Nonnullæ febres intercurrentibus *Hæmorrhagia*  
 annumerari debent, quæ vulgopro symptomati- *rhagia*  
 cis tantum habentur; hujusmodi sunt hæmorrha- *narium*  
 gia narium & hæmoptoe. Primo ut plurimum *& hæ-*  
 appulsu febris præ se fert indicia, qua derepente *moptoe*  
 sibi per nares, qua data porta, faciente viam; *interdū*  
 dolor & calor sinciput adhuc torquent; sanguis *a febre*  
 per vices profluit, dein aliquandiu sistitur, & *pendens*  
 mox denuo iterum atque iterum erumpit; donec  
 tandem remediorum usu vel sponte omnino ces-  
 sat, ita tamen ut ægro singulis annis a recidiva  
 metuendum sit.

Art. 2200. Sanguinis fervorem nimium atque *Curatio*  
 ebullitionem ut compescamus, convenit *venese-*  
 ctio (sanguis eductus est pleuriticorum similis)  
 item *victus tenuis ac incrassans* imperandus est;  
 quotidie injiciendum est *enema refrigerans*; &  
 dosis *diacodii* hora somni exhibenda est. Quoad  
 externas applicationes, lintea quadruplicata im-  
 mersa *aquæ frigida*, in qua *sal prunellæ* dissolvatur,  
 & postea leviter expressa admoveantur nu-  
 chæ, ac utrinque cervici sæpius in die. Item post  
 universas evacuationes peractas liquor sequens  
 applicetur; ℞. *Vitriol. hungar. alum. ana ℥j. phleg-*  
*mat. vitriol. ℞ss.* coque tamdiu, donec omnia  
 fuerint dissoluta, liquorem frigidum filtra, &  
 add. *ol. vitriol.* partem duodecimam; turunda ex  
 linteo raso liquore hoc probe humectata nari,  
 ex qua sanguis stillat, indatur per dies duos isthic  
 relinquenda.

Art. 2201. „ Quando hæmorrhagia narium a *Cortex*  
 febre pendeat, cortice *peruviano* profligari po- *peruv.*

5, test, æque ac hæmoptoe, de qua alibi.  
( 1154. )

Nota bene.

Art. 2202. „ Opinione vulgari hæmorrhagias  
„ ordinario ex arteriolarum evanescentium ru-  
„ ptura accidere statutum est; Sed in errore ma-  
„ gnopere versantur: in omni etenim *critica sat-*  
„ *tem hæmorrhagia* sive narium, sive partium cir-  
„ ca fauces & guttur, sive pulmonum, sive re-  
„ num, sive hæmorrhoidum, sive uteri, sangui-  
„ nis fluxus *mediantibus glandulis* omnino fit,  
„ *per ductus scilicet excretorios* sanguis exilit,  
„ quod probe notandum est.

*Ettmulleri sententia.*

Quinam  
hæmor-  
rhagiis  
obnoxii  
sunt.

Art. 2203. Quidam hypochondriaci, scorbutici  
& cachectici variis, & stupendis hæmorrhagiis  
obnoxii sunt, ita ut sanguis non unciatim, sed  
libratim effluat.

Curatio.

Art. 2204. In nimia effervescentia & sangui-  
nis fervore conveniunt *blanda acida*, item suc-  
cus *menth. urtic. &c. martialia* pluribus scopis in-  
curandis hæmorrhagiis satisfaciunt: *martialia*  
etenim per se semper astringunt, per accidens  
aperiunt, ut observare licet in mensibus nimis  
fluentibus & obstructis. Ipse novi exempla in-  
fantum & adutorum etiam frequenter hæmor-  
rhagiis narium obnoxiorum solo esu *passularum*  
curatorum. In hæmorrhagia *habituali* sequens  
electuar. est proficuum; ℞. *Pulp. passular. ℞℞. pulv.*  
*rhæbarb. ʒij. tart. vitriolat. ʒj. syr. cydon. q. s. m.*  
(Materia medica in hæmorrhagia late patet, se-  
quentia simplicia sunt insigniora) *folia plantagi-*  
*nis, urtic. millefol. heder. terrest. polygon. flor. ros.*  
*rub. balaust. cort. granat. rad. symphyt. maj. bistort.*  
*tormentil. muscus terrest. gallæ, sem. hyoscyam. pa-*  
*paverina, (catechu) usnea cran. human. gum arab.*  
*sang.*

Hæmor-  
rhagia  
habitua-  
lis.



*sang. dracon. lapid. hematit. tinct. mart. sacchar. saturn. stercus asinum aut suillum & caninum. Externe bufo sicc. stercus porcinum recens excretum. bol. armen. pilul. leporin. crepitus lupi, alumen &c.*

### *Farrage sententiarum.*

*Art. 2205. Phlebotomia ad revellendum am-* *Aliquid*  
*priori foramine celebrari debet, & ut magis con-* *notandum*  
*fertim sanguis effluat, inter detrahendum eun-* *in V. S.*  
*dem multum prodest, vulnus sæpius digito oculu-*  
*dere, dein aliquantulum sanguinis emittere.*

*Art. 2206. Deligatio artuum hæmorrhagiæ fi-* *Deliga-*  
*stendæ conducit; notandum est tamen artus om-* *tio ar-*  
*nes simul non diu ligandos esse, quoniam san-* *tuum.*  
*guis in extremis diu detentus, & a corde nimis*  
*exulans lipothymias terribiles inducit. Album*  
*græcum in omnibus hæmorrhagiis est medicamen-*  
*tum singulare; spiritus vitriol. vel ejusdem el. in*  
*aq. simpl. instillat. in hæmorrhagiis periculosis est*  
*extremum remedium & raro fallax.*

*Art. 2207. Reliqua melioris notæ sunt cal-* *Remedia*  
*canthum rubefactum, colophonium pulverisatum, varia-*  
*stypticum regis, ol. terebinth. decoct. catechu, de-*  
*coct. incrassans, decoct. styptic. elect. Boyleanum,*  
*pulvis Galeni, elect. styptic. tinctura rosar. epi-*  
*thema de sacchar. saturni in casu deploratissimo*  
*moribundi post omnia tentata feliciter expertus*  
*sum.*

### *Olfactus amissus.*

#### *Ettmulleri sententia.*

*Art. 2208. Olfactus amissus rarissime recupē-* *Olfactus*  
*ratur, præcipue in senibus. Præ reliquis mul-* *amissus*  
*rum* *raro cu-*  
*ratur.*

tum confert *majorana* quoquo modo usurpata ,  
item *rosmarinus* , suffitus ex *succino. gum. ani-*  
*mae*, &c. quæ valent in *catarrho* hic locum ha-  
bent. (1088.)

*Riverii sententia .*

*Ejus pro-* *Art. 2209.* Olfactus læsio recens , & a sim-  
*gnosis.* plici coryza genita facile curatur: inveterata vero  
& a confirmata intemperie proveniens difficile,  
quæ ex mala narium conformatione procedit in-  
curabilis est.

*Curatio.* *Art. 2210.* Curatio pro diversitate causarum  
diverso modo instituenda est . Si a frigida in-  
temperie oriatur cum materia pituitosa , ea re-  
media illi adhibenda sunt, quæ ad frigidum ca-  
tarrhum faciunt . Ad obstructionem vero ab ea-  
dem pituita ductibus narium , aut processibus  
mamillaribus impacta auferendam , remedia  
partes illas expurgantia usurpanda sunt: errhina,  
nimirum, sternutatoria , & apophlegmatismi .  
Si denique a sarcomate , aut polypo nares ob-  
struantur ex subsequentibus eorum curatio erit  
desumenda .

*Tozzi sententia .*

*Compa-* *Art. 2211.* Convenit olfactus cum gustatu ,  
*ratio in-* siquidem Coryza laborantes gustu deficiuntur, si-  
*ter gu-* cut olfactu , quia rheuma æque consentientes ner-  
*stum &* vos afficit. Differunt vero: quia gustus æget hu-  
*olfactū.* mido , quo sapida diluantur , & facilius poros  
linguæ subeant ; olfactus autem tenuibus , levi-  
busque halitibus afficitur, siquidem promptius ad  
processus mamillares penetrant; quamobrem odo-  
ra igni exposita, contrectata, vel contusa abun-  
dantius olent, tenuibus partibus a crassioribus ex-  
trictis ; & sapida , lingua suo rore destituta ,  
vix degustantur.

*Art.*



Art. 2212. Observat autem Jonstonus in hoc *Remedia varia*  
 vitio errhinis nimium non esse agendum; sed po-  
 tius sternutatoriis juvare, & quando pituita in-  
 durata pro causa est, radicem gentianæ naribus  
 convenienter insertam opitulari, item castoreum  
 aceto immersum & odoratum. Profunt etiam ol.  
 nigellæ & Errhipum Zacuti Lusitani.

## Ozæna.

## Ettmulleri sententia.

Art. 2213. Ozæna est ulcus sordidum in na- *Ozæna*  
 ribus latens, frequenter est venereum, interdum  
 cancriforme evadit.

Art. 2217. Ad curationem conveniunt folia, *Curatio.*  
 & unguentum e nicotiana; si crusta adfuerit,  
 cum oleo amygd. dulc. removenda est; interdum  
 usurpantur fumi ex cinnabar. & mercur. dulc. in  
 injectionibus, imò nonnunquam mercurius su-  
 blimat. Galli utuntur mercur. precip. cum un-  
 guent. ros. subact. & cum turundis applicato.

## Barbette sententia.

Art. 2215. Narium ulcera plerumque odorem *Ozæna*  
 foetidum spirant, qua de causa Ozænæ appellan- *descri-*  
 tur. Originem trahunt ex humore acri, bilioso, *ptio.*  
 falso, vel maligno qui aliquando ossa, præser-  
 tim cartilaginem corrodit, & nasum foeda de-  
 pressionem deformat. Difficillime curantur, & su-  
 binde nos jubent totius corporis rationem habe-  
 re. Ad minimum caput purgatione, corroborata-  
 tione, & mediocri exsiccatione indiget.

Art. 2216. Externa medicamenta abstergentia *Curatio.*  
 sint, & ob loci humiditatem; aliquando exsic-  
 cantia. Succus Sclæræ melli rosaceo mixtus val-

de laudatur. ℥. Pom. granat. dissect. num. j. Litharg. aurei ℥ij. Minii ℥j. Alum. ust. ℥j. Mercur. dulc. ℥. sem. sacch. alb. unc. j. Vin. alb. Gallic. unc. ij. ebull. par. & Colatura servetur usui. ℥. Plumb. ust. Cerussa lota Tutia præp. Lithargyr. ana ℥ij. Cort. Thuris j. Mirrh. Aristoloch. rotund. Mercur. dulc. ana ℥. sem. Unguent. Fœlic. VVartz. ℥ij. Unguent. alb. camphor. q. s. m. f. linimentum.

Suffusus pulveris sequentis prunæ impositi præstantissimus est, modo caute, & nonnisi semel, aut ad summum bis de die, usurpetur, ne salivatio excitetur, quæ tamen ulcus ipsum curabit. Nucis avellanæ quantitas pro dosi sufficit. ℥. Bezoes Sandarach. Mastic. Thur. Storacis ana ℥j. Cinnab. factit. unc. sem. m. f. pulv. pro suffumeto.

### Junckeri sententia.

*Ozæna duplex.* Art. 2217. Ozæna dividitur in simplicem & putridam. Simplex a corruptis serosis humoribus oritur, & levem tantum exulcerationem offert exiguo dolore stipatam, & post impetum emundationis crustulam nigram exhibet. Hæc quidem vi denominationis Ozæna non esset vocanda, verba autem usu recepta valent, ut nummi. Ad hanc pertinet causam coryza acris habitualis a pulveris sternutatorii acrioris abusu. Putrida ozæna ut plurimum a lue venerea dependet, nonnumquam a scorbuto, vel ab Elephantiasi; & insignes dolore cum materiæ graveolentis excretionem affert. Concurrit hic facile caries, vel si omnino illa nondum adsit, profunda tamen fieri solet ulceratio, ut ad ossa maxillaria, aut sinus cranii sese extendat.

*Prognosis.* Art. 2218. Difficilis ad ulceratam hanc regionem accessus, difficilem reddit exsiccationem, & mundificationem, quare contumax malum est,



est, & si a lue venerea, scorbuto, vel elephan-  
tiasi dependeat, prius non potest curari, quam  
morbi hi primarii sublati fuerint.

*Art. 2219.* Salivatio mercurialis in ulcerena- *Saliva-  
tio haud  
satis in-  
ta.*  
tium, licet causa venerea subsit, non facile est  
admittenda. Partes enim in hac regione per eam-  
dem magis relaxantur, & ulcus per maiorem af-  
fluxum, stasin, & corruptionem exacerbat.  
Rondeletius ad exsiccationem huius ulceris ad-  
modum laudat suffumigium ob profundam pene-  
trationem ex auripigmento, & antimonio addi-  
tis odoratis e. gr. benzoe, myrrha &c. e quibus  
fuligo excitatur, & ulcera siccantur.

*Art. 2220.* Drakius in anatomia sua observa- *Nova o-  
zæna  
species  
a Dra-  
kio An-  
glo de-  
scripta  
& cura-  
ta.*  
vit, quod ozænæ species detur, quæ unice se-  
dem suam in sinu quodam maxillari habeat,  
quæque dignoscatur copiosiore proventu mate-  
riæ, si æger in latus sanum recumbat. Ad hanc  
ozænam curandam secundum dentem maxilla-  
rem evellere, & deinde alveolum, nisi jam arro-  
sione perforatus sit, ad sinum usque maxillarem  
pertundere commendat, ut postea ulcus per hanc  
aperturam sanari possit.

*Art. 2221.* Decannula nari immittenda, ad  
ulcus ferro candente cannulæ immisso exsiccan-  
dum, videantur Petri Dionis operationes chirur-  
gicæ.

### Polypus narium

#### *Ettmulleri sententia:*

*Art. 2222.* Polypus narium est sarcoma seu ex- *Polypus  
narium.*  
crescentia carnosa in naribus ex earum summi-  
tate pronascens, & nasum nunc replens, nunc  
in fauces usque descendens, a *polypo pisce* no-  
men accepit, nunc mollis est, & lubrica, nunc  
una, nunc pluribus radiculis se affigit. Excre-  
scentia

sententia hæc nunc alba, nunc rubra, nunc livida apparet, si livescit, & dolet, fere cancerosam naturam sapit, & non attingendus est polypus cancerosus. Polypus narium est malum curatu admodum difficile. „ *Rhasis* polypum *hemorrhoides* „ *narium* appellat ob similitudinem. De ejusdem „ extirpatione videantur scriptores chirurgici. „ Si in ulcus cancerosum degeneraverit, admittit „ curationem fistulam, & fucatam, in hunc finem unguentum sequens est valde proficuum, „ *℞. Unguent. de plumbo, succ. solan. ana ℥j. aq. ros. ℥ss.* diutissime agitentur in mortario plumbeo & f. ung.

*Art. 2223.* „ Riverius distinguit inter *sarcoma* „ & *polypum*, & quidem jure merito; *Sarcoma* „ (inquit) est excrescentia carnea in partibus genita, *hypersarcomi* simillima in imis narium „ partibus succrescens; *Polypus* vero in summis „ ac superioribus juxta nasi radicem. Cura tentanda est: primo astringentibus lenioribus, & „ deinde medicamentis potentioribus, inter quæ „ eminet *mercurius præcipitat. rub. cum melle rosaceo permistus*; remedia adhuc magis caustica „ cum cautela usurpanda sunt, idque *decrescente luna*, cum tumor imminuitur.

#### Platneri sententia.

Prognosis.

*Art. 2224.* *Polypus*, qui, tenuibus radiculis inherens, mollis, & sine dolore est, cui nullum aliud vitium subest in homine cæteroquin sano tollitur. Qui vero scaber est, & durus, & dolet, is fere cancerosus esse solet, & attingi non debet: Si ex polypo, vel medicamentis, vel scalpello, curato, radícula relicta est, is renascitur. Si is ferramentis resolvitur, sanguis periculosius quandoque erumpit, cujus profusio hominem interimere potest.

Si



Si tumor rotundus est, & a relaxata tunica ortus, adhuc mollis, nec ita magnus; expeditissimum est, illum scalpello incidere. Dum enim vulnus curatur, membrana illa cicatrice contrahitur.

*Art. 2225.* Medicamentis adurentibus non nisi illud genus curari potest, quod molle est. Nam id quod durum est, illorum usu carcinodes fieri consuevit. Admoveri possunt temperata tamen manu, & demisso per fistulam medicamento, lapis infernalis, butyrum antimonii, aliaque adurentia. Ea enim diligentia adhibenda est, ne medicamentum os, vel cartilaginem rodatur, in quibus difficilis curatio esse solet.

*Curatio  
polypi  
mollioris.*

*Art. 2226.* Sunt qui circa polypum nares emplastro contegant, & radiculae supremæ mediante penicillo admovent adurens medicamentum, quod, si hoc radiculam perrodit, etiam tumor inarescit. Ne illud medicamentum diffundatur, protinus calida eluenda naris est.

*Methodus  
altera.*

*Art. 2227.* Ubi vero ferramenti utendum, homo in adverso sedili collocandus est loco lucido. Caput, quod in posteriora reclinandum est, ab ea parte minister continet. Chirurgus ferramento vel vossella, ad id idonea, per nares demissa, apprehendit tumorem a superiore parte, & ubi eum satis tenet, paulatim deducit, trahitque, ac permutatis digitorum vicibus, illum contorquet, ita ut, nulla propter festinationem vis adhibeatur, tandemque illum evellit. Si metus est, ne sanguis cum periculo erumpat, dividenda hæc curatio est, & tumor in dies magis ac magis trahendus. Si polypus post uvam hæret, vossella, qua is apprehenditur, esse debet oblonga, & quæ extremum incurvatum habet. Hæc enim per os demittitur. Sunt, qui, ut melius apprehendere possint polypum, prius incidunt

*Operatio  
Chirurgica.*

cidunt velum palati, quæ res vero facit, ut homo non recte deglutire possit. Ad id idoneum est scalpellum anceps linamentis involutum.

*Ad sanguinis  
profluvium  
sistendum.*

*Art. 2228.* Sanguis, nisi cum periculo fluat, non tam celeriter sistendus est. Si vero metus est, ne homo vehementiori profluvio exhauriatur, cereus tenuior trajicitur per fauces in nares, qui linum trahit. Linum vero habet linamenta, seu pulvillos teretes contortos aliquantum inter se distantes, eique innexos. Cereus pretenditur, & adducitur filum, atque imis naribus adprimitur pulvillus prior, qui ex linamentis siccis puris esse solet. Si vero sanguis nondum conquiescit, alter pulvillus exprimi debet ex liquore ad sanguinem sistendum idoneo, qualis est alcohol, ut adducto magis lino, & priori etiam pulvillo, hic oris venarum sanguinem fundentium admoveatur. In nares etiam linamenta sicca, vel simili medicamento madentia conjici possunt. Sunt, qui oras venarum ferro candente per fistulam demisso adurere jubent, id quod & difficile, & minus tutum videtur. Ubi sanguis conquievit ulcus curandum est medicamentis, quæ locis nervosis idonea sunt. Optima est aqua vulneraria, cui parum essentiae succini adjectum est.

*Ad poly-  
pi radi-  
ces ab-  
sue-  
mendas.*

*Art. 2229.* Interdum non omnis tumor tolli potest, sed illo præciso ejus radix relinquenda est. Huic admovenda sunt medicamenta, quæ eam leniter exedunt, additis aliis, quæ digerunt. Hæc medicamenta illinuntur lino, quod multiplex, & ita tortum est, ut unitas in eo facta sit. Linum hoc etiam per nares trajicitur, & in ore relinquitur. Quotidie vero debet illud sic immutari, ut pars subeat, quæ medicamento illita est. In hac medendi ratione, quæ ardua, & tædii ac molestiarum plena est, tan-

diu



CAP. X. *De Narium Morbis?* 593  
diu perseverandum, donec nihil ex tumore reliquum sit.

## L I N G U Æ V I T I A.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 2230.* Gustus læsiones. In amisso gustu *Gustus*  
convenit *Raphanus* ante pastum masticatus, item *lesiones.*  
*cephalica* & *nervina*. Sed gustus & adorsus vitia, si inveterata sint, sunt curatu difficilia, maxime in senibus.

*Art. 2231.* Loquela amissa frequenter a linguæ *Aphoxia,*  
*paralysi* accidit; curatur *aromaticis*; convenit decoctum *salviae*, *eruc. sinap. &c.* in vino, item *ros-*  
*marinus*, *rad. pyreth. zinzib.* sed præ reliquis succus *salviae*.

*Jonstoni sententia.*

*Art. 2232.* Linguæ affectus sunt Tumor, Ranula, Nigrities, Paralysis, Balbuties, Aphonia, Gustus læsio.

*Art. 2233.* Tumor oritur, vel a causis exter- *Linguae*  
nis, ut inunctione hydrargiri, esu fungorum venenatorum, &c. Tunc vitanda sunt purgantia; *tumor.*  
lingua decocto scabiosæ, & plantaginis, cum pauxillo Theriacæ, & mellis rosacei abluenda, vel oritur a causis internis, nempe affluxu materiæ calidioris: sanguinis nempe, aut bilis; & tum inflammatio plerumque excitatur. Si causa frigidior est, tunc lingua albicat, & multum pituitæ effluit; si venenata ut in lue venerea, ejus signa adsunt. Si causa corrupta, & cancrofa est, tunc malum fere incurabile est, & putredine ad radicem linguæ, vel sanguinis fluxu in lingua erosa accedente, tandem ægri moriuntur. Ad quoscunque conducit ol. vitriol. cum melle rosaceo inunctum, & venarum sub lingua sectio.

*Art.*

*Ranula.*

*Art. 2234.* Ranula est tumor ranæ formam referens, qui sub lingua ex molli carne, cui lingua incumbit, cuique quasi vinculo alligata est, nonnunquam exoritur. Cognoscitur visu. Oritur a sanguine viscido, & pituitoso eodem confluyente, & mollem, ac laxum tumorem, qui apertus mucum ovi candido persimilem de se dat, excitante. Curatur aut topicis remediis, inter quæ ol. vitriol. cum melle rosaceo prævalet: aut Chirurgica operatione, quam linimenta ex tragac. torrefacto cum radice hermodactylorum, & albumine ovi, vel gargarismata, excipere debent.

*Nigredo.*

*Art. 2235.* Nigrities cum scabritie, & scissura aliquando oritur ab igneis vaporibus, & exhalationibus in febris præsertim ardente. Ablui debet lacte caprino, aut Canino, foveri mucilagine seminum psylli, & cydoniorum, collui aquis refrigerantibus, cum lapide prunellæ.

*Paralysis.*

*Art. 2236.* Paralysis contingit linguæ, vel totius, quo casu ejus nervi prorsus impediuntur, qui a septima cerebri conjugatione prope spinalis medullæ initium derivantur, gravis etiam Apoplexiæ metus impendet. Vel ejus parti sive dexterae, sive sinistrae, seu vitio nervorum seu spirituum. In ejus curatione præmissis universalibus laudantur salis margarit. gr. x. in vino malvatico, ol. Rorismarin. cum rotulis diaambrae vel diacastorei. Aqua vel spiritus ceraforum nigrorum, frictio linguæ cum foliis tabaci, semine Erucae & Theriaca. Vide & electuar. Solenandri in consiliis.

*Blasitas.*

*Art. 2237.* Balbuties & Blasitas infestant, aut ex ebrietate; aut linguæ mala conformatione, brevitate, nimia crassitie: aut ejusdem immodica siccitate; aut nimia humiditate. Difficulus tollitur.

*Art.*



*Art. 2238.* Aphonia oritur, vel naturæ confor- *Aphonia.*  
mantis vitio: vel a confirmata paralyfi. Curatio  
ut paralyfis. Valet aq. lil. convall. Lavendulæ,  
cum sanguine Turturis, ol. anisor. & spirit. vitriol.

*Art. 2239.* Gustus læsio fit 1. eo imminuto, *Gustus*  
vel abolito, seu nervis mollioribus a tertia con- *læsus.*  
jugatione exeuntibus perfrigeratis; seu ea cerebri  
parte unde exeunt affecta. Prodest sectio venæ  
sub lingua; nec non ea, quorum in Aphonia &  
Paralyfi facta est mentio, 2. eo depravato, ut  
alienus sapor percipiatur, quod fit, cum vel lin-  
guæ corpus, vel quæ ipsum vestit membrana;  
tetro humore imbuitur, qui vel solus, vel liquo-  
re eorum, quæ eduntur, vel bibuntur dilutus,  
in linguæ corpus, mollesque nervos penetrat;  
tumque vel salsus, vel amarus, vel acidus, pro  
ratione exhalationis, & humoris sapor gustu per-  
cipitur. Laudatur rasura linguæ cum radice Ze-  
doariæ, vel gentianæ, raphanus sale conditus an-  
te cœnam masticatus, eluto postea ore vino &c.

## DENTIUM & GINGIVARUM MORBI.

*Art. 2240.* Dentium caries & nigredo fit a ni- *Dentium*  
mis calidis, frigidis, dulcibus, acidis fumis, ex *caries &*  
mercurio, a scorbutis, &c. *nigredo.*

*Art. 2241.* Vitanda ergo sunt antedicta, & *Curatio:*  
dentes a cibo repurgentur, & vino eluantur.  
*Pumex* bis vel ter ignitus, & vino albo extin-  
ctus, & in pulverem subtilissimum redactus al-  
bissimos facit dentes; quidam solo pulvere panis  
*ustis* utuntur, qui optimum & tutissimum est den-  
tificationum. *Cinis nicotianæ* est turpe medica-  
mentum, sed dentes reddit albos. Ad dentium  
sordes tollendas, & colorem vitiosum emendari-  
dum varia extant dentifricia in practicum li-  
bris; ℞. *Os sepia* ʒj. *rad. pyreth. lapid. pumic. alum.*  
*ust. ana* ʒj. *cinam. lign. aloe, tart. vin. rhenan. ana* ʒʒ.  
f. pulv.

596 *Dentium & Gingivarum Morbi. CAP. X.*  
f. pulv. subtilissimum. Pro usu domestico pulv.  
*panis usti* ad dentes mundandos sing. aurore, &  
postea opiatum sequens usurpandum, ℞. Pulv.  
*flor. ros. rub. ℥ij. myrrh. elect. ℥ij. alum. ust. ℥j. sac-*  
*char. saturn. ℥j. cremor. aq. calc. supernatant. opo-*  
*balsam. ana ℥ij. aq. hungar. q. s. misce.* Post usum  
hujus abluatur os cum vino rubro.

*Curatio.* Art. 2242. In dentifriciis usurpandis optime  
cavendum est, ne crebrior & durior attritus gin-  
givarum, eas atterat & absumat.

*Dentium*  
*vacilla-*  
*tio.* Art. 2243. Ad dentes firmandos valet solutio  
*terre japon. ℥ij. in vin. rub. ℥ss. pro lotione* ( in-  
quit Boyle multis in locis ) conducit etiam *gum.*  
*lac. quocunque modo usurpatum.*

*Gingiva*  
*putrida.* Art. 2244. In gingivis putridis & dentium va-  
cillatione inde orta, ℞. *Gum. lac. ℥ij. cremor. aq.*  
*calc. supernatant. ℥j. alum. ust. ℥j. flor. ros. rub. ℥ss.*  
*m. f. pulv. subtilissimus cum paucis mel. ros. usur-*  
*pand. vel cum vino rub. gallico, in quo infusa sunt*  
*fol. ros. rub. rad. tormentil. &c.* In graviore malo  
ad unguent. *Ægypt. deveniendum est* ( vel *mel.*  
*unguent. Ægypt. supernatans* ) plura videantur  
in cap. de scorbuto. De gingivis putridis & den-  
tium vacillatione. Interim multum valet *tinctu-*  
*ra gum. lac. Fulleri.* „ Præ reliquis autem quot-  
„ cunque in libris inveniuntur, pro dentibus fir-  
„ mandis, iisdemque, & gingivis a putrefactione  
„ conservandis, nec non oris foetore precavendo,  
„ non datur præstantius remedium, quam *Masti-*  
„ *catio foliorum Nicotianæ* modica quantitate :  
„ eo etenim sufficiunt grana quatuor pro una  
„ vice, idque tantum semel in die usurpandum  
„ per horæ quadrantem in ore detinendo. In-  
„ terim super omnia improbandus est turpissimus  
„ quorundam mos totis diebus mesticandi, non  
„ ad hos laudabiles fines consequendos; sed plane  
„ nescientium quare, forsan solummodo consue-  
„ tudini indulgendi gratia, Art.



CAP.X. *Dentium & Gingivarum Morbi*: 397

*Art. 2245.* Oleum *Buxi* dentium dolores quosvis ad miraculum sedat (inquit *Riverius*). Oleum *origani* est in frequenti usu. *Pix liquid.* in ore detent. dolorem tollit, ut ab amico accepi. *Rad. pyrethri* in ore manducat. pituitam evacuat, & dolorem lenit. Decoctum *nicotianæ* in ore detentum dentium dolorem potenter sistit (inquit *Ettmullerus*). „ Sed ultra omnia, quæ hæctenus novimus, *succus radices iridis luteæ* dolenti denti affricatus, vel ipsa *radix* in ore masticata instanti quasi ex incantamento dolorem ex causa quacunque oriundum fugat. Communicator affirmat se quadragies ad minimum pati successu tentasse; ego etiam ipse sæpius expertus sum & plurimi ex meo suasu idem fecerunt: si dentis cavitas sit magna, imponi potest plumbum foliatum.

*Art. 2246.* Nonnunquam (inquit *Sennertus*, & ipse idem plus semel observavi) per dentium radices, & maxillæ foramina, per quæ vasa in eas subeunt, sensim extra effluit sanies e dente corrupto & tubercula in mala vel mento excitat, quæ nullo modo curantur, nisi dens extrahatur. Vide locum p. 262. Vide etiam *Cheselden*, Anat. p. 10. Notabene.

*Art. 2247.* Decoctum *Sabine* in ore detentum vermes dentium elicit, ut auctor est *Ettmullerus*. Vermes dentium.

*Ægnetæ sententia.*

*Art. 2248.* Dentium absque gingivarum phlegmone cruciatus, interdum quidem in suo corpore, nonnunquam vero in nervo, qui ad dentes pertinet, fieri consuevit. Validissimis igitur opus habet remediis, quocirca pleraque ipsorum aceto quam acerrimo componuntur. Dentium dolor proprius.

*Allen, Pars II.*

I i

*Art.*

*Dolor ex  
inflam-  
matione  
gingiva-  
rum.*

*Art. 2249.* Cum vero gingivæ propter phlegmonem dolore infestantur, omnium præstantissimum medicamentum est oleum lentisimum, bene temperatum, ore retentum. Esto id autem recens, quoniam vetus tantum bonitate recenti cedit, quantum vetustate superat. Communis autem etiam in præsentiarum observetur medendi ratio; ut prius qui toto corpore modum excedit humor, evacuetur.

*Dolor ex  
acri de-  
fluxione.*

*Art. 2250.* Ubi vero ex fluxu dentes dolore conflictantur, myrti, & lentisci, & gallæ decocto, aut rhu Syriaci, aut florum agrestis punicæ, aut malicorium jure colluito. Applicatis salis portionibus duabus aluminis tostæ & aceto extinctæ levigatque parte una, postea vino colluantur.

*Ad gin-  
givas  
cruentas  
remedia.*

*Art. 2251.* Gingivis cruentis tenue alumen inspergitur, aut aloe, & vino colluuntur, aut rubi radice vino elixata, aut rhu Syriaco. Gingivas vero cruentas, & defluxione pressas, salsamenti crudi in olla ad carbones usque deusti, cinere attingito. Aloe porro dentes concussos, si inspergatur, firmat, aut fissile alumen, aut galla, aut rubi radix per se, vel in vino elixa.

*Remedia  
varia.*

*Art. 2252.* In exesam dentis cavitatem styrax cum opio inditur, aut galbanum, aut sulphur ignem non expertum cum lycio; Philonis præterea antidotus denti illita, indolentiam conciliat.

Remedium dentes dealbans, gingivas restringens, & jucundum oris odorem præstans est. ℞. Pumicis, salis assæ, iridis anæ ℥iv. Cyperi ℥v. Spicæ nardi ℥j. piperis ℥vj. levigatis utere.

Ad dentium stuporem portulaca manducata juvat, aut oleum ex nondum maturis olivis expressum, infricatum. Idem facit amurca in eneo vase usque ad mellis constitutionem decocta.

Contra gingivas exesas. ℞. Flor. rosar. ℥viiij. galla-



CAP. X. *Dentium & Gingivarum Morbi.* 599  
gallarum ℥iv. myrrhæ ℥ij. misce. Item lac asini-  
num, olivæ foliorum decoctum, acetum scilli-  
ticum.

*Heisteri Sententia.*

*Art. 2253.* Interdum ita graves atque pertina- *Gravio-  
res den-  
tium do-  
lores cu-  
randi  
ratio.*  
ces dentium dolores sunt, ut nullis omnino me-  
dicamentis deliniri queant. Itaque ab ipsa manu  
petere sanitatis præsidia convenit: velenim 1. se-  
dantur scarificatis gingivis; quod Plinius jam  
olim notavit, & frequens usus confirmavit,  
2. vel ferramentum aliquod candens, atque huic  
scopo accommodatum in exesos dentes ea ratio-  
ne demittendum est, ut dempto dolore, ne ite-  
rum expergiscatur, foramen vel cera vel auri  
plumbique brachiis impleatur; vel 3. carie altius  
penetrantē per conspicuum foramen ol. caryo-  
phyllorum, cinnamomi, vel ligni guajaci, oleum  
aut vitrioli spiritus instilletur, 4. vel lobus post  
aurem positus, *Antitragum* Anatomici vocant,  
ferro adurendus, scalpellove incidendus vel di-  
gitis vehementer comprimendus, vel denique,  
5. dens iste corruptus, atque dolens eximendus.

*Art. 2254.* Nonnumquam ex vehementioribus *Paruli-  
da quæ-  
les?*  
dentium doloribus tumores graviter dolentes,  
cum inflammatione ipsarumque malarum tumo-  
re, modo minore, modo majore, in gingivis  
proveniunt. *Parulidas* Græci appellant, qui aut  
neglecti aut digerentibus non cedentes in abscessum  
aut fistulam quandoque degenerant.

*Art. 2255.* Igitur si recens adhuc tumor est, *Earum  
curatio.*  
longe optimum videtur ad dolores, ob quos ægri  
dormire nequeunt, leniendos, tumoremque di-  
gerendum chamæmelum, salviā, flores sambu-  
ci, aliasque id genus herbas in aqua vel lacte co-  
quere, calidumque liquorem ore diu detinere.  
Quod si vero resolutio obtineri nequeat, emol-  
lientibus opus est, althæa scilicet, malva, ver-

basco, ficubus aliisque similibus cum lacte coctis, & creberrime ore retentis. Simul atque mollities suppurationem significat, statim tuberculum vel subcrudum etiam incidendum, ne mora ducta pessimas fistulas faciat. Admotis digitis materia corrupta diligenter exprimi debet, ulcusque apertum subinde vel vino calido, vel decocto ex agrimonia, & hyperico cum admixto rasarum melle colluendum. Tunc enim sua quasi sponte vulneris oræ coibunt.

*Curatio  
fistulae  
gingiva-  
rum.*

*Art. 2256.* Quod si autem in fistulam, cui ossis caries sæpe conjuncta est, ulcus degenerat, tum post injectionem supra dictorum liquorum olei myrrhæ per deliquium, vel elixir. proprietatis portiuncula instillanda sive immittenda est pro vulnere non tam expurgando, quam glutinando. Si demum omnia hæc medicamenta nihil proficiunt, scalpello incidere fistulam oportet; ipsamque ante omnia cariem vel medicamentis, vel radula, vel denique ferro candenti eximere, & si dens aliquis exesus fistulam hanc facit, eximi prius debet, quam fistulæ medicina conveniens adhibeatur.

## A U R I U M M O R B I.

*Ettmulleri sententia.*

*Inflam-  
matio &  
ulcus au-  
rium.*

*Art. 2257.* In inflammatione & ulcere aurium adest insignis ardor in aure, & dolor tensivus, & pulsatilis vehemens cum rubore, quandoque, conjuncta est febris, interdum delirium, & motus convulsivi.

*Methodus  
curandi.*

*Art. 2258.* Insensibiliter discutitur, vel suppuratur; convenit *venesectio*, item *sudorifera* tanquam in aliis inflammationibus. Externa non nisi cum cautela sunt usurpanda, fomenta tamen

ex



*emollientibus & discutientibus* sunt proficua. Si discuti nequeat, ad *suppurantia* accedendum est, ut *cepa sub cineribus* assat. pulv. rad. *lilior. alb. caric. ping. ol. cham. amygd. amar. &c.* Ulcere rupto, si pus effluens sit album, æquale, &c. melius est, quam si sordidum, saniosum, &c. fuerit; sufficit, si modo mundus servetur *meatus auditorius*, id quod optime mediante *urina humana* assequimur; si *ulcus* fuerit sordidissimum *urinae* addi possunt *succus cepæ & mel rosar.*

Art. 2259. *Otalgia*, sive *auris doloris causa* frequentissime est *inflammatio*, de qua modo dictum est; interdum vero ab acri humore provenit, ubi non est adeo insignis ardor & pulsatio. Fumus *nicotianæ* cum fistula inversa auri immixtus valet ad dolorem compescendum, item *millepedes in ol. communi vel amygd. amar. infusi*, & *ol. scorpion.* *Otalgia curatio.*

Art. 2260. Si dolor aurium a vermibus fuerit, dolor tunc vage lancinans, hinc inde rodens percipitur: educendi sunt vivi, aut intus enecandi; *lactepidum* auribus immixtum dulcedine sua vermes allicit, ita ut prodeant: succus *absynthii* interficit, vel angit eosdem, item *oleum nucleorum persicorum, vel amygd. amar. diacolocynthidis Quercetani* cum granis aliquot *mercur. dulc.* item *elix. propriet. argentum vivum* in aq. appropriata incoct. &c. *Vermes in auribus. quid agendum sit.*

Art. 2261. *Tinnitus aurium* frequentissime est *chronicus* & valde molestus, interdum in omnimoda surditate terminatur; raro curatur, sæpe recidivat. *Tinnitus.*

Art. 2262. Præmissis universalibus, suffitus ex *succino, olibano, & gum. animæ* est egregius; *spiritus sal. armoniac.* cum bombyce in aurem immixtus tanquam singulare a *Lindano* laudatur; item *fel lucii piscis, ol. castor. zibet. &c.* in usu sunt. *Curatio.*

## Langii sententia.

*Otalgia  
curatio  
ex in-  
flamma-  
tione.*

*Art. 2263.* Curatur Otalgia iisdem plane remediis internis, ut aliarum partium dolores, vel exquisiti, vel nothi; adeo ut de illis nihil peculiare monendum adsit. Notentur itaque solum topica Auctoribus experta, uti sunt ol. lil. alb. amygdalar. amarar. lumbric. terrestrium, asellor. scorpion. ovorum vel sola, vel cum albumine ovorum conquassata, butyrum non salitum, medulla crurum vituli, lac muliebre, vel vaccinum, vel solitarium, vel cum tantillo thuris, succ. semperviv. maj. cum grano uno, vel altero camphoræ, fots ex decocto betonicæ, chamomill. majoran. rorismarini, mentastri, serpilli vel recent. fol. tabaci, item capparum decoctum.

*Postquã  
in absces-  
sũ dege-  
neravit.*

*Art. 2264.* Cum dolor ex horum casu nondum cessarit, narcotica implorari debent, scilicet oleum hyoscyami expressum, crocus, & opium, quæ cum modo recensitis combinata divinum prorsus exerunt effectum: caveas modo, ne nimio usu cum dolore omnem simul illarum partium sensum tollas.

Hac methodo cura Otalgix est instituenda, quamdiu inflammationem scimus adesse, quando autem illa in abscessum abiit, & a puris acrimonia nunc dolor dependeat, immutanda illa paululum erit, sceligendo loco anodynorum, & refrigerantium maturantia, & consolidantia. Interne decocta vulneraria externe oleum hyperici, momordicæ, balsamum peruvianum, vel sulphuris, mel rosatum, aut syrup. absynth. cum lacte caprino ex commendatione Marcelli Empirici. Debent tamen hæc externa, quod de prioribus quoque observandum, semper calefacta paululum auribus instillari, alias ex illis, si dolor majus augmentum capiat, mirum non est.

*Art.*



*Art. 2265.* Distinctus ab Ootalgia est dolor a vermibus, vel intra aures ex ulcere genius, vel ab extra irrepente musca, aut pulice originem sumens. Ut igitur discas quid hic agendum: observa, illa infecta, quæ majora sunt, nec adeo profunde irreperunt, vossella commode, quæ vero minora, ut pulex, vel crinium fasciculo intruso, vel cum bombace terebinthina, vel melle illita extrahi posse. Quodsi vero non amplius in atrio hæreant, sed profundius se jam receperint, duplex iterum via adest curationis, nunc enim lac cum Saccharo edulcoratum, & externe aurium meatui affricatum, aut cum spongiola applicatum, vel per fissas inversas, vel lardi frustulum, aut scorpionum oleo eliciuntur; nunc si illecebris his se allici non patiantur; per amara & acria, succum & decoctum absynthii, centaureæ minor. mentastri, fol. persici, rutæ, fel animalium, aloen, colocythiden, succum ceparum, ol. ligni coryli in ipsis auribus interficiuntur, & postmodum auriscalpii *Hildani* ope facile educuntur.

Ootalgia  
curatio!  
ab ani-  
malculis  
illapsis.

### *Heisteri sententia.*

*Art. 2266.* Solent interdum in aure, vel cerumen nimis indurescere, vel aliquid in ipsam incidere, ut pisum, faba, calculus, nucleus cerasi, & quid hujusmodi. Si calculus, aut cerasi nucleus intus est, lubricari ante omnia lacte seu oleo tepido instillato meatus auris debet, mox autem vel specillo quodam, vel & vossella quam providissime extrahi. Quodsi vero pisum, faba, vel aliud quidquam hujusmodi in aurem incidisse, atque nimis jam tum ab humoribus intumuisse advertitur, promptissimum auxilium in eo positum est: ut nisi vossella, vel specillo ejici queat,

Quo-  
modo  
hetero-  
genea in  
aurem  
illapsa  
extrahi  
debeant

demisso scalpello exiguo tumefactum corpus illud caute dividamus, ipsasque particulas aliæ, post alias protrahamus. Quoties cerumen induratum magis ac naturaliter debet induruit, ac exsiccatum est, audiendique usum impedit; longe optimum esse consuevit, olivarum aut amygdalarum olei, sive lactis quoque calidi pauxillum in aurem instillare, hominique, ut in partem adversam caput inclinet, præcipere; post aliquot minuta elapsa, specillum quodam auricularium demitti paulatimque ejici, quicquid materiæ noxiæ intus est, oportebit.

## S U R D I T A S.

### Riverii sententia.

*Surditas.* Art. 2267. Surditas & gravis auditus secundum magis, & minus tantum differunt; eo affecti ægre sonum percipiunt; auris afficitur vel in exteriori vel interiori parte. Meatus auditorius interdum *cerumine* vel alia quavis sorde obturatur; in interiori parte auris affici potest humoribus in cavitate collectis, qui frequentius *pituitosi* sunt.

*Curatio.* Art. 2268. Obturatio externæ aurium cavitationis oculis ipsis dignoscitur, si ad solem cavitationem introspecias. „ Pro cavitate externa eluenda „ uti licet decocto *folior. salviae & flor. roris-marinæ* in p. æ. aq. & vin. alb. facto, quod cum syphone prudenter injiciatur. Nihil æque conducit in surditate a causa interna etiam post centum remediorum usum, quam ut æger præmissis præmittendis *sulphureis balneis* caput madefaciat, sedeat sub canali balneorum, & verso epistomio, aquam accipiat. *Ova formicarum* contrita & cum succo *cepe* in aurem infusa quam vetustissimam

sur-



surditatem persanant. Si affectus sit contumacissimus post omnia incassum tentata excitare licet *pyralissimum* ex inunctione mercuriali.

*Erismulleri sententia.*

*Art. 2269.* Inter remedia externa in surditate *Remedia*  
præ reliquis grauius unum *mosci*, vel *ambrae*, *externa*  
vel *zibetici* cum bombyce involutum, & vesperi  
auribus immixtum est optimum remedium, præ-  
cipue in senibus; laudatur etiam *fel anguilla* cum  
*spiritu vini*, & *fel perdicis* a *Lindano* liquor  
ex ovis *formicarum* expressus, si quid aliud, ad-  
modum confert. Sunt qui valde commendant suf-  
ficium ex *sulphure* mediante fistula in aurem trans-  
missum; extremum remedium est salivatio. *Va-*  
*por auricularis Fulleri.*

*Junckeri sententia.*

*Art. 2270.* Meatus auditorius clausus sequenti *Opera-*  
ratione tractatur: Frequens est infantibus recens *rio ad*  
natis, membrana exterior, sub ingressu meatus *meatum*  
auditorii posita, quæ tympanum ab injuriis ex- *audito-*  
ternis defendit, donec meatus sufficiens robur ac- *rium*  
ceperit. Quando autem hæc membrana, vel pro- *clausum.*  
pter nimiam crassitiem, vel ob aliam causam  
tempestive non rumpitur, præternaturalis evadit.  
Ad hoc incommodum tollendum Auctores modo  
causticum potentiale, modo actuale, modo in-  
cisionem commendant. Merito autem præferunt  
incisio; de qua tamen nihil magis monendum,  
quam quod membrana modeste, & cruciatim in-  
cidenda sit.

*Art. 2271.* Quo propior autem est membrana *Monitus*  
tympano, & majore circumspectione incisio pe- *et cau-*  
ragenda est. Brevis enim est meatus auditorius *tela.*

in infantibus ; & facile hinc læditur , quando justo profundius incisio instituitur . Facta incisione meatus cannula , vel turunda apertus servatur , donec illiuscutis plane coaluerit . Quando autem caruncula meatum claudit , & hæc multum extrorsum prominet , extrahi forsan poterit methodo , qua usu est Hildanus cent. III. obs. I.

*Oethæi sententia.*

*Art. 2272.* Surditates sæpe a sanguinis copia ad aurium radices delabente oriri in multis animadverti . Itaque non plane absurdum mihi videtur , cujusdam Bavarici balneatoris mihi noti , auxilium , quo multos a difficultate audiendi eum liberasse , sermone plurimorum ad me delatum est . Est vero illud ejusmodi . Jubet is balneator surdaestros mane balneum ingredi , ut venæ , quæ retro aures sunt sitæ , balnei calore turgeant , eas postea ita turgentes secat , ac quantum videtur educit sanguinis , evidente utilitate eorum , quibus gravitas auditus molesta est .

*Farrago sententiarum.*

*Remedia varia ad Otalgia.* *Art. 2273.* In doloribus aurium inquit *Hartmannus* folia Nicotianæ viridia , vel etiam arida sed iterum humectata , mirifice prorsunt .

Ex cepis conficit *Forestus* cataplasma , quod auri dolenti appositum mirabile dicit . Sumit autem cepam sub cineribus coctam : huic contusæ addit ol. chamæmeli unc. j. sem. butyri recentis , & ul. aneth. ana unc. sem. Croci ꝑ. sem. simulque omnia permiscet . Id ipsum approbat *Zecchius* , & *Riverius* quamvis nonnihil ab ipso discrepent in dosi componentium .

*Art.*



*Art. 2274.* Ad surditatem gravemque auditum *Remedia*  
pro arcano habet *Prævotius* crocum, & calyo- *ad sur-*  
phyllos cum succo cyclaminis. Admiscet autem *ditatem*  
cum his *Th. Bartholinus* aquam rosarum, atque *Et tinni-*  
gossypio in aures guttas aliquot calidas infundit. *cum au-*  
*rium.*

Apud *Deodatum* refertur mirabile secretum ad  
surditatem, & tinnitum aurium ex vermiculis sub  
cortice quercino repertis, decoctisque in oleo  
omphacino, & postea in radice cyclaminis assa-  
tis. Et apud *Hertodium* memoratur aliud compo-  
situm ex oleo vermiculorum sub eodem cortice  
ligni quercus repertorum ad ℥j. sem. balsam. Pe-  
ruvian. ℥. sem. & olei stillat. croci gutt. vj. cujus  
deinde gutt. ij. vel iij. calidæ in aures cum gos-  
sypio instillantur.

Maximi quoque fit ad surditatem essentia ca-  
storei & croci, balsamum ligni guajaci, essen-  
tia fellis tauri, cum sp. vin. extracta, & balsa-  
mum sulphuris. Itemque essentia lavendulæ, &  
castorei; nec non succus Sampsuchi, ejusque o-  
leum destillatum.

*Art. 2275.* Interne vero commendatur deco- *Remedia*  
ctum radicis Asari, sal volatile succini, ejusque *interna*  
essentia. Conveniens item foret aliquod cathar- *ad sur-*  
ticum præsertim extractum catholicum, aut Hel- *ditatem.*  
lebori, si corpus succiplenum videatur: siquidem  
ex *Hippocrate*: *Qui surditate laborant, superve-*  
*nientibus biliosis dejectionibus liberantur, quam-*  
*vis de surditate febrientibus contingente id in-*  
*telligendum esse commentetur, Galenus.*

## U V U L Æ R E L A X A T I O

sive Procidentia.

*Art. 2276.* Gurgulio seu uvula est glandula *Uvula*  
pendula ad formationem, & modulationem vo- *relaxa-*  
cis conferens, quæ defluxionibus, æque ac aliæ *tio.*  
gland.

glandulæ, obnoxia est; si infra tumeat, supra gracilis evadit. E palati extremo propendet, inque fauces & gulæ caput fertur, itaque hæc loca titillatione quadam afficit, metuque præfocætionis sollicitat.

*Celsi sententia.*

*Uva prolapsa excisio.* Art. 2277. Uva si cum inflammatione descendit, dolorique est, & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest. Solet enim multum sanguinem effundere. Itaque melius est his uti, quæ alias proposita sunt (Lib. VI. cap. 14.) Si vero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra justum modum a pituita ducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. itemque si ima livida, & crassa est summa vero tenuis. Neque quicquam commodius est, quam vossella prehendere, sub eaque quod volumus excidere. Neque enim ullum periculum est, ne plus minusve præcadatur, cum liceat tantum infra vossellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est, idque præcidere, quod longior uva est, quam esse naturaliter debet.

*Riverii sententia.*

*Causa.* Art. 2278. Humor pituitosus in columellam defluens, eam humectat, emollit, & relaxat, ut longior facta partem superiorem œsophagi tangat, & nauseam pariat.

*Curatio.* Art. 2279. Evacuantia universalis eadem esse debent ac in catarrho. In principio topica astringentia & repellentia conveniunt, quemadmodum in curatione angine, quibus postmodum resolyentia & exsiccantia erunt admiscenda: Remedia autem forma pulverum potius quam liquidorum



rum sunt ut plurimum utiliora & efficaciora ,  
 præsertim si nulla adsit inflammatio. Excisio est *Excisio*.  
 ultimum remedium , sed cum suprema cautione  
 admolienda est ; nam valde periculosa est ( inquit  
*Hippocrates Progn.* ) de qua operatione videantur  
 authores chirurgici .

„ Audiamus *Tulpium*. A medicis prolapsus pa-  
 „ lati vel omnino prætermittitur, vel leviter tra-  
 „ ctatur ; & tamen vitium est non minus grave  
 „ quam rarum. Vidi equidem tumorem hunc in  
 „ palato celeri gressu exortum , ut vix licuerit  
 „ cogitare de *Gargarismate*, ne dum de aliis au-  
 „ xiliis, præterquam de sola *scalpellî incisione* ,  
 „ qua dextre & festinanter id temporis instituta  
 „ videmus non modo effluxisse inde plurimum  
 „ aquæ , sed detumescere palato ad se rediisse  
 „ hominem extinctioni jam proximum. Unum ex  
 „ optimis remediis pro uvula prolapsa est *semen*  
 „ *cannabis* in poscaparum coctum pro gargaris-  
 „ mate ( inquit *Ettmullerus* ). Proficua quoque *Remedia*  
 „ esse possunt sequentia pro arbitrio vel potius *varia*.  
 „ iudicio periti medici usurpata ; *decoctum cate-*  
 „ *chu*, *decoctum rad. tormentil. cum pauco sale ar-*  
 „ *moniaco*, & *alumine crudo*, *gargarisma pro uvu-*  
 „ *la*, *pulvis uvularis*.

### *Heisteri sententia.*

*Art. 2280.* Tolle autem variis modis uvæ pars *Primus*  
 supervacua potest. Primus modus est per vinctu- *modus*  
 ram . Huic perficiendæ, quia manus haud suffi- *exciden-*  
 ciunt, proprium instrumentum aliquod extat de- *di uvæ*.  
 destinatum : quale quidem ex *Hildano* & *Sculteto*  
 Tabula repræsentavimus. Hujus ope instrumenti  
 vinculum in uva relinquitur, firmiterque inde per  
 dies singulos adstringitur, donec uvæ pars infe-  
 rior decidat, Sed ista quidem curandi ratio ,  
 quam-

quantumvis satis ingeniosa sit, tarda nimis est, neque homini ægro tantum, sed chirurgus etiam molesta.

*Alter  
modus  
qui is est  
Celsi.*

*Art. 2281.* Paulo promptior ea curandi ratio videtur, si lingua per specillum planum sive spatulam prius depressa tantum ex uva per forficem longiorem exciditur, quantum supervacaneum esse cognoscitur. In quo equidem negotio illud in primis videndum est, ne iusto vel major vel minor pars, quam naturaliter decet, remaneat. Iusto major etenim si remanet, ægro molesta & parum utilis operatio est; iusto minor autem si relinquitur sermo plerumque corrumpitur.

*Instru-  
mento  
facilius  
absolvē-  
dus.*

*Art. 2282.* Quando vero quis manu tam strenua instructus non esset, ut oris spatulam cum forfice quam exactissime simul continere valeat, nonnullis optima, atque commodissima curandi ratio est, quæ sit per illud instrumenti genus, quod a rustico quodam Norvegico adinventum *Bartholinus*, ut & *Sculptetus* accurate satis descripserunt. Nimirum cultellus aliquis proprius ad ferramentum quoddam latum, idemque in anteriori parte perforatum ita firmatur, ut post emissam, quæ ferramento iuncta est, lamellam elasticam, quam celerrime prorumpat, uvæque partem inutilem præcidat. Tamen *cl. Ravius*, ni fallor, instrumentum illud sic immutavit ut per ansas manu sinistra in ore contentum linguam simul quam aptissime deprimeret, atque tunc oris specillo opus non sit.

*Operatio-  
ne abso-  
luta  
quid fa-  
ciendum.*

*Art. 2283.* Uvæ parte supervacua hunc in modum præcisa, haud alienum est sanguinem paulisper fluere pati, dehinc autem cum ad cohibendum sanguinem, tum ad partem ægram fovendam, ex vino calido, eodemque præsertim rubicundo, si haberi potest, vel aceto etiam aut oxycrato calido, diligenter gargarizare. Si nihilo-



lominus fluere sanguis pergat, pulvere aluminis per admotum cochleare cohibendus; vel & prius eorum chirurgorum more, ferramento quodam calente, sed nondum tamen candente, dum sanguis conquiescat, contingenda.

Art. 2284. Quoties autem, prout fieri haud raro suevit, affectus aliquis venereus uvam simul infestat, id sibi datum Chirurgus existimet, ut non a manu solum, sed a medicamentis quoque convenientibus sanitatis praesidia petat, alias optatum finem non obtinebit.

## A P H T H Æ.

### Boerhaavii sententia.

Art. 2285. Aphthæ sunt parva, rotunda, superficialia ulcuscula os interdum occupantia; sunt enim exulcerationes ultimorum emissariorum, hinc occupant omnia loca, ubi talia emissaria hiant; adeoque labia, gingivas, genas internas, linguam, palatum, fauces, tonsillas, uvulam, gulam, stomachum, intestina tenuia, (ad anum usque) ubique fere eadem specie. Præcedere solent, febris, incipiens cum diarrhœa vel dysenteria, nausea, appetitus prostratus, præcordiorum anxietas, debilitas magna, evacuatio notabilis, stupor, somnolentia. Varius est aphtharum color, albus, fuscus, flavus, lividus, niger, quarum posteriores sunt peioris notæ. Sapor omnis aboletur; adest plerumque oris siccitas, interdum crustis deciduis, salivatio vel diarrhœa adoritur, imo dysenteria ex vasorum dilatione.

*Aphthæ  
quid.  
Et quas  
partes  
occupant.*

*Varius  
aphtharum  
color.*

Art. 2286. Ut curetur optime hoc malum, exhibenda sunt calida, diluentia, resolventia, & abstergentia, ut crusta in facilem citumque lapsam

*Curatio.*

psum

psum disponatur; simulac lapsus conciliatus est, tum *anodyno*, *demulcente*, & simul parum *corroborante* medicamento utendum, uti *gelatin. C. C.* vel seq. *℥. Aq. ros. stillat. syr. papav. alb. ana ℥ij. vitel. ovor. ij.* Misce, hujus pauxillum ore assiduò contineatur. In fine dandum est *cathartic. corroborans ex rhabarb. &c.*

*Ettmulleri sententia.*

*Aphthæ unde.* Art. 2287. Aphthæ succedunt frequentius febribus ingentibus, aliquando oriuntur ex vitio salivæ, & cruditate ventriculi. Aphthas futuras in morbo cognoscimus ex sopore & singultu, qui toto morbi decursu non dormiverunt, in soporem incidunt, & tunc aphthæ prodeunt. Singultum accidit, si sint ex ventriculo, & tunc plerumque sunt deteriores.

*Curatio.* Art. 2288. Nil pejus quam sæpius purgare in hoc malo. Tota curatio consistit in *humectatione*, quæ emolliat, & leniter calefaciat; optimum est *decoctum raparum cum nitro*, item *decoctum herb. bellidis major. cum ficibus & sal prunel.*

*Platneri sententia.*

*Aphtharum accuratio. descriptio.* Art. 2289. Aphthæ dicuntur oris ulcera minora mucosa, quæ oriuntur, si minores fistulæ, per quas varius humor in os defluit, a lento viatiatoque humore exulcerantur. Non solum os, sed quoque fauces, stomachum, ventriculum, atque etiam intestina infestare solent. Sunt quandoque cum inflammatione, malaque febre, præcipue, si ventriculus, atque stomachus inflammatur, in quibus casibus illæ mortem denunciant, maxime si aphtæ in elatiorem crustam degenerant, & hæc ab inferioribus faucibus quasi ascendit. Sæpe igitur



igitur etiam aliis febribus accedunt, & tabidos quoque ac phthificos non parum excruciant. Si vero alienum, obscurumque colorem accipiunt, plerumque gangræna subest, quæ mortis index esse solet. Nec sine periculo sunt, quæ resolutæ celerius renascuntur. Morbus in locis paludosis, maxime in Belgio, frequentior, & quasi endemius esse solet. Infantes crebrius iis laborant, si lacte vitiatò aluntur, & hoc in ventriculo coacuit.

*Art. 2290.* Si aphthæ ex mala, ardenteq; febre nascuntur, huic ante omnia succurrendum est. Plurimum valent omnia, quæ corporis humida nimio æstu coacta diluunt atque tenuant. Dari & crebrius in ore contineri debent decocta ex emollientibus, atque hordeo, cui adjiciuntur syrupi de althea, violarum, & capillorum veneris, vel loco horum oxymel. Sunt, qui rapas contritas coquunt, bene despumant, atque ægro dant, quem monent, ut ea, antequam devoret, quam diutissime in ore contineat. Etiam radix glycyrrhizæ, sarsaparillæ, herba capilli veneris, flores verbasci, malvæ, ex aqua, vel lactis sero coquuntur. Profunt etiam cremores ex amygdalis, & semine papaveris parati, ut & gelatina ex cornu cervi, cui quamplurimum succi acidi adjici debet. Gelatinas tamen ardentibus febribus non satis idoneas esse, medici non ignorant.

*Earumdem in febre ardente curatio.*

*Art. 2291.* Hæc omnia vero, quæ emolliendi facultatem habent, profunt, si in ore diutius continentur. Ex iis etiam recte fiunt gargarizationes, nec non lotiones subter in alvum dandæ. Inter remedia etiam est nitrum, & sal prunellæ, si multa aqua diluuntur. Præterea satis efficax ad mucum ex faucibus detergendum est medicamentum ex moris, vel ex nucibus, roob diamorhon & dianucum nostratibus dictum, quod melle cum rosa excipi, & mediante penicillo ulceribus illini potest. Et

*Remedia varia.*

his

his commode pauciores guttulæ spiritus vitrioli adjiciuntur, ut ad purganda hæc ulcera, & resolvendas mucosas crustulas medicamentum validius sit. Infantibus, si aphthæ sine febre sunt, proficit rhabarbarum, & si victus lactantis mutatur.

*Farrago sententiarum.*

*Lauda-  
num ul-  
cerum  
remediū.*

*Art. 2292. Spiritus vitrioli vel sulph. melli rosa-  
ceo permistus in pueris ac adultis a Riverio com-  
mendatur; si vero morbus sit valde pertinax (inquit  
idem) & humorum fluxus copiosus, adeo ut vita sit  
in summo periculo, extremum remedium est Lau-  
danum, quod dolorem sedat, & humorum flu-  
xum inhibet.*

*Cortex  
peruv.*

*Art. 2293. Post febrem aphthæ, vel singultus,  
vel horum utervis, si non sponte faceſſat, sed in  
longum tempus decurat, facile fugatur usu conti-  
cis peruv. Usurpari potest ad os colluendum garga-  
risma sequens ℥. Succ. pomorum agrestium (om-  
nium opt. Cochagee) ℥℥. syr. de rub. idæ. ℥j. m. Sy-  
denham. sched. mon.*

*Reme-  
dium sin-  
gulare.*

*Art. 2294. „ Sequens omnibus remediis, quæ  
„ hætenus expertus sum, multis parasangis ante-  
„ cellit in hoc morbo vincendo ℥. Terr. japon. pul-  
„ verisat. ℥iij. coq. in aq. calc. ℥xij. ad tertiæ partis  
„ consumptionem, colaturæ add sacchar. saturn. ℔j.  
„ mel ros. ℥ij. capiat æger coch. j. singulis horis vel  
„ sæpius, teneatque paulisper in ore & sensim de-  
„ glutiat: est remedium vero aureum. Videantur  
„ plura in cap. de infantum morbis. (3052.)*

G U T T A R O S A C E A.

*Ettmulleri sententia.*

*Gutta  
rosacea.*

*Art. 2295. Gutta rosacea est rubor faciei tibe-  
rosus, pustulosus, guttis interdum sanguineis simi-  
lis, qui nasum sæpe & genas inæqualiter & valde  
tingit, potatoribus satis frequens est; ut plurimum  
ad mortem usque comitatur. Præmissis universa-  
libus conveniunt saturnina, &c.*

*Tur-*



## Turneri sententia.

Art. 2296. Gutta rosea seu rosacea ita dicitur a Morbi  
nomina  
& de-  
scriptio.  
parvis rubicundis quasi guttulis, sive tuberculis  
igneis per universam faciem, & præcipue nasum,  
hinc inde sparsis. Appellatur etiam *rubedo maculo-  
sa*, rectius vero, me iudice, **INSIGNIA**  
„ **BACCHANTIUM FLAGRANTI FULGORE**  
„ **RADIANTIA**. Est morbus profecto apud Da-  
„ *mnonios & Belgas* maxime familiaris & fere  
„ *Endemius* ob pravam bibendi consuetudinem. “  
Tres gradus a quibusdam numerantur, viz. *Rube-  
do simplex, rubedo pustulosa, & rubedo ulcerosa*;  
„ facies & nasus aliquando in molem prodigio-  
„ sam supercrescunt, adeo ut vultus aspectu ho-  
„ rifico plane tremendus & monstruosus evadat.  
„ Novi quendam hoc morbo *glorioso* affectum, Ad gra-  
dum e-  
minentē  
prove-  
nit.  
„ cui inter procula, quibus liberrime indulgit,  
„ sanguis per ipsam cutem variis in locis exilire  
„ consuevit, & ubertim confluere, quod per ali-  
„ quot momenta potationis negotio impedi-  
„ to esse solebat; mox vero suppressa hæmorrha-  
„ gia, ut canis immundus vel amica luto sus ad  
„ sordem & illuviem se recipere solent, ita ille  
„ ad carissimam computationem lætus redibat,  
„ ibique commorari solitus, donec vultum in *ter-  
rem* accenderet, tantum non ignem undequa-  
„ que spargentem, ipsis tenebris fulgentem.

Art. 2297. Agnoscendum est interim hunc mor- Sobriis  
raro ac-  
cidit.  
bum maxime abstemiis & temperatis interdum sed  
rarius accidere; ut plurimum enim spirituosorum  
liquorum ingurgitatione accersitur.

Art. 2298. Ut ad curam sternatur via, impe- Curatio.  
randus est *victus humectans & refrigerans*, & idem  
regimen observandum ac in *psora*, vel in *eruptio-  
nibus scorbuticis*; sed maxima adhibenda est cau-  
tela in his mutationibus faciendis; a liquoribus  
calidis & spirituosis ad victum tennem & potum  
refri-

Eupori-  
sta.

refrigerantem non est facilis transitus. Ex antimonio & mercurio preparata tam interne quam externe sunt maxime proficua. Author noster more solito quamplurima remedia ex Sennerto, Mayernio, &c. accumulavit, sed in calce monet se multoties opem tulisse singularem remediis facile parabilibus & minus pomposis, nimirum cum sale tartari, nitri, sacchar. saturni pomato admist. albumine ovorum cum frusto aluminis aut cum granis aliquot camphoræ & sublimat. item ol. myrrhæ, sequens valde efficax perhibetur. ℥. Ovum duriuscule coctum, eximatur vitellum & cum pulv. myrrh. elect. suppleatur locus, & in cellaria suspendatur, ut per deliquium fluat: hoc etiam est cosmeticum insignne, ut & unguentum faciale Bat.

Remedia  
varia.

Art. 2299., In eruptionibus pustulosis levioribus linimento sequente feliciter usus sum;  
℥. Ung. aiapomphol. ℥β. mercur. dulc. ℥j. alum.  
ust. ℥β. ol. rhod. gut. iij. ol. ros. q. f. misce. In graviori casu linimento & lotione sequentibus præmissis rite præmittendis; ℥. Litharg. auri ℥j.  
sacchar. saturn. ℥j. ung. pomat. fragrantissim. ℥j.  
ol. rhod. gut. iv. amygd. dulc. q. f. m. f. linimentum pro locis in facie maxime affectis sing. diebus vesperi illinendis, ℥. Aq. plantag. ℥vj. succ.  
limon. ℥ij. mercur. sublimat. gr. xij. camphor. ℥j.  
infund. clause & calide per horæ dimidium, colatura sit pro lotionem his vel ter in die usurpanda. Hæc ultima est Aq. divina Fernelii, & sequens Pitcarnii. “ ℥. Litharg. aur. ℥ij. mercur. sublimat. corrosiv. ℥j. acet. ℥x. infund. per hor. 12. in vase stanneo sæpius agitando; post subsidentiam effundatur liquor limpidus. Usus tempore instillentur guttæ aliquot. ol. tart. per deliquium, donec lactescat., In eundem finem adhiberi potest etiam Aluminatum Bateanum præmissis rite præmittendis.

Finis Partis Secundæ.











